

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. október 25.

MATEMATIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTERIUM

Fontos tudnivalók

Formai előírások:


- A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal** kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb.
- A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám** a mellette levő **téglalapba** kerül.
- Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
- Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.

Tartalmi kérések:

- Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadjuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
- A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
- Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szereplőnél **kevésbé részletezett**.
- Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
- Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel, mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változik meg.
- Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **mértékegység**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
- Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **csak egy** (a magasabb pontszámú) **értékelhető**.
- A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
- Az olyan részszerkesztéseket, részleépéseket **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
- A **vizsgafeladatsor II. részében kitűzött 5 feladat közül csak 4 feladat megoldása értékelhető**. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

9.		
A megadott feltételeket a következő alakban használjuk:		
(1) $a_n = a_{n-1} + 12a_{n-2}$, ha $n \geq 3$		2 pont <i>A 2 pont a (2) egyenlet helyes felírásáért jár.</i>
(2) $2a_2 = a_1 + (a_3 - 9a_1)$		
(3) $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 682$		
A sorozat harmadik tagja az (1) alapján: $a_3 = a_2 + 12a_1$	1 pont	
Behelyettesítve a (2) összefüggésbe ezt az a_3 helyére, rendezés után kapjuk, hogy $a_2 = 4a_1$	2 pont	
Ebből az $a_3 = a_2 + 12a_1 = 4a_1 + 12a_1 = 16a_1$	1 pont	
A negyedik tagot felírva az (1) alapján: $a_4 = a_3 + 12a_2$		
A jobb oldalon behelyettesítve az a_3 és az a_2 az a_1 -gyel kifejezett értékét kapjuk, hogy $a_4 = 16a_1 + 12(4a_1) = 64a_1$	2 pont	
Hasonlóan fejezhetjük ki a_5 értékét a_1 segítségével: $a_5 = a_4 + 12a_3 = 64a_1 + 12(16a_1) = 256a_1$	2 pont	
A (3) egyenlőség bal oldalán a sorozat tagjait rendre az a_1 -gyel kifejezett értékkel helyettesítve kapjuk, hogy $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = a_1 + 4a_1 + 16a_1 + 64a_1 + 256a_1$	2 pont	
Összevonás után: $341 a_1 = 682$	1 pont	
Ebből: $a_1 = 2$		
A hatodik tagot felírva az (1) alapján: $a_6 = a_5 + 12a_4$. Az a_5 és az a_4 értékét a_1 -gyel kifejezve kapjuk, hogy: $a_6 = 256a_1 + 12 \cdot 64a_1 = 1024a_1 = 1024 \cdot 2 = 2048$.	2 pont	
A kapott 2; 8; 32; 128; 512; 2048,... számsorozat elemei kielégítik az (a_n) sorozat elemeiről megadott összes feltételt.	1 pont	
A sorozat hatodik tagja: 2048.		
Összesen: 16 pont		
<i>Ha a vizsgázó csak megsejti (pl. a második és harmadik tag a_1-gyel történő kifejezése után), hogy ez a sorozat egy $q = 4$ hányadosú mértani sorozat, de ezt nem igazolja, akkor megoldására legfeljebb 8 pontot kaphat.</i>		

8. c)



A. $B \cap C$ halmaz a B pontthalmaz határoló körének két párhuzamos húrja:
A húrok végpontjai: $(0; 2)$ és $(6; 2)$, valamint $(-2; -2)$ és $(8; -2)$.
(Ez utóbbi húr egyben átmérő is.)
A $B \cap C$ halmaz ábrázolása:
Az origótól a legmesszebb a $(8; -2)$ pont,
legközelebb a $(0; 2)$ és a $(0; -2)$ pont van.

Összesen: 4 pont

1. A vonatkozó pontszámokat rendezett és világos ábráért is megkaphatja.
2. A világos és rendezett ábrázolás elfogadható indoklasként is.
3. A nem világos ábra esetén a vonatkozó pontszámok akkor adhatók, ha pl. numerikus behelyettesítéssel meggyőződik arról, hogy a közölt pontja illeszkedik a vizsgált pontthalmazra.


I.

1. a)			
A logaritmus azonosságait és a 10-es alapú logaritmus-függvény szigorú monotonitását felhasználva, megoldandó az $(x + 7)(3x + 1) = 100$ másodfokú egyenlet.	1 pont	A monotonitásra való hivatkozás nélkül is jár az 1 pont.	
Ennek gyökei: $x_1 = -\frac{31}{3}$; $x_2 = 3$.	2 pont		
Mivel a bal oldal értelmezése alapján $x > -\frac{1}{3}$, ezért az $x_1 = -\frac{31}{3}$ nem gyöke az egyenletnek. Az $x = 3$ kielégíti az eredeti egyenletet.	1 pont	Az 1 pont indoklással együtt adható. A hamis gyökök kizárása törőnhet behelyettesítéssel is.	
Összesen:	1 pont		
	5 pont		


1. b) első megoldás			
A jobb oldalon alkalmazva a hatványozás azonosságait, megoldandó az alábbi egyenlet: $2^x = 3 \cdot 9^x$.	2 pont		
Ebből rendezéssel kapjuk, hogy: $(4,5)^x = \frac{1}{3}$.	2 pont		
Innen $x = \log_{4,5}\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{\lg \frac{1}{3}}{\lg 4,5} \approx -0,7304$.	1 pont	Az exponenciális egyenlet gyökeként fogadjuk el a helyes közelítő értéket.	
A kapott gyökök kielégíti az eredeti egyenletet, mert ekvivalens átalakításokat végeztünk.	1 pont	Az ellenőrzést fogadjuk el közelítő értékkel is.	
Összesen:	6 pont		

1. b) második megoldás			
Mivel $3 = 2^{\lg_2 3}$, a hatványozás azonosságait alkalmazva $2^x = 3^{2x+1} = 2^{(2x+1)\lg_2 3}$.	2 pont		
A 2-es alapú exponenciális függvény szigorú monotonitása miatt $x = (2x + 1)\lg_2 3$.	1 pont	A monotonitásra való hivatkozás nélkül is jár az 1 pont.	
Az egyenlet megoldása $x = -\frac{\lg_2 3}{\lg_2 9 - 1} = -\frac{\lg_2 3}{\lg_2 4,5} = -\frac{\lg 3}{\lg 4,5} \approx -0,7304$	2 pont	Az exponenciális egyenlet gyökeként fogadjuk el a helyes közelítő értéket.	
A kapott gyökök kielégíti az eredeti egyenletet, mert ekvivalens átalakításokat végeztünk.	1 pont	Az ellenőrzést fogadjuk el közelítő értékkel is.	
Összesen:	6 pont		

2. a)		
Mivel a dobások során bármelyik helyen háromféle számot (0; 2; 4) dobhatunk, a rendezett számötösök száma $3^5 = 243$.	2 pont*	
Összesen:		2 pont
2. b)		
Ha a dobott pontok összegét tekintjük csak, és a dobások sorrendjét nem, akkor 10-et összegként háromféleképpen dobhattunk:		1 pont*
1. eset: $4 + 4 + 2 + 0 + 0 = 10$;		1 pont
2. eset: $4 + 2 + 2 + 2 + 0 = 10$;		1 pont
3. eset: $2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10$.		1 pont
Az 1. esetben ezt az 5 számot $\frac{5!}{2!2!} = 30$ -féle sorrendben dobhattuk.		2 pont
A 2. esetben ezt az 5 számot $\frac{5!}{3!} = 20$ -féle sorrendben dobhattuk.		2 pont
A 3. esetben ezt az 5 számot csak egyféle sorrendben dobhattuk.		2 pont*
A 10-es összeg tehát összesen 51-féleképpen állhatott elő.		
Összesen:		10 pont
<i>A *-gal jelölt részpontszámok akkor is adhatók, ha nem emnyire részletezők, de a leírásból világosan követhető a közölt gondolatmenet.</i>		

8. b)		
		
A $B \setminus A$ halmaz ábrázolása:	1 pont	
A $B \setminus A$ halmaz pontjai egy félkörlemez pontjai, amihez a félkörív és a belső pontok hozzá tartoznak, de a kör DE átmérője nem. (Az átmérő végpontjai: $D(0; -6)$ és $E(6; 2)$.)	2 pont	A teljes pontszámot megkaphatja akkor is, ha nem adja meg a D és E koordinátáit.
A pontthalmaz pontjai a DE átmérő fölött vannak.	1 pont	Bármilyen egyértelmű szöveges utalás arra, hogy melyik félkörlemezről van szó, 1 pont.
Összesen:		4 pont

8. a)



Az A halmaz pontjai az $y = \frac{4}{3}x - 6$ egyenletű egyenes alatti zárt felsík pontjai.	1 pont
Az A halmaz ábrájáért.	1 pont
$A \cap B$ halmaz pontjai az $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$ egyenletű kör és a kör belső pontjai.	1 pont
A kör középpontja $K(3; -2)$, sugara $r = 5$.	1 pont
$A \cap B$ halmaz ábrájáért.	2 pont
$A \cap C$ halmaz pontjai az $y = 2$ és az $y = -2$ egyenletű párhuzamos egyenesek pontjai.	1 pont
$A \cap C$ halmaz ábrájáért.	1 pont
Összesen:	8 pont

A teljes pontszámot az A és B halmaz leírása esetén akkor kaphatja meg, ha a pontthalmazok határoló vonalaira is világos az utalás.

3.

Mivel a háromszög szögeinek összege 180° , $\alpha + \gamma = 180^\circ - \beta$, valamint $\beta + \gamma = 180^\circ - \alpha$,	1 pont	<i>A részpontszámok akkor is adhatók, ha csak a későbbiek során derül ki, hogy ezeket az összefüggéseket helyesen használja a vizsgázó.</i>
és $\cos(180^\circ - \beta) = -\cos \beta$, valamint $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$.	1 pont	
A megadott egyenlőség pontosan akkor teljesül, ha $\sin \alpha : \sin \beta = \cos \beta : \cos \alpha$.	1 pont	
Ebből a $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = \sin \beta \cdot \cos \beta$ egyenlőség következik.	1 pont	
A kétszeres szög szinuszára vonatkozó azonosságot használva kapjuk, hogy $\sin 2\alpha = \sin 2\beta$.	3 pont	
Egy háromszögben bármely szög kétszeresének értéke 0° és 360° közé esik, ezért a fenti egyenlőség két esetben állhat fenn:	3 pont	
$2\alpha = 2\beta$ vagy $2\alpha + 2\beta = 180^\circ$.	2 pont	
Az első esetben $\alpha = \beta$, a háromszög két szöge egyenlő, a háromszög egyenlő szárú.	1 pont	
A második esetben $\alpha + \beta = 90^\circ$, a háromszögben $\gamma = 90^\circ$, a háromszög derékszögű.	1 pont	
Összesen:	14 pont	

4. a) első megoldás

Mivel hét pénzt dobunk fel, akkor lesz több fej, mint írás, ha 4; 5; 6 vagy 7 fejet dobunk.	2 pont	<i>A részpontszámok akkor is adhatók, ha nem ennyire részletesen, de a leírásból világosan követelhető a közölt gondolatmenet.</i>
Ekkor éppen 3; 2; 1 vagy 0 írás lesz.	1 pont	
Szimmetria okokból ennek ugyanannyi az esélye, mint ha 3; 2; 1 vagy 0 fejet dobunk volna.	2 pont	
Tehát a keresett valószínűség: 0,5	2 pont	
Összesen:	7 pont	

4. a) második megoldás		
A hét elemű fej-írás jelsorozat minden helyén előfordulhat a fej és írás is, ezért az egyenlő esélyű jelsorozatok száma: $2^7 = 128$.	2 pont	<i>A részpontszámok akkor is adhatók, ha nem ennyire részletezők, de a leírásból világosan követhető a közölt gondolatmenet.</i>
	2 pont	
Több fejet dobtunk, mint írást, tehát a fejek száma 4; 5; 6 vagy 7. $\binom{7}{4} + \binom{7}{5} + \binom{7}{6} + \binom{7}{7} = 35 + 21 + 7 + 1 = 64.$	2 pont	
A kedvező jelsorozatok száma tehát: $\frac{64}{128} = 0,5.$	1 pont	
A keresett valószínűség: $\frac{64}{128}$	7 pont	Összesen:

4. b)		
Akkor nagyobb a különbség 3-nál, ha 6 fej és 1 írás vagy 7 fej és 0 írás van.	3 pont	<i>A pontszám akkor is adható, ha nem ennyire részletező, de a leírásból világosan követhető a közölt gondolatmenet. Ha a fordított esetet is tekintetbe veszi a kedvező eseteknél, 2 pontot kap-hat.</i>
	2 pont	
	1 pont	
	1 pont	
	7 pont	Összesen:

II.

5. a)		
A lecsizolt testnek 24 csücsa van, mert a 8 kockacsücs helyett minden csücsnél 3-3 új csücs keletkezik (a negyedelő pontoknál).	1 pont	<i>1. A részpontszámok akkor is adhatók, ha nem ennyire részletezők, de a leírásból világosan követhető a közölt gondolatmenet.</i>
	1 pont	
A lecsizolt testnek 36 éle van, mert a 12 kocka élen maradnak élek, és a lemeosztett háromszögek oldalai is élek: $8 \cdot 3 = 24$, és $12 + 24 = 36$.	1 pont	
A lapok száma 14, mert a kockalapokból marad egy-egy nyolcszög, és a lemeosztett háromszögek száma 8, $6 + 8 = 14$.	1 pont	<i>2. A végeredmények pusztia közléséért leg-feljebb 2 pont adható.</i>
	3 pont	Összesen:

7. b)		
Látható tehát, hogy vannak olyan húrnégyszögek, amelyekre rendre igaz a tanórán elhangzott három állítás közül egy-egy: Zsófi állítása az 1., Peti állítása a 2., Kata állítása a 3. négyszögre igaz.	3 pont	
Az elhangzott három állítás viszont nem igaz egyszerre a probléma megoldását jelentő három húrnégyszög mindegyikére.		<i>Ha a vizsgázó megadja mind a három típusú húrnégyszöget, és közvetlenül arra utal, hogy a három állítás egyszerre nem igaz mindhárom tí-pusra, az utolsó 3 pontot kapja meg.</i>
	Összesen:	3 pont

Ha a vizsgázó egy húrnégyszöget vizsgál csak, és ennek megfelelően választja ki az igaz állítást, megoldására legfeljebb 5 pontot kaphat.

7. a)				
A húrnégyszögben a szemközti szögeinek összege 180° .		1 pont		A részpontszámok akkor is adhatók, ha nem emyíre részletezök, de a leírásból világosan követhető a közölt gondolatmenet.
A megadott arányszámok nem feltétlenül követik a szögek sorrendjét a négyszögben, ezért három esetet különböztetünk meg aszerint, hogy a három arányszám közül melyik két szög van egymással szemben.		3 pont		
A feltételben szereplő három szög legyen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ negyedik δ $\alpha + \gamma = 180^\circ$, így a három lehetőség:				
1. négyszög	α	β	γ	δ
	7e	6e	8e	e=12°
	84°	72°	96°	108°
2. négyszög	6f	7f	8f	f=90° 7
	540° 7=77,14°	90°	720° 7=102,86°	90°
3. négyszög	6g	8g	7g	g=180° 13
	1080° 13=83,08°	1440° 13=110,77°	1260° 13=92,92°	900° 13=69,23°
A helyesen megadott húrnégyszögenként			3-3 pont	A 3 pont bontása: az egység helyes kiszámítása: 1 pont a szemközti szögpárok helyes kiszámítása: 1+1 pont
Összesen:			13 pont	

5. b)							
A talapzat felszínét kiszámíthatjuk, ha a 6 db nyolcszög területéhez hozzáadjuk a 8 db szabályos háromszög területét.		1 pont	<i>A részpontszámok akkor is adhatók, ha nem emnyire részletezök, de a számolásból világosan követhető a közölt gondolatmenet.</i>				
A nyolcszög területe: a 12 dm oldalú négyzet területéből kivonjuk a 4 db egyenlő szárú derékszögű háromszög területét, vagyis 2 db 3 dm oldalú négyzet területét: $T_{nyolcszög} = 12^2 - 2 \cdot 3^2 = 126 \text{ (dm}^2\text{)}.$		2 pont					
A szabályos háromszög oldala $3 \cdot \sqrt{2}$, ezért $T_{háromszög} = \frac{a^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{9 \cdot \sqrt{3}}{2} \text{ (dm}^2\text{)}.$		2 pont					
$A = 6 \cdot T_{nyolcszög} + 8 \cdot T_{háromszög} = 756 + 36 \cdot \sqrt{3}$ ($\approx 818,35 \text{ dm}^2$).		1 pont					
		Összesen:	6 pont				
5. c)							
Legyen m az ajándéktárgy megrendelt tömege. Az összes tömeg 20m. Foglaljuk táblázatba a csiszolt ajándéktárgyakról tudott információkat.		2 pont	<i>A 2+2 pont akkor is jár, ha a helyes egyenletet világosan rögzített jelölésekkel írja fel a vizsgázó.</i>				
anyag	achát				hematit	zöld jade	gránát
gyakoriság	3 db				6 db	7db	4db
tömeg	0,99 m				0,995 m	1,015 m	
Jelöljük $(x \cdot m)$ -mel a gránátból készített ajándéktárgy valódi tömegét. Tudjuk, hogy a tényleges össztömeg 20m, innen $20 \cdot m = 3 \cdot 0,99m + 6 \cdot 0,995m + 7 \cdot 1,015m + 4 \cdot xm$.		2 pont					
Ebből következik, hogy $x = 0,98875$.		2 pont					
A gránát ajándéktárgyak tömege 1,125%-kal kisebb a megrendeltnél.		1 pont					
		Összesen:	7 pont				

6. a)

Táblázatba foglaljuk a képletek által kiszámított magasságokat az eltelt évek függvényében:

	1970	1980	1990	2000
t	1	11	21	31
$m(t)$	7	11,2	11,5	11,7
$h(t)$	6,3	12,0	15,7	18,7

Helyes ábrázolások:

mandzsu fűz: hegyi mamutfenyő:

2 pont

2+2 pont

Összesen: 6 pont

Ha a vizsgáló függvénytranszformáció lépéseire támaszkodva vagy bármely más függvényábrázolási módszerrel jó megoldást ad, $m(t)$ ábrájára 3 pontot, $h(t)$ grafikonjára 3 pontot kaphat. A helyettesítési értékeket ekkor is fel kell tüntetnie.

írásbeli vizsga 06218 / 152006. október 25.

Matematika — emelt szint

Javítási-értékelési útmutató

6. b)

Megoldandó a $10,5 = 5 \cdot \sqrt{0,4t + 1} + 0,4$ egyenlet.
Rendezés után kapjuk, hogy $t \approx 7,7$.

A kívánt magasságot a mamutfenyő a 8. évben, vagyis $(1969 + 8 =)$ 1977-ben érte el.

Összesen: 4 pont

6. c)

A megadott függvény menetét a derivált előjelvizsgálatával állapítjuk meg.
A derivált: $g'(t) = 3t^2 - 33t + 72$.
A derivált értéke 0, ha $t = 3$ vagy $t = 8$.
A derivált mindkét nullhelyénél előjelet vált, a két nullhely közötti t értékekre a derivált negatív, ezért a $g(t)$ függvény ezen a tartományon $(3 < t < 8)$ szigorúan monoton csökkenő.
A fa magassága nem csökkenhet az arborétumban, ezért a $g(t)$ függvény egyetlen fa növekedését sem írhatja le.

Összesen: 6 pont

1. Minden jó érvelés elfogadható megoldásként. Ha a vizsgáló pl. megfelelő helyettesítési értékek összevetésével utal arra, hogy $g(t)$ függvény értéke nagyobb t értéknél kisebb lett, megoldása teljes értékű lehet.

2. Megadjuk néhány egész t értékénél $g(t)$ értékét:

évek száma	t	1	3	5	8	10	11	15	21
magasság (cm)	$g(t)$	116,6	154,5	132,5	92	130	186,5	802,5	3556,6

3. Ha a táblázatos módszerrel nem találja meg a csökkenő tartományt, és próbálkozásából nem derül ki, hogy a monotonitást vizsgálja, megoldására legfeljebb 1 pontot kapjon.

4. Ha a táblázatos módszerrel nem találja meg a csökkenő tartományt, de a próbálkozásából kiderül, hogy a monotonitást vizsgálja, megoldására legfeljebb 2 pontot kapjon.

írásbeli vizsga 06219 / 152006. október 25.