


c)

Az ábra jelöléseit használjuk, ahol  $0 \leq x \leq 1.9$ .Az ábra alapján  $T = 4y^2$ -et (ami a hasznos alapterület) kell kifejezni  $x$  segítségével.

A két kissébb háromszög megfelelő szögei egyenlők, tehát hasonlóak.

Igy:  $\frac{3.1}{y} = \frac{1.9 - x}{3 - y}$ .Innen  $y = \frac{9.3}{5 - x}$ .Tehát a keresett összefüggés:  $4y^2 = \left(\frac{18.6}{5 - x}\right)^2$ .Ha  $x \geq 1.9$ , akkor  $36 \text{ m}^2$  a hasznos alapterület.

Összefoglalva:

$$T(x) = \begin{cases} \left(\frac{18.6}{5 - x}\right)^2, & \text{ha } 0 \leq x < 1.9 \\ 36, & \text{ha } 1.9 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

Megjegyzés: ha az első feltételben  $x \leq 1.9$  szerepel és/vagy a második feltételben  $1.9 \leq x$ , akkor is 1 pont jár.**Összesen: 6 pont**

Megjegyzés: ha a vizsgázó helyes összefüggések alkalmaz, de ábrát nem készít, akkor az ábrának feltüntetett pontszámok értelmezésüen járnak.


**ERETTSÉGI VIZSGA • 2007. május 8.****MATEMATIKA****EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI  
ÉRETTSÉGI VIZSGA****JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI  
ÚTMUTATÓ****OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS  
MINISZTÉRIUM**

## Fontos tudnivalók

### Formai előírások:

- A dolgozatot a vizsgázó által használt színűlől eltérő színű tollal kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb.
  - A feladatak mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám** a melléte levő **téglalapba** kerüli.
  - Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
  - Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes részponiszámokat is írja rá a dolgozatra.
- Tartalmi kérdések:**
- Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól eltérő **megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
  - A pontozási útmutató ponjai tövább **bonthatók**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
  - Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szerzőlőnél kevésbé részletezett.
  - Ha megoldásban **szamolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredményt helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részponiszámokat meg kell adni.
  - Ewi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formalisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel, mint kiinduló adattal helyesen számolt tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdesben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változik meg.
  - Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **mértek jegyzés** vagy **mértekégyseg**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
  - Egy feladatra adott többféle helyes megoldási próbálkozás közül a **vizsgázó által megijelölt választat** értékelhető. (Ha a vizsgázó nem jelölte ki az értékelendő választat, a javító tanár a legutolsó megoldási próbálkozást értékeljel)
  - A megoldásokat **jutalompon** (az adott feladatra vagy feladatréssze előírt maximális pontszámot meghaladó pont) nem **adható**.
  - Az olyan részszámításokról, részrésekéről nem jár **pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
  - A vizsgafeladatsor II. részében kitüntött 5 feladat közül csak 4 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltételezőleg – megijelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összponiszámába. Ennek megfelelően a megijelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelní.

### 9.



Formai előírások:


A padlásíakra és a teflosíkra egyaránt merőleges síkmetszetből lehet a keresett szögöt meghatározni.

A kereszmtsízeti ábrán a keresett szögöt  $\alpha$ -val jelölve, felírható, hogy  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{s}{5}$ ,

ahonnan  $\alpha \approx 59^\circ$ .

**Összesen: 4 pont**  
Ha nem a két sík Hajlászögét számítja ki, akkor nem kaphat pontot.

### b)



Keresseük az ábrán s-sel jelölt szakasz hosszát.

Hasonlóság alapján:  $\frac{1.9}{3-s} = \frac{5}{3}$ .

Ebből  $s = 1.86$ .

A hasznos alapterület:  $4s^2 \approx 13,84 \text{ m}^2$ .

**Összesen: 6 pont**  
Mértekézség nélküli ez a pont nem jár.

**8.**

<b>a)</b>	A dohányosok relatív gyakorisága az első cégnél $\frac{255}{800}$ ( $\approx 0,32$ ), második cégnél: $\frac{680}{2000}$ ( $= 0,34$ ).	2 pont
	<b>Összesen:</b> <b>4 pont</b>	

**b)**

Bármelyik 3 személy kiválasztása a 2000-es mintából egyformán lehetséges, ezért az összes esetek száma: $\binom{2000}{3}$ ( $= 1331334000$ ).	1* pont
680 dohányosból kell kiválasztani egy személyt, ami 680-rékképpen lehető meg.	1* pont
1320 nem dohányzóból kell kettőt kiválasztani, ez összesen $\binom{1320}{2}$ -rékképpen lehető meg (ami =870540-vel).	1* pont
A kedvező esetek száma: $680 \cdot \binom{1320}{2}$ .	1* pont

A keresett valószínűség:  $\frac{680 \cdot \binom{1320}{2}}{\binom{2000}{3}}$ .

Ennek közeliítő értéke: 0,44.

**Összesen:** **7 pont**

c) I nem dohányos kiválasztásának a valószínűsége:  $1 - 0,34 = 0,66$ .

10 nem dohányos kiválasztásának a valószínűsége:  $0,66^{10} \approx$

$\approx 0,016$  vagy 1,6%.

**Összesen:** **5 pont**

Ha a vizsgázó megad egy konkrét lakosságszámot (pl. 100 fő), és azzal helyesen dolgozik, megtoldására legfeljebb 3 pontot kapjon.

x = 2 megtoldás.

**Összesen:** **11 pont**

**1.**

<b>8.</b>	<b>1. megoldás</b>
A) $\sin \frac{\pi}{2} = 1$ .	1 pont
$ \lg 1  = 0$ .	1 pont
$2^{\log_2 9} = 9$ .	1 pont
Igy az $\frac{x^2 - 10x - 24}{x^2 - x - 6} = 10$ egyenletet kell megoldani.	

Ebből $x^2 = 4$ .	4 pont
$x_1 = 2$ .	1 pont
$x_2 = -2$ .	1 pont
Ellenőrzés:	
x = 2 megtoldás.	1 pont
x = -2 nem megtoldás.	1 pont

**Összesen: 11 pont**

Ha vizsgálja az értelmezési tartományt, és ennek alapján az  $x = -2$ -t kizára, az  $x = 2$ -t pedig az ÉT alapján elfogadjá (se nem ellenőri, se nem hivatkozik ekvivalens átalakításokra), akkor maximum 10 pont jár.

Ha a feladat megtoldása során a tanuló csak az értelmezési tartományt vizsgálja ( $x \neq -2$  és  $x \neq 3$ ), és más értékelhető elemet nem tartalmaz a megtoldás, akkor a helyes értelmezési tartomány megállapításáért 2 pont jár.

<b>2. megoldás</b>	
$x^2 - 10x - 24 = (x+2)(x-12)$ .	1 pont
$x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3)$ .	1 pont
$x \neq -2$ .	1 pont
$\frac{x^2 - 10x - 24}{x^2 - x - 6} = \frac{x-12}{x-3}$ .	1 pont
$\sin \frac{\pi}{2} = 1$ .	1 pont
$ \lg 1  = 0$ .	1 pont
$2^{\log_2 9} = 9$ .	1 pont
Behelyettesítve az egyszerűsített egyenletbe:	
$\frac{x-12}{x-3} = 10$ .	1 pont
$x=2$ .	2 pont
Ellenőrzés:	
x = 2 megtoldás.	1 pont
<b>Összesen: 11 pont</b>	

<b>2.</b>	
a)	<p>A szokásos jelölésekkel: <math>\operatorname{tg} \beta = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}</math>.  <math>\beta \approx 18,43^\circ</math>.  Ekkor <math>\alpha = 90^\circ - \beta \approx 71,57^\circ</math>.</p> <p><b>Összesen: 3 pont</b></p> <p>Minden helyesen (egészre, tizedre) kerekített érték elfogadható.</p>

<b>b)</b>	<p>Jelöljük a derékszögű háromszögeben a <math>PB</math> szakasz hosszát <math>x</math>-szel.</p> <p>A <math>PCA</math> derékszögű háromszöghben:  <math>6^2 + (18-x)^2 = x^2</math>.  <math>36 + 324 - 36x + x^2 = x^2</math>.  <math>x = 10</math>.</p> <p>Tehát <math>PB = 10</math> cm.</p> <p><b>Összesen: 6 pont</b></p> <p>Más megoldás esetén az adatok helyes rögzítésére (szövegen vagy ábrán) 1 pont; az <math>AB</math> szakasz kiszámolásáért 1 pont; a <math>PB</math> kiszámításáért (kiszámítástelel vagy szinusztelel) vagy szöglígyen segítséggel 4 pont, jár a hevesen kerülhetőtől számolva is.</p>
-----------	---

<b>2. megoldás</b>	
Az egyes lehetőségek felsorolása: a szám 6 db egyest, 5 db egyest, ... 1 db egyest tartalmaz.	1 pont
Azoknak a számoknak a darabszáma, amelyekben 6 db egyes van: 1; 5 db egyes van: 29; 4 db egyes van: 350; 3 db egyes van: 2250; 2 db egyes van: 8125; 1 db egyes van: 15 625.	4 pont
Ezek összege adja meg az eredményt. 26 380 ilyen hajegyű szám van.	1 pont
<b>Összesen: 7 pont</b>	1 pont

<b>7.</b>	
a)	$\binom{6}{3}$ <p>2 pont Ha szisztematikusan felsorolja az összes háromelemű halmazt, akkor is teljes pontszám jár. Ha kihagy 1–3 esetet, akkor 1 pont, ha ennél többet, akkor 0 pont jár.</p>
A háromelemű részhalmazok száma: 20.	1 pont <b>Összesen: 3 pont</b>

c)		<p>Ezt elegendő az ábrán is jelölni.</p> <p>Tekintsük a tétraéder alapjának az <math>ABC</math> háromszöget, ekkor a testmagasság <math>CD</math> lesz.  <math>m = 15</math> cm.</p> <p>Az <math>ABC</math> háromszög területe: <math>54 \text{ cm}^2</math>.</p> $V = \frac{Tm}{3}$ $V = \frac{54 \cdot 15}{3}$ <p>Igy a keresett térfogat: <math>270 \text{ cm}^3</math>.</p> <p><b>Összesen: 4 pont</b></p>	<p>Ezt elegendő az ábrán is jelölni.</p> <p>A mértékegység nélküli válasz I pont</p>
----	--	--	--

b)	<p>Egy szám 5-tel osztható, ha nullára vagy ötre végződik.</p> <p>Nullára végződő hatjegyű számból 5! van.</p> <p>Ötre végződő hatjegyű számból 4·4! van.</p> <p><math>\text{Összesen: } 5! + 4 \cdot 4! = 120 + 96 = 216.</math></p> <p><b>Összesen: 6 pont</b></p>	<p>Ha ezt nem írja le, de a megoldásban felhasználja, akkor is jár ez a pont.</p> <p>Ha nem veszi figyelembe, hogy nullával nem kezdődhet a szám, akkor 0 pont jár.</p> <p>1 pont</p> <p>1 pont</p> <p><b>Összesen: 6 pont</b></p>	<p>Ha ezt nem írja le, de a megoldásban felhasználja, akkor is jár ez a pont.</p> <p>Ha nem veszi figyelembe, hogy nullával nem kezdődhet a szám, akkor 1 pont jár.</p> <p>1 pont</p> <p>1 pont</p> <p><b>Összesen: 7 pont</b></p>
c)	<p><b>1. megoldás</b></p> <p>Komplementér halmaz segítségével számolható ki.</p> <p>Az összes hatjegyű szám: <math>5 \cdot 6^5</math>.</p> <p>Azok a hatjegyű számok, amelyekben nincs egyes: <math>4 \cdot 5^5</math>.</p> <p>Tehát: <math>5 \cdot 6^5 - 4 \cdot 5^5 = 38\ 880 - 12\ 500 = 26\ 380</math> ilyen hatjegyű szám van.</p> <p><b>Összesen: 7 pont</b></p>	<p>1 pont Ha ezt nem írja le, de a megoldásban felhasználja, akkor is jár ez a pont.</p> <p>2 pont Ha nem veszi figyelembe, hogy nullával nem kezdődhet a szám, akkor 1 pont jár.</p> <p>2 pont Ha nem veszi figyelembe, hogy nullával nem kezdődhet a szám, akkor 1 pont jár.</p> <p>1 pont</p> <p>1 pont</p> <p><b>Összesen: 7 pont</b></p>	<p>1 pont Ha ezt nem írja le, de a megoldásban felhasználja, akkor is jár ez a pont.</p> <p>2 pont Ha nem veszi figyelembe, hogy nullával nem kezdődhet a szám, akkor 1 pont jár.</p> <p>1 pont</p> <p>1 pont</p> <p><b>Összesen: 7 pont</b></p>

**3.****1. megoldás**A mértani sorozat tagjai:  $a; aq; aq^2$ .

$$(1) \quad a + aq + aq^2 = 26.$$

A számtani sorozat tagjai:

$$a + 1; \quad aq + 6; \quad aq^2 + 3.$$

Ezért:  $aq + 6 = \frac{a + 1 + aq^2 + 3}{2}$ .

Rendezve:

$$(2) \quad a - 2aq + aq^2 = 8.$$

A két egyenlet különbsége:  $3aq = 18$ ,

$$\text{ahonnan } q = \frac{6}{a}.$$

Behelyettesítve az (1)-be:

$$a + a \cdot \frac{6}{a} + a \cdot \left(\frac{6}{a}\right)^2 = 26.$$

Ebből:  $a^2 - 20a + 36 = 0$ .

A másodikú egyenlet gyökei:

$$a = 2 \quad \text{és} \quad a = 18.$$

Visszahelyettesítés után:

$$q_1 = 3,$$

$$q_2 = \frac{1}{3}.$$

Tehát a keresett számtani sorozat első három tagja:

$$3; 12; 21,$$

$$\text{illetve: } 19; 12; 5.$$

Ezek megfelelnek a feladat feltételeinek.

**Összesen: 14 pont****6.****a)**

10 kg leszedett szilvából kimagozás után 9,5 kg szilva lesz.

A 9,5 kg kimagozott szilvában 90% víz, míg 10%-, araz 0,95 kg a szárazanyag-tartalom.

A 10 kg nyers szilvából készült aszalt szilvában ez a 0,95 kg a feltétel szerint a tömeg 95%-a, hiszen csak 5%-a víz.

Tehát keressük, hogy hány kg-nak a 95%-a lesz 0,95 kg. Igy addik a 100%-ra 1 kg.

Azaz 10 kg szilvából valóban mindenkor 1 kg aszalt szilva lesz.

*A pontok akkor is járnak, ha a számlálásból világosan kidérül a gondolatmenet.***b)**Ha  $x$  kg volt a termése, akkor a feltétel szerint:  $\frac{x}{2} \cdot 120 + \frac{x}{2} \cdot 0,1 \cdot 1400 = 286000$ . $x = 2200$  kg volt a termése.**Összesen: 6 pont****c)**A:  $150^\circ \cdot \frac{150^\circ}{360^\circ} = \frac{5}{12}$  rész; (300 kg)B:  $90^\circ \cdot \frac{90^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{4}$  rész; (180 kg)C:  $18^\circ \cdot \frac{18^\circ}{360^\circ} = \frac{1}{20}$  rész; (36 kg)D:  $102^\circ \cdot \frac{102^\circ}{360^\circ} = \frac{17}{60}$  rész. (204 kg)

Az átlagár a súlyozott közép:

$$120 \cdot \frac{5 \cdot 720}{12} + 200 \cdot \frac{720}{4} + 230 \cdot \frac{720}{20} + 260 \cdot \frac{17 \cdot 720}{60} = \frac{1111}{720} = 185,17.$$

Tehát az átlagár kb. 185 Ft.

**Összesen: 7 pont***Mértékegység nélküli ez a pont nem jár.**Minden helyesen (egészre, tizedre) került ki a fogadható.*

<b>2. megoldás</b>	
$\int_{-3}^3 (x^2 - 6x + 9) dx = \int_{-3}^3 (x - 3)^2 dx =$	1 pont
$= \left[ \frac{(x-3)^3}{3} \right]_{-3}^3 =$	3 pont
$= 0 - (-72) = 72.$	2 pont

**Összesen: 6 pont**

Tehát a keresett számtani sorozat első három tagja: 3; 12; 21, illetve: 19; 12; 5. Ezek megfelelnek a feladat feltételeinek: a mértani sorozat megfelelő tagai: 2; 6; 18 illetve 18; 6; 2.	1 pont 1 pont 2 pont
<b>3. megoldás</b>	<b>Összesen: 14 pont</b>
A mértani sorozat tagjai: $\frac{a}{q}; a; aq.$	
$\frac{a}{q} + a + aq = 26.$	1 pont
A feladat szerint az egyes tagok értékét megnövelte kapjuk:	
$\left(\frac{a}{q} + 1\right) + (a + 6) + (aq + 3) = 36.$	3 pont
A számtani sorozat tulajdonságai miatt $a + 6 = 12.$	2 pont
Tehát $a = 6.$	1 pont
$6 \cdot \left( \frac{1}{q} + q + 1 \right) = 26$	
$3q^2 - 10q + 3 = 0$	2 pont
$q_1 = \frac{1}{3}$	1 pont
$q_2 = 3$	1 pont
Tehát a keresett számtani sorozat első három tagja: 3; 12; 21, illetve: 19; 12; 5. Ezek megfelelnek a feladat feltételeinek.	1 pont 1 pont 1 pont
<b>Összesen: 14 pont</b>	

**4.**

<b>a)</b>	A helyes parabola ábrázolása az adott intervallumban.	3 pont	<i>Ha nem a megadott intervalumon ábrázol, akkor 2 pont.</i>
	<b>Összesen:</b> 3 pont		Helyes ábra esetén magyarázzat hiányra miatt ne vonjunk le pontot!

**b)****I. megoldás**

A parabola egy adott pontjában húzott érintő meredekségét itt az első derivált segítségével kaphatjuk meg.  
 $y' = 2x - 8$ .

Az érintései pont első koordinátájának behelyettesítésével:  $y'(5) = 2 = m$ .

$$\begin{aligned} y &= mx + b \quad P(5; -4), \\ -4 &= 10 + b, \\ b &= -14. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Az érintő egyenlete: } y &= 2x - 14. \quad \text{Összesen: 10 pont} \end{aligned}$$

**2. megoldás**

Az érintő nem párhuzamos az  $y$ - tengellyel, ezért egyenletét  $y = mx + b$  alakban keressük.  
 A  $P(5; -4)$  koordinátáit behelyettesítve:

$$\begin{aligned} -4 &= 5m + b, \\ b &= -4 - 5m. \end{aligned}$$

Visszahelyettesítve:  $y = mx - 4 - 5m$ .

Ha a következő egyenletrendszernek egy megoldása van, akkor a keresett egyenes érintő lesz.  

$$\begin{cases} y = x^2 - 8x + 11 \\ y = mx - 4 - 5m \end{cases}$$

$$\begin{aligned} mx - 4 - 5m &= x^2 - 8x + 11 \\ x^2 - 8x - mx + 15 + 5m &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= (-8 - m)^2 - 4(15 + 5m) = 0 \\ m^2 - 4m + 4 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m &= 2 \\ b &= -14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Az érintő egyenlete: } y &= 2x - 14. \quad \text{Összesen: 10 pont} \end{aligned}$$

*Ha a vizsgázó az érintő egyenletéről olyan térel (ismeret) alapján írja fel, amely nem tartozik a vizsgakövetelményekhez, akkor a félhasznált tétele pontosan kell hivatkoznia. Ennek elmaradása esetén legfeljebb 8 pont adható.*

**II.****Az 5–9. feladatok közül a tanuló által megjelölt feladatot nem kell értékelni.****5.**


<b>a)</b>	$x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$ .	1 pont	<i>Magyarázó szöveg nélkül is jár az 1 pont.</i>
	Mivel ez minden valós $x$ értékre nemnegatív, ezért a legbővebb részhalmaz az $\mathbf{R}$ .	1 pont	<b>Összesen: 2 pont</b>

**b)**

<b>a)</b>	$\sqrt{(x-3)^2} =  x-3 $ .	2 pont	<i>Ha nem jelöli az abszolútértéket, de esetleg választással indokol, akkor is jár a 2 pont.</i>
			<b>Összesen: 2 pont</b>

**b)**

<b>a)</b>	$f(x) = \sqrt{x^2 - 6x + 9}$ .	3 pont	<i>Ha a grafikon jól, de az intervallum nem, akkor 2 pont jár.</i>
			<b>Összesen: 3 pont</b>

**c)**

<b>A:</b> Hamis.	1 pont	<i>Az állítások igazságártalmát a tanuló által felrajzolt függvény alapján kell eldönteneni.</i>
<b>B:</b> Hamis.	1 pont	
<b>C:</b> Igaz.	1 pont	

**Összesen: 3 pont****d)**

<b>1. megoldás</b>	$\int_{-3}^3 (x^2 - 6x + 9) dx = \left[ \frac{x^3}{3} - 3x^2 + 9x \right]_3 =$	3 pont	
	$= (9 - 27 + 27) - (-9 - 27 - 27) =$	2 pont	<i>Ajánlásményért, a számítás részletezése nélkül is 3 pont adható.</i>
	$= 9 - (-63) = 72.$	1 pont	
		<b>Összesen: 6 pont</b>	