

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 4.

MATEMATIKA

**EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI
ÉRETTSÉGI VIZSGA**

**JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI
ÚTMUTATÓ**

**OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTERIUM**

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

1. A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal** kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám** a mellette levő **téglalapba** kerül.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.

Tartalmi kérések:


1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szereplőnél **kevésbé részletezett**.
4. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
5. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel, mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változik meg.
6. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
7. Egy feladatra adott többféle helyes megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**.
8. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. **A vizsgafeladatsor II. részében kitűzött 5 feladat közül csak 4 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladatra értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

9. b)		
A parabola és az x tengely által közrefogott terület (T) mértéke az $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = x^2 - 4x - 12$ függvény két zérushelye közötti határozott integráljának ellentettje.	2 pont	<i>Jár a 2 pont akkor is, ha ezt a vizsgázó nem írja le, de a számításokat ennek megfelelően jól végzi.</i>
$T = -\int_{-2}^6 (x^2 - 4x - 12) dx = -\left[\frac{x^3}{3} - 2x^2 - 12x\right]_{-2}^6 =$	1 pont	
$= -\left(\left[\frac{6^3}{3} - 2 \cdot 6^2 - 12 \cdot 6\right] - \left[\frac{(-2)^3}{3} - 2 \cdot (-2)^2 - 12 \cdot (-2)\right]\right) =$	1 pont	
$= -\left((72 - 72 - 72) - \left(-\frac{8}{3} - 8 + 24\right)\right) =$	1 pont	
$= \frac{256}{3}$	1 pont	
<i>Ha a vizsgázó az ABC háromszög területét az a) kérdés megválaszolása során már kiszámolta, jó eredményt kapott, és itt csak hivatkozik rá, ez az 1 pont akkor is jár.</i>		
Az ABC háromszög területe: $T_{ABC} = \frac{8 \cdot 16}{2} = 64$.	1 pont	
A kérdéses arány: $\frac{T_{ABC}}{T} = \frac{64}{256} = \frac{3}{4}$.	1 pont	
Összesen:	8 pont	

I.		
1. a) első megoldás		
Az első egyenlet bal oldala (a kiindulási halmazon): $\log_2(xy^3) = \log_2 x + 3 \log_2 y$.	1 pont	
A második egyenlet bal oldala: $\log_2(x^2 y) = 2 \log_2 x + \log_2 y$.	1 pont	
Így az egyenletrendszer: $\log_2 x + 3 \log_2 y = 1$ $2 \log_2 x + \log_2 y = -3$. (Az első egyenlet kétszereséből kivonva a második egyenletet kapjuk:) $5 \log_2 y = 5 \Leftrightarrow \log_2 y = 1$, ahonnan $y = 2$.	1 pont	
Visszahelyettesítve: $\log_2 x = -2$,	1 pont	
ahonnan $x = 2^{-2} = \frac{1}{4}$.	1 pont	
A kapott pozitív értékek kielégítik az egyenletrendszert (ellenőrzés).	1 pont	
Összesen:	7 pont	
1. a) második megoldás		
A logaritmus definíciója alapján (a kiindulási halmazon) $\log_2(xy^3) = 1 \Leftrightarrow xy^3 = 2$,	1 pont	
$\log_2(x^2 y) = -3 \Leftrightarrow x^2 y = \frac{1}{8}$.	1 pont	
A második egyenletből $y = \frac{1}{8x^2}$,	1 pont	<i>Ezt a 2 pontot megkapja, ha a második egyenlet köbét az első egyenlettel osztva jut az $x^5 = \frac{1}{2^{10}}$ összefüggéshez; vagy ha az első egyenlet negyzetét a második egyenlettel osztva jut az $y^5 = 2^5$ összefüggéshez.</i>
amit az első egyenletbe helyettesítve $\frac{1}{512x^5} = 2$,	1 pont	
ahonnan $x = 2^{-2} = \frac{1}{4}$.	1 pont	
Visszahelyettesítve $y = 2$.	1 pont	
A kapott pozitív értékek kielégítik az egyenletrendszert (ellenőrzés).	1 pont	
Összesen:	7 pont	


1. b) (Legyen n a kifejezés pozitív egész értéke.) $n = \log_{3^4} 729 = \log_{3^4} 3^6$, vagyis $(3^4)^n = 3^6$. Mivel k és n pozitív egész szám, ezért k pozitív osztója a 6-nak. k lehetséges értékei: 1, 2, 3, 6.	1 pont 1 pont 1 pont 2 pont
Összesen:	5 pont
<i>1. Ha a vizsgáló k-ra csak két vagy három lehetséges értéket ad meg, akkor az utolsó 2 pontból csak 1 pontot kapjon. Egy megoldás esetén nem jár a 2 pont.</i>	
<i>2. Ha a vizsgáló a $\log_{3^4} 729$ értékét helyesen kiszámítja az első hat pozitív k érték esetén, de nem mutatja meg, hogy 6-nál nagyobb egész k-ra a kifejezés értéke nem egész (1-nél kisebb pozitív szám), legfeljebb 3 pont adható.</i>	

2. a)

	
Mivel $\overline{AB}(4;1)$,	1 pont
$\overline{DC}(8;2)$,	1 pont
így $\overline{DC} = 2\overline{AB}$. Ezért $\overline{AB}$ és $\overline{DC}$ párhuzamos, az $ABCD$ négyszög tehát trapéz.	1 pont 1 pont
<i>Ha a négyszög trapéz voltát a vizsgáló számolás megjelölése nélkül, csak az ábráról olvassa le, 1 pontot kapjon.</i>	

9. a) második megoldás	
A parabola egyenletét alakítva: $y = x^2 - 4x - 12 = (x - 2)^2 - 16 = (x + 2)(x - 6)$.	1 pont
Az ABC háromszög egyenlő szárú, csúcsai a parabola egyenletének különböző alakjaiból kiolvashatók: $A(-2; 0)$, $B(6; 0)$, $C(2; -16)$.	1 pont
Ezek alapján $AB = 8$, az AB alaphoz tartozó magasság $m = 16$, és a Pitagorasz-tétel alapján $AC = BC = \sqrt{4^2 + 16^2} = \sqrt{272} (= 4\sqrt{17} \approx 16,49)$.	1 pont
Jelölje O a beírt kör középpontját, E az AC szárral vett érintési pontját, F pedig az AB alap felezőpontját. Az EOC derékszögű háromszög hasonló az FAC háromszöghöz,	2 pont
amiből adódik, hogy $\frac{16 - r}{r} = \frac{AC}{FA} = \frac{4\sqrt{17}}{4} = \sqrt{17}$.	1 pont
Innen $r = \frac{16}{\sqrt{17} + 1} (= \sqrt{17} - 1 \approx 3,12)$.	1 pont
Összesen:	8 pont

9. a) első megoldás



A parabola egyenletét alakítva: $y = x^2 - 4x - 12 = (x - 2)^2 - 16 = (x + 2)(x - 6)$.	1 pont
Az ABC háromszög egyenlő szárú, csúcsai a parabola egyenletének különböző alakjaiból kiolvashatók: $A(-2; 0)$, $B(6; 0)$, $C(2; -16)$.	1 pont
Ezek alapján $AB = 8$, az AB alaphoz tartozó magasság $m = 16$, és a Pitagorasz-tétel alapján $AC = BC = \sqrt{4^2 + 16^2} = \sqrt{272} (= 4\sqrt{17} \approx 16,49)$.	1 pont
A beírt kör r sugara meghatározható a $t = r \cdot s$ képlet alapján, ahol t a háromszög területe, s pedig kerületének fele.	1 pont
Az ABC háromszög területe: $T_{ABC} = 64$;	1 pont
kerülete: $K_{ABC} = 8(\sqrt{17} + 1) \approx 40,98$.	1 pont
Így $r = \frac{T_{ABC}}{K_{ABC}} = \frac{2T_{ABC}}{K_{ABC}} = \frac{16}{\sqrt{17} + 1} (= \sqrt{17} - 1 \approx 3,12)$.	1 pont
Összesen:	8 pont

2. b)		
Az n csúcús teljes gráfnak $\frac{n(n-1)}{2}$ éle van.	1 pont	Ez a pont akkor is jár, ha a gondolat a megoldásban jelenik meg.
$\frac{n(n-1)}{2} = 253$;	1 pont	
$n^2 - n - 506 = 0$.	1 pont	
$n_1 = 23$;	1 pont	
$n_2 < 0$, a feladatnak nem megoldása.	1 pont	
A gráf 23 csúcús, tehát 19 új gráfcúcsot kellett felvenni.	1 pont	
Az n csúcús összefüggő gráfnak minimum $n-1$ éle van,	1 pont	
így legfeljebb 231 él törölhető ki.	1 pont	
Összesen:	12 pont	

3. a)		
Ha $10 \leq x \leq 20$ (x egész), akkor $B(x) = 16000x$.	1 pont	
Ha $20 < x \leq 36$ (x egész), akkor az engedmény mértéke $400 \cdot (x - 20)$ fejenként,	1 pont	
így $B(x) = 16000x - 400 \cdot (x - 20) \cdot x = 400x(60 - x)$.	2 pont	
Összefoglalva: $B(x) = \begin{cases} 16000x, & \text{ha } 10 \leq x \leq 20 \text{ (x egész)} \\ 400x(60 - x), & \text{ha } 20 < x \leq 36 \text{ (x egész)} \end{cases}$	1 pont	Ez az 1 pont akkor is jár, ha nem adja meg a vizsgáló a függvény összefoglalt alakját, de a két részütemvállumra pontos képletet ad.
Az értelmezési tartomány $x \in \mathbf{N}$; $10 \leq x \leq 36$.	1 pont	
Összesen:	6 pont	
Ha a képletek érvényességi feltételére sehol sincs utalás, legfeljebb 3 pont adható.		

3. b)

A $B(x)$ bevételi függvény $10 \leq x \leq 20$ esetén (szigorúan növekvő lineáris függvény, ezért) maximumát $x = 20$ esetén veszi fel, és $B(20) = 320\,000$.	1 pont	
A bevételi függvény hozzárendelési szabálya $20 < x \leq 36$ esetén: $400x(60 - x) = -400x^2 + 240\,000x = -400(x - 30)^2 + 360\,000$	2 pont	<i>Ez a 2 pont nem bontható.</i>
A $-400(x - 30)^2 + 360\,000$ -nek maximuma van, ha $x = 30$.	1 pont	
Mivel $20 < 30 \leq 36$ és a 30 egész szám, ezért a 30 a B-nek lokális maximumhelye.	1 pont	
A lokális maximum értéke 360 000 Ft.	1 pont	<i>Ha a vizsgázó a lokális szélsőérték-helyet és a szélsőértéket deriválással vagy a zérushelyek számítani közepe segítségével határozza meg, de nem utal arra, hogy a módszer csak az eredeti függvény folytonos kiterjesztésére alkalmazható, akkor az 5 pontból legfeljebb 3 pontot kaphat.</i>
A bevétel 30 utas esetén lesz maximális (mert $B(20) < B(30)$), a maximum 360 000 Ft.	1 pont	
Összesen:	7 pont	
<i>Ha a vizsgázó táblázatot készít, abban minden egész helyen megadja a B függvény értékét, és a maximumot, illetve a maximumhelyet a táblázatból határozza meg jól, akkor kapja meg a b) kérdésre a teljes pontszámot. Hasonlóképpen jár a teljes pontszám, ha a vizsgázó a függvény grafikonját rajzolja fel jól, és arról olvassa le a szélsőértéket és a szélsőérték-helyet. Ha megoldás hiányos, akkor a fenti pontozásnak megfelelő levonások érvényesek.</i>		

8.

Legyen $a_1 = a$. Ekkor (1) alapján $b_1 = 2a$, $c_1 = 4a$.	1 pont										
Jelöljük az $\{a_n\}$ sorozat hányadosát q -val. Ekkor (2) alapján $\{b_n\}$ hányadosa $q + 1$, $\{c_n\}$ hányadosa $q + 2$.	1 pont	<i>Mivel az első és a második sorozat harmadik tagjának felírása a további számításokhoz nem kell, az 5 pont ezen két tag felírása nélkül is jár erre a részre.</i>									
A három sorozat első három tagja ezek után így írható fel: a aq aq^2	1 pont										
$2a$ $2a(q + 1)$ $2a(q + 1)^2$	1 pont										
$4a$ $4a(q + 2)$ $4a(q + 2)^2$	1 pont										
A további összefüggések: (3) $aq + 2a(q + 1) + 4a(q + 2) = 24$ és (4) $4a + 4a(q + 2) + 4a(q + 2)^2 = 84$.	1 pont										
Összevonások után a következő egyenletrendszert kapjuk: $7aq + 10a = 24$, $4a(q^2 + 5q + 7) = 84$.	1 pont	<i>A helyes másodfokú egyenlet felírásáért 5 pont jár.</i>									
Ha a értékét mindkettőtől kifejezzük, és ezeket egyenlővé tesszük, akkor rendezés után kapjuk: $8q^2 - 9q - 14 = 0$.	1 pont										
Megoldásai: $q_1 = 2$ és $q_2 = -\frac{7}{8}$.	1 pont										
Az első esetben $a = 1$.	1 pont	<i>Ha ezt az értéket is elfogadjuk, és ennek segítségével is felírja a sorozatokat, akkor csak ezt és az ellenőrzésre járó pontot (összesen 2 pont) veszíti el.</i>									
A második esetben $a = \frac{192}{31}$, ami nem egész szám, tehát nem megoldás.	1 pont										
A kapott sorozatok első három tagja: <table> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>6</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>16</td> <td>64</td> </tr> </table>	1	2	4	2	6	18	4	16	64	2 pont	<i>Ha egyenletek felírása nélkül, a feltételekből próbálgatással felírja a sorozatok tagjait, és nem igazolja, hogy más megoldás nincs, akkor maximum 8 pontot kaphat.</i>
1	2	4									
2	6	18									
4	16	64									
Ezek megfelelnek a feladat feltételeinek.	1 pont										
Összesen:	16 pont										

7. c)	
A vesztes csapat góljainak száma v ; a győztes csapaté $v + 3$. A csapatok összesen $2v + 3$ gólt lőttek.	1 pont
A résztvevők szerint: $4 < v$, illetve $10 < 2v + 3 < 28$. Ezekből $4 < v \leq 12$. v lehetséges értékei E állítását is figyelembe véve: 5, 7 vagy 11.	1 pont
D szerint $2v + 3$ is prímszám. Ha $v = 5$, akkor $2v + 3 = 13$, ami prím.	1 pont
Ha $v = 7$, akkor $2v + 3 = 17$, ami prím.	1 pont
(Ha $v = 11$, akkor $2v + 3 = 25$, ami nem prím.) Tehát az információk alapján nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy mi lett a döntő végeredménye. (A két csapat góljainak a száma 5 és 8, vagy 7 és 10.)	1 pont
Összesen: 5 pont	
Ha a vizsgáló a lehetséges jó végeredményeket egy táblázattal segítségével adja meg, és a táblázat minden, a feltehetően megfelelő adatot tartalmaz, akkor jár az 5 pont. Ha viszont csak a két lehetséges végeredményt közli minden indoklás nélkül, akkor erre a részre csak az utolsó 1 pont jár.	

4. a)	
Legyen V az interneten vásárlás eseménye, L pedig a letöltés eseménye. Mivel $P(V) = 0,17$,	1 pont
ezért az ellentett (komplementer) esemény valószínűsége: $P(\bar{V}) = 1 - P(V) = 0,83$.	1 pont
Összesen: 3 pont	
<i>Venn-diagramm alapján közölt eredmény is 3 pontot ér.</i>	
4. b) első megoldás	
A $V+L$ esemény bekövetkezésének valószínűségét keressük.	1 pont
Mivel $P(V+L) = P(V) + P(L) - P(VL)$,	1 pont
ahol $P(VL) = 0,14$.	1 pont
Így $P(V + L) = 0,17 + 0,33 - 0,14 = 0,36$ (36 %).	1 pont
Összesen: 4 pont	

4. b) második megoldás	
Venn-diagrammal szemléltetve a vásárlók és letöltők halmazát:	
	1 pont
A $V \cup L$ halmazba tartozás valószínűségét keressük. $P(V \text{ vagy } L) = P(V) + P(L) - P(V \text{ és } L)$ ismerete	1 pont
$P(V + L) = 0,36$ (36 %).	1 pont
Összesen: 4 pont	

4. c)	
Ez az esemény az előző esemény komplementere, ezért: $P(\bar{V} \cap \bar{L}) = 1 - 0,36 = 0,64$ (64%) .	2 pont
Összesen: 3 pont	

4. d)		
A három tulajdonos mindegyike egymástól függetlenül 0,83 valószínűséggel nem vásárol az interneten,	2 pont	
ezért $P(\text{egyikük sem vásárol}) = 0,83^3 \approx$	1 pont	
$\approx 0,57$. (57%.)	1 pont	
Összesen:	4 pont	

7. b) első megoldás		
Jelöljük B -vel azt az eseményt, hogy a kiválasztottak között található olyan, akinek van különórája, az A_i pedig azt az eseményt, hogy a kiválasztottak közül pontosan i tanulónak van különórája.		
$P(A_1 B)$ feltételes valószínűséget kell kiszámítani.	1 pont	
$P(A_1 B) = \frac{P(A_1B)}{P(B)} = \frac{P(A_2)}{P(B)}$.	1 pont	
$(P(B)-$ t a komplementer esemény valószínűségének segítségével kapjuk meg:)	1 pont	
$P(B) = 1 - P(\bar{B})$.	1 pont	
Mivel $\bar{B} = A_0$, ezért	1 pont	
$P(B) = 1 - \left(\frac{12}{0} \cdot \frac{18}{5} \right) \approx$	1 pont	
$\approx 1 - 0,0601 \approx 0,940$.	1 pont	Más jó kerekítéssel kapott értéket is fogadjunk el.
Ezért a keresett valószínűség: $\frac{0,378}{0,940} \approx 0,402$.	1 pont	$\frac{378}{940}$ is el- változatai pl.
Összesen:		
fogadható eredményként. Ha a vizsgázó nem írja fel a feltételes valószínűsége vonatkozó összefüggést, de jól használja, a megfelelő pontszám akkor is jár.		

7. b) második megoldás		
$\binom{30}{5} - \binom{18}{5}$ olyan eset van, amelyben a kiválasztott 5 tanuló között van különórára járó.	2 pont	
Ennek értéke 133 938.	1 pont	
Ezen esetek mindegyike egyforma valószínűséggel következik be.	1 pont	
Ezen 133 938 eset között $\binom{12}{2} \cdot \binom{18}{3} = 53\,856$ olyan eset van, amelyben a különórás tanulók száma pontosan kettő.	2 pont	
Tehát a kértezett valószínűség: $\frac{53\,856}{133\,938} (\approx 0,402)$.	1 pont	
Összesen:	7 pont	

7. a)		
30 tanuló közül 5-öt $\binom{30}{5}$ -féleképpen lehet kiválasztani.	1 pont	
A vizsgált esetben 12 tanuló közül választunk ki 2 tanulót, és ettől függetlenül a többi 18 közül 3 tanulót. Ezt $\binom{12}{2} \cdot \binom{18}{3}$ -féleképpen lehet megtenni.	1 pont	
Annak a valószínűsége, hogy pontosan két tanulónak van különórája: $P(A_2) = \frac{\binom{12}{2} \cdot \binom{18}{3}}{\binom{30}{5}} =$	1 pont	
$\left(= \frac{66 \cdot 816}{142506} \right) = \frac{53856}{142506} \approx 0,378$.	1 pont	Bármelyik alak elfogadható végeredményként, például a 0,3779 és a 0,38 is.
Összesen:	4 pont	

II.		
5.		
Legyen a fiúk száma: f . A tanulmányi eredményük összege: $4,01f$.	1 pont	
A lányok száma: l . A tanulmányi eredményük összege: $4,21l$.	1 pont	
Az iskola tanulóinak létszáma: $f + l$. ($f, l \in \mathbb{N}^+$) A tanulmányi eredményük összege: $4,12(f + l)$. $4,01f + 4,21l = 4,12(f + l)$.	1 pont	
Rendezés után: $l = \frac{11}{9}f$.	2 pont	
A létszám: $f + l = f + \frac{11}{9}f = \frac{20}{9}f$.	1 pont*	
Mivel $f + l$ egész szám, így f osztható 9-cel, Az össz létszámot l segítségével is kifejezheti. $(f = \frac{9}{11}l, f + l = \frac{20}{11}l, 220 < l < 236,5)$ Ez a pont akkor is jár, ha a megoldás elején felírja, hogy x összes tanuló esetében $400 < x < 430$.	2 pont*	
A feltétel szerint: $400 < \frac{20}{9}f < 430$.	1 pont*	
Ebből $180 < f < 193,5$.	1 pont*	
Mivel f osztható 9-cel, ezért $f = 189$. $l = 231$.	1 pont*	
Tehát az iskola tanulóinak létszáma: $189 + 231 = 420$. Ellenőrzés a szöveg alapján.	1 pont*	
Összesen:	16 pont	
<i>A *-gal jelölt 8 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja: ha a fiúk és lányok aránya 9:11, akkor a tanulók összlétszáma osztható 20-szal (4 pont). Mivel a 400 és 430 közé eső egész számok közül csak a 420 osztható 20-szal (2 pont), ezért a tanulók összlétszáma 420 (2 pont).</i>		

6. a)			
Az ábrán a gödör feltételeknek megfelelő keresztmetszete látható.	4 pont	Adatok nélkül a jó ábráért 2 pont jár.	
Összesen: 4 pont			
6. b) első megoldás			
A gödör egy olyan (egyenes) hasáb, amelynek ezzel a trapézzal egybevágó az alaplapja.	2 pont		
E hasáb magassága pedig 8 méter.	1 pont		
A trapéz (alaplap) területe: $T = \frac{(8 - x - y) + 8}{2} \cdot 6$	2 pont		
$\operatorname{tg} 60^\circ = \frac{6}{x}$.	1 pont		
$x = \frac{6}{\operatorname{tg} 60^\circ} = \frac{6}{\sqrt{3}} (\approx 3,46)$.	1 pont		
$\operatorname{tg} 75^\circ = \frac{6}{y}$.	1 pont		
$y = \frac{6}{\operatorname{tg} 75^\circ} \left(= \frac{6}{2 + \sqrt{3}} \approx 1,61 \right)$.	1 pont		
$T \approx \frac{8 - 3,46 - 1,61 + 8}{2} \cdot 6 (= 32,79)$.	1 pont		
$V \approx 32,79 \cdot 8 \approx 262,3$.	1 pont		
262 m ³ földet kell kiásni a gödörből.	1 pont		
Összesen: 12 pont		Ha a vizsgázó a számítások során pontosabb részeredményekkel számol, az eredmény kerekítve akkor is: 262 m ³ .	

6. b) második megoldás		
Ez a test kiegészíthető egy $8 \times 8 \times 6$ méter élű téglatestre, amelynek térfogatából le kell vonni az eredeti ferde oldallapokhoz illeszkedő háromszögalapú hasábok térfogatát.	1 pont	
A téglatest térfogata: $8 \cdot 8 \cdot 6 = 384 \text{ (m}^3\text{)}$.	1 pont	
$\operatorname{tg} 60^\circ = \frac{6}{x}$.	1 pont	
$x = \frac{6}{\operatorname{tg} 60^\circ} \left(= \frac{6}{\sqrt{3}} \approx 3,46 \right)$.	1 pont	
$\operatorname{tg} 75^\circ = \frac{6}{y}$.	1 pont	
$y = \frac{6}{\operatorname{tg} 75^\circ} \left(= \frac{6}{2 + \sqrt{3}} \approx 1,61 \right)$.	1 pont	
Az egyik háromszögalapú hasáb alaplapja egy olyan derékszögű háromszög, amelynek egyik befogója 6, másik befogója $x \approx 3,46$, magassága pedig 8.	1 pont	
A térfogat: $V_1 \approx \frac{6 \cdot 3,46}{2} \cdot 8 = 83,04 \text{ (m}^3\text{)}$.	1 pont	
A másik háromszögalapú hasáb alaplapja egy olyan derékszögű háromszög, amelynek egyik befogója 6, másik befogója $y \approx 1,61$, magassága pedig 8.	1 pont	
A térfogat: $V_2 \approx \frac{6 \cdot 1,61}{2} \cdot 8 = 38,64 \text{ (m}^3\text{)}$.	1 pont	
$V \approx 384 - 83,04 - 38,64 \approx 262,3$.	1 pont	
262 m ³ földet kell kiásni a gödörből.	1 pont	
Összesen: 12 pont		
A második megoldás mintájára egy olyan megoldás is lehetséges, amelyben a testet egy téglatestre és két háromszögalapú hasábra bontjuk fel. Pontozása teljesen hasonló a 2. megoldás pontozásához.		