

9. c)		
A kihúzott három szám összege pontosan akkor osztható 3-mal, ha vagy mindhárom ugyanazt a maradékokot adja 3-mal osztva, vagy 3-as maradékaik páronként különbözők. 0 maradékot a 3, 6, 9, 12, 15 számok adnak, közülük három szám húzása $\binom{5}{3} (= 10)$ -féleképpen lehetséges.	1 pont	Ez a 2 pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.
	1 pont	
1 maradékot az 1, 4, 7, 10, 13, 16 számok adnak, közülük három szám húzása $\binom{6}{3} (= 20)$ -féleképpen lehetséges.	1 pont	
2 maradékot a 2, 5, 8, 11, 14, 17 számok adnak, közülük három szám húzása $\binom{6}{3} (= 20)$ -féleképpen lehetséges.	1 pont	
A páronként különböző maradékot adó húzások száma $5 \cdot 6^2 (= 180)$.	1 pont	
A kedvező esetek száma: $\binom{5}{3} + 2 \cdot \binom{6}{3} + 5 \cdot 6^2 (= 230)$.	1 pont	
Mivel az összes esetek száma $\binom{17}{3} (= 680)$, ezért a keresett valószínűség $p = \frac{230}{680} \approx 0,338$.	1 pont	
Összesen:		8 pont

Megjegyzések:

1. Ha a vizsgázó valamelyik válaszában nem kereti vagy rosszul kereti, akkor ezért a teljes feladatban összesen 1 pontot veszíten.

2. Számalékban megadott helyes válaszok is elfogadhatók.

3. Ha a vizsgázó megoldásában rossz modellt használ (a visszatevés és a visszatevés nélküli mintavételt felcseréli), akkor az a) és b) feladatokban 0 pontot, a c) feladatban legfeljebb 4 pontot kaphat.

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. május 7.

MATEMATIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

1. A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal** kell javítani, a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölve a hibákat és a hiányokat.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a **javító által adott pontszám** a mellette levő téglalapba kerül.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.
5. Az ábrán kívül a **ceruzával írt részeket** a javító tanár nem értékelheti.

Tartalmi kérések:

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók**, ha csak az útmutató másképp nem rendelkezik. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel, mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változik meg.
5. Ha a megoldási útmutatóban **zárójelben szerepel** egy megjegyzés vagy mértékegység, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
6. Egy feladatra adott **többféle megoldási próbálkozás** közül csak egy, a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető.
7. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészeire előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
8. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
9. A **vizsgafeladatsor II. részében kitűzött 5 feladat közül csak 4 feladatot megoldása értékelhető**. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladatot értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

9. a)		
Az összes kihúzási lehetőségek száma $\binom{17}{3} (= 680)$.	1 pont	
Három sárga golyót $\binom{8}{3} (= 56)$ -féleképpen, három zöld golyót $\binom{9}{3} (= 84)$ -féleképpen húzhatunk ki, a kedvező esetek száma így $\binom{8}{3} + \binom{9}{3} (= 140)$.	1 pont	
A keresett valószínűség $p = \frac{\binom{8}{3} + \binom{9}{3}}{\binom{17}{3}} = \frac{7}{34} \approx 0,206$.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

9. b) első megoldás		
Sárga golyó húzásának valószínűsége $\frac{8}{17}$, zöld golyó húzásának valószínűsége $\frac{9}{17}$.	1 pont	<i>Ez a 2 pont akkor is jár, ha ezek a gondolatok csak a megoldásból derülnek ki.</i>
A kérdéses valószínűség binomiális eloszlást követ, ezért $p = \binom{5}{3} \left(\frac{8}{17}\right)^3 \left(\frac{9}{17}\right)^2 \approx 0,292$.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

9. b) második megoldás		
(Mivel minden egyes húzás alkalmával mind a 17 golyót húzhatjuk, ezért) az összes esetek száma 17^5 . Mivel három sárga golyó húzására 8^3 , két zöld golyó húzására 9^2 lehetőségünk van, a golyók kihúzásának színsorrendje pedig $\binom{5}{3}$ -féle lehet, ezért a kedvező esetek száma $\binom{5}{3} \cdot 8^3 \cdot 9^2$. A keresett valószínűség $p = \frac{\binom{5}{3} \cdot 8^3 \cdot 9^2}{17^5} \approx 0,292$.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
Összesen:	4 pont	

Igy az ilyen tornyok száma összesen	1 pont
$\binom{8}{5} + \binom{8}{6} + \binom{8}{7} + \binom{8}{8} = (56 + 28 + 8 + 1 =)$	1 pont
= 93.	1 pont
Összesen:	4 pont

8. b) második megoldás	
Szimmetria okokból azon tornyok száma, amelyek több piros elemet tartalmaznak, megegyezik azon tornyok számával, amelyek több kék elemet tartalmaz	1 pont
Ugyanannyi (4-4) piros és kék elemet tartalmaz $\binom{8}{4} (= 70)$ torony.	1 pont
(Mivel a torony minden eleme kétféle lehet,) az összes lehetséges különböző tornyok száma $2^8 (= 256)$.	1 pont
A megfelelő tornyok száma tehát $\frac{256 - 70}{2} = 93$.	1 pont
Összesen:	4 pont


Megjegyzés: A megfelelő pontok járnak, ha a vizsgázó kombináció helyetti ismétléses permutációra hivatkozik.


8. c)	
Annak a valószínűsége, hogy egy kiválasztott kocka nem selejtes, $\frac{1000000 - 20}{1000000} = 0,99998$.	1 pont
Annak a valószínűsége, hogy egy n kockát tartalmazó dobozban egyik kocka sem selejtes, $0,99998^n$.	1 pont
Ha annak a valószínűsége, hogy a dobozban van selejtes, kisebb 0,01-nál, akkor annak a valószínűsége, hogy a dobozban nincs selejtes, legalább 0,99.	1 pont
Megoldandó a $0,99998^n \geq 0,99$ egyenlőtlenség ($n \in \mathbb{N}$).	1 pont
(Az $\lg x$ függvény szigorúan monoton növekedése miatt)	1 pont
$n \cdot \lg 0,99998 \geq \lg 0,99$.	
Ebből ($\lg 0,99998 < 0$ miatt)	
$n \leq \frac{\lg 0,99}{\lg 0,99998} \approx 502,5$.	1 pont
tehát András legfeljebb 502 darabos készletet vehet.	1 pont
Összesen:	7 pont



Megjegyzés: Ha a vizsgázó egyenlőtlenség helyett egyenletet old meg, de nem indokolja, hogy az egyenlet megoldásából hogyan következik az egyenlőtlenség megoldása, akkor legfeljebb 5 pontot kaphat (egyenlet felírása 3 pont, jó megoldása 1 pont, jó válasz 1 pont).

I.		
1.		
Egy tört nempozitív, ha vagy a számlálója és nevezője ellentétes előjelű, vagy a számlálója nulla, de a nevezője nem.	1 pont	Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.
Első eset: $x - 3 > 0$ és $x + 4 \leq 0$. Ebből: $x > 3$ és $x \leq -4$.	1 pont	
Ebben az esetben nem kapunk megoldást.		
Második eset: $x - 3 < 0$ és $x + 4 \geq 0$.	1 pont	
Ebből: $x < 3$ és $x \geq -4$.	1 pont	
Ezért az A halmaz elemei: $\{-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2\}$.	1 pont	
Ez az abszolútértékes egyenlőtlenség akkor teljesül, ha $-4 < x + 3 < 4$, azaz $-7 < x < 1$.	2 pont	
Ezért a B halmaz elemei: $\{-6; -5; -4; -3; -2; -1; 0\}$.	1 pont	
$A \cap B = \{-4; -3; -2; -1; 0\}$.	1 pont	
$A \setminus B = \{1; 2\}$.	1 pont	
$A \cup B = \{-6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2\}$.	1 pont	
Összesen:	11 pont	



Megjegyzés: Ha a vizsgázó az egyenlőtlenségeknak egész helyett a valós megoldásaival dolgozik, akkor legfeljebb 8 pontot kaphat.

2.		
	1 pont	Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgázó ábra nélkül helyesen modellezi és számolja ki a hajtószij hosszát.
Jó ábra.		
A keresett hajtószijhossz az egymással egyenlő hosszú E_1E_2 és E_3E_4 érintőszakaszokból, valamint a (rövidebb) E_1E_3 körívből és a (hosszabb) E_2E_4 körívből áll.	1 pont	Ez a 2 pont akkor is jár, ha ezek a gondolatok csak a megoldásból derülnek ki.
Az O_1 -en keresztül az E_1E_2 érintőszakasszal húzott párhuzamos metszéspontja O_2E_2 -vel legyen M . Az O_1MO_2 derékszögű háromszögből	1 pont	
$E_1E_2 = O_1M = \sqrt{46^2 - 19^2} = \sqrt{1755} \approx 41,9$ (cm). (Az O_1O_2M szöget α -val jelölve:)	1 pont	
$\cos \alpha = \frac{19}{46} (\approx 0,4130)$,	1 pont	

ahonnan $\alpha \approx 65,6^\circ$.	1 pont
A hosszabb E_2E_4 körívhez tartozó középponti szög $360^\circ - 2\alpha \approx 228,8^\circ$.	1 pont
A hosszabb E_2E_4 körív hossza így $\frac{228,8^\circ}{360^\circ} \cdot 2 \cdot 20\pi \approx$	1 pont
$\approx 79,9$ (cm).	1 pont
A rövidebb E_1E_3 körívhez tartozó középponti szög $2\alpha \approx 131,2^\circ$.	1 pont
A rövidebb E_1E_3 körív hossza így $\frac{131,2^\circ}{360^\circ} \cdot 2 \cdot 1\pi \approx$	1 pont
$\approx 2,3$ (cm).	1 pont
Innen a feszes hajtószíj hossza megközelítőleg $2 \cdot 41,9 + 79,9 + 2,3 = 166$ cm.	1 pont
Összesen: 13 pont	
3. a)	
Az állítás hamis.	1 pont
Bármilyen jó ellenpélda (nem össze- függő, egyszerű gráf, amelyben minden pont fokszáma legalább 2), például:	1 pont
	
Összesen: 2 pont	
3. b)	
Az állítás megfordítása: Ha a gráf összefüggő, akkor minden pontjának fok- száma legalább 2.	2 pont
Az állítás hamis.	1 pont
Bármilyen jó ellenpélda (összefüggő, egyszerű gráf, amelynek van elsőfokú pontja), például:	1 pont
	
Összesen: 4 pont	

8. a) első megoldás		
	Jó ábra: az érintkező hengerek egy alkalmas síkmetszetének ábrázolása.	1 pont
A nagy kör középpontját a négy kis kör középpontjával összekötő négy szakasz által meghatározott szögek (az ábra forgásszimmetriája miatt) derékszögek. (A Pitagorasz-tételt alkalmazva pl. az OAB háromszögben:) $(3 + R)^2 + (3 + R)^2 = 12^2$ ($= 144$).	Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgáló a derékszöget az ábráján tüntette fel.	1 pont
(Mivel $3 + R > 0$, ezért) $3 + R = \sqrt{72}$ ($= 6\sqrt{2}$),	1 pont	$2R^2 + 12R - 126 = 0$ $R_1 \approx 5,485$; R_2 negatív.
ebből (a kért pontossággal)	Ez a pont nem jár, ha	1 pont
$d = 2R = (12\sqrt{2} - 6 \approx) 10,97$ mm.	a vizsgáló nem kerekít vagy rosszul kerekít.	1 pont
Összesen: 5 pont		
8. a) második megoldás		
	Jó ábra: az érintkező hengerek egy alkalmas síkmetszetének ábrázolása.	1 pont
A négy kis kör középpontja egy 12 mm oldalú négyzetet alkot.	1 pont	
Ennek a négyzetnek az átlója $12\sqrt{2}$ (mm).	1 pont	
Mivel ez éppen $2R + 6$,	1 pont	
ebből (a kért pontossággal)	Ez a pont nem jár, ha	1 pont
$d = 2R = (12\sqrt{2} - 6 \approx) 10,97$ mm.	a vizsgáló nem kerekít vagy rosszul kerekít.	1 pont
Összesen: 5 pont		
8. b) első megoldás		
A piros elemek száma 5, 6, 7 vagy 8 lehet.	1 pont	
Ha a piros elemek száma k , akkor (mivel a piros elemek helye a toronyban már egyértelműen meghatározza a tornyot) az építhető tornyok száma $\binom{8}{k}$.	1 pont	Ez a 2 pont akkor is jár, ha ezek a gondolatok csak a megoldásból derülnek ki.

Az f függvénynek a pozitív számok halmazán ott lehet minimuma, ahol a deriváltja 0.	1 pont*	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
$f'(r) = 0,8r\pi - \frac{200}{r^2}$	2 pont*	
$f'(r) = 0$, ha $r = \sqrt[3]{\frac{200}{0,8\pi}} \approx 4,3$ cm.	1 pont*	
Mivel $f''(r) = 0,8\pi + \frac{400}{r^3} > 0$, ezért itt valóban minimális f értéke.	1 pont*	<i>Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgáló az első derivált előjelváltásával indokol helyesen.</i>
A minimális anyagköltséghez tartozó magasság $m\left(\frac{1000}{r^2\pi}\right) \approx 17,2$ cm.	1 pont	
A minimális anyagköltség forintra kerekítve 70 Ft.	2 pont	
Összesen:	13 pont	
<i>Megjegyzések:</i>		
1. Ha a vizsgáló válaszaiban nem kerekít vagy rosszul kerekít, akkor ezért a feladatban összesen 1 pontot veszíten.		
2. Ha a vizsgáló válaszaiban nem ad meg mértékegységet, akkor ezért a feladatban összesen 1 pontot veszíten.		
3. A *-gal jelölt 5 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgáló:		
A számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenség alkalmazásával: $f(r) = 0,4r^2\pi + \frac{200}{r} = 0,4\pi \cdot r^2 + \frac{100}{r} \cdot \frac{100}{r} \geq 3 \cdot \sqrt[3]{0,4\pi \cdot r^2 \cdot \frac{100^2}{r^2}} = 3 \cdot \sqrt[3]{4000\pi}$	3 pont	
Az egyenlőség akkor és csak akkor teljesül, ha $0,4\pi \cdot r^2 = \frac{100}{r}$,	1 pont	
ahonnan $r = \sqrt[3]{\frac{100}{0,4\pi}} \approx 4,3$ cm.	1 pont	
7. b)		
Az adatok átlaga 0,7.	1 pont	
A minta átlagától mért átlagos abszolút eltérése $\frac{6 \cdot 0,7 + 2 \cdot 0,3 + 1,3 + 2,3}{10} = 0,84$.	2 pont	
Összesen:	3 pont	

3. c)		1-1 pont	
Összesen:	4 pont		
3. d)		2 pont	
Bármilyen jó 6 pontú fa, például:			
Az 5-ös sorszám elhelyezése a $(P \cap Q) \setminus R$ halmazba.	1 pont		
Összesen:	3 pont		
4. a) első megoldás			
A március 1-jén felvett hitel $(365 - 31 - 28 =) 306$ napig, az október 1-jén felvett hitel pedig $(31 + 30 + 31 =) 92$ napig kamatozik.	1 pont		
A napi kamatláb $\frac{8}{365} \%$.	1 pont		
Az első hitel kamata $40\,000 \cdot \frac{8}{365} \cdot 306 \approx 2683$ (Ft), a második hitel kamata pedig $40\,000 \cdot \frac{8}{365} \cdot 92 \approx 807$ (Ft).	1 pont		
Összesen $(2683 + 807 =) 3490$ Ft kamatot tőkésít a bank december 31-én.	1 pont		
Összesen:	5 pont		


4. a) második megoldás		
Március 1-től szeptember 30-ig, azaz $(31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 = 214)$ napig 40 000 Ft hitel után, október 1-től december 31-ig, azaz $(31 + 30 + 31 = 92)$ napig pedig 80 000 Ft hitel után számít fel a bank kamatot.	1 pont	
A napi kamatláb $\frac{8}{365}\%$.	1 pont	
Az első periódusban $40\,000 \cdot \frac{8}{365} \cdot 214 \approx 1876$ (Ft), a második periódusban pedig $80\,000 \cdot \frac{8}{365} \cdot 92 \approx 1613$ (Ft) kamatot számít fel a bank.	1 pont	
Összesen $(1876 + 1613 = 3489)$ Ft kamatot tőkésít a bank december 31-én.	1 pont	3490 Ft is elfogadható (az eltérés a kerekítések-ből adódik).
Összesen:	5 pont	
<i>Megjegyzés: Más, ésszerű és helyes kerekítésekkel – például ha a vizsgáló a napi kamatlábat 0,02%-nak vagy 0,022%-nak veszi – kapott eredmények is elfogadhatók. Rossz vagy ésszerűtlen kerekítés(ek) esetén a vizsgáló ezért összesen 1 pontot veszíten.</i>		

4. b)		
(Ha x Ft volt az évi törlesztőrészlet, akkor) $(\dots((1\,000\,000 \cdot 1,08 - x) \cdot 1,08 - x) \cdot \dots) \cdot 1,08 - x = 0$.	2 pont	
Rendezve: $1\,000\,000 \cdot 1,08^{10} - x \cdot (1,08^9 + 1,08^8 + \dots + 1) = 0$.	2 pont	
A zárójelben egy mértani sorozat első 10 tagjának összege van ($a_1 = 1$, $q = 1,08$).	1 pont	Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.
$S_{10} = \frac{1,08^{10} - 1}{1,08 - 1} \approx 14,487$	1 pont	
Az egyenletből: $x = \frac{1\,000\,000 \cdot 1,08^{10}}{S_{10}} \approx \left(\frac{2\,158\,925}{14,487} \approx \right)$	1 pont	
$\approx 149\,025$.	1 pont	
Tehát (ezresekre kerekítve) 149 000 Ft az éves törlesztőrészlet.	1 pont	Ez a pont nem jár, ha a vizsgáló nem kerekít vagy rosszul kerekít.
Összesen:	9 pont	
<i>Megjegyzés: Ha a vizsgáló a függvénytáblázatban található megfelelő képletbe jól helyettesít és így határozza meg az éves törlesztőrészletet, akkor maximális pontszámot kapjon.</i>		

6. b) második megoldás		
$K_1 = 4$ (m), $K_2 = 4 \cdot \frac{5}{7}$ (m), és (hasonlósági megfontolások miatt) minden további négyzetet kerülete $\frac{5}{7}$ -szerese a megelőzőének.	1 pont	Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.
A négyzetek kerülete egy olyan mértani sorozatot alkot, melynek első tagja $a_1 = 4$, hányadosa $q = \frac{5}{7}$.	1 pont	
A mértani sorozat első n tagjának összege: $S_n = 4 \cdot \frac{\left(\frac{5}{7}\right)^n - 1}{\frac{5}{7} - 1}$.	1 pont	
Mivel $\left(\frac{5}{7}\right)^n \rightarrow 0$, ha $n \rightarrow \infty$,	1 pont	
ezért $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 4 \cdot \frac{0 - 1}{\frac{5}{7} - 1} = 14$.	1 pont	
Tehát a négyzetek kerületének összege 14 méter.	1 pont	
Összesen:	6 pont	

7. a)		
(Ha r a doboz alapkörének sugara, m pedig a doboz magassága cm-ben mérve, akkor) $V = r^2 \pi m$, ahonnan $m = \frac{V}{r^2 \pi} = \frac{1000}{r^2 \pi}$ (cm).	1 pont	Ez a 2 pont akkor is jár, ha a vizsgáló részletezés nélkül írja fel helyesen a teljes anyagköltséget.
Az alap- és a fedőlap együttes anyagköltsége r függvényében $0,2 \cdot 2r^2 \pi$ (Ft). A palást anyagköltsége r függvényében $0,1 \cdot 2\pi \cdot \frac{V}{r^2 \pi} = \frac{0,2V}{r} = \frac{200}{r}$ (Ft).	1 pont	
A teljes anyagköltség r függvényében ($r > 0$) $f(r) = 0,4r^2 \pi + \frac{200}{r}$ (Ft).	2 pont	
	1 pont	

6. b) első megoldás



$K_1 = 4$ (m), $K_2 = 4 \cdot \frac{5}{7}$ (m), és (használati megfontolások miatt) minden további négyszet kerülete $\frac{5}{7}$ -szerese a megelőzőnek.

A négyszetek kerületének összege egy végtelen mértani sor összege, melynek hányadosa $q = \frac{5}{7}$.

Mivel $|q| < 1$, ezért a sor konvergens.

A végtelen mértani sor összege:

$$S = K_1 + K_2 + \dots = K_1 \cdot \frac{1}{1 - q} =$$

$$= \frac{4}{1 - \frac{5}{7}} = 14.$$

Tehát a négyszetek kerületének összege 14 méter.

Összesen:

1 pont
6 pont

II.

5. első megoldás

(A szimmetriatengely egy normálvektora a $(2; -1)$ vektor, így) a trapéz alapjának egy normálvektora az $(1; 2)$ vektor.

A $P(-5; 1)$ ponton áthaladó AB alap egyenesének egyenlete $x + 2y = -3$.

Ennek a trapéz köré írt körrel való metszéspontjait, tehát a trapéz két csúcsának koordinátáit az $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 100$
 $x + 2y = -3$ egyenletrendszer megoldásai adják.

Az $x = -2y - 3$ kifejezést behelyettesítve a kör egyenletébe az $y^2 + 4y - 12 = 0$ másodfokú egyenletet kapjuk.

Ennek megoldásai $y = 2$ és $y = -6$, így a trapéz AB alapjának két végpontja $A(-7; 2)$ és $B(9; -6)$.

A B középpontú és $10\sqrt{2}$ sugarú kör egyenlete $(x - 9)^2 + (y + 6)^2 = 200$.

Ennek és a trapéz köré írható körök (az egyik) metszéspontjait, tehát a C csúcs koordinátáit az $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 100$

$(x - 9)^2 + (y + 6)^2 = 200$ egyenletrendszer (valamelyik) megoldása adja.

A műveletek elvégzése és a két egyenlet kivonása után x -et kifejezve y -nal:
 $x = -\frac{4}{3}y + \frac{1}{3}$.


Ezt visszahelyettesítve valamelyik kör egyenletébe, majd egyszerűsítve az $y^2 - 4y - 32 = 0$ másodfokú egyenletet kapjuk.

Ennek megoldásai $y = 8$ és $y = -4$, így a metszéspontok koordinátái $(11; 8)$ és $(-5; -4)$.

A $(-5; -4)$ pont a trapéz szimmetriatengelyének B -vel ellentétes oldalán van, így nem lehet a BC szár másik végpontja, tehát $C(11; 8)$.

A CD alap egyik normálvektora szintén az $(1; 2)$ vektor, valamint áthalad a $C(11; 8)$ csúcson, így egyenlete $x + 2y = 27$.

Ennek a trapéz köré írt körrel való metszéspontjait az $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 100$
 $x + 2y = 27$ egyenletrendszer megoldásai adják.


Az $x = 27 - 2y$ kifejezést behelyettesítve a kör egyenletébe az $y^2 - 20y + 96 = 0$ másodfokú egyenletet kapjuk. Ennek megoldásai $y = 12$ és $y = 8$. A $(11; 8)$ pontot már korábban megkaptuk, így a negyedik csúcs $D(3; 12)$.	1 pont
	1 pont
Összesen: 16 pont	

Megjegyzés: A *gal jelölt 5 pont akkor is jár, ha a vizsgáló az A középpontú és $10\sqrt{2}$ sugarú kör felírásával és így a $\begin{cases} (x-3)^2 + (y-2)^2 = 100 \\ (x+7)^2 + (y-2)^2 = 200 \end{cases}$ egyenletrendszer megoldásával először a D csúcs koordinátáit határozza meg.

5. második megoldás (A szimmetriatengely egy normálvektora a $(2; -1)$ vektor, így) a trapéz alapjának egy normálvektora az $(1; 2)$ vektor. A $P(-5; 1)$ ponton áthaladó AB alap egyenlete $x + 2y = -3$. Ennek a trapéz köré írt körrel való metszéspontjait, tehát a trapéz két csúcsának koordinátáit az $\begin{cases} (x-3)^2 + (y-2)^2 = 100 \\ x + 2y = -3 \end{cases}$ egyenletrendszer megoldásai adják. Az $x = -2y - 3$ kifejezést behelyettesítve a kör egyenletébe az $y^2 + 4y - 12 = 0$ másodfokú egyenletet kapjuk. Ennek megoldásai $y = 2$ és $y = -6$, így a trapéz AB alapjának két végpontja $A(-7; 2)$ és $B(9; -6)$. Jelölje a trapéz köré írt kör középpontját K . Mivel a kör sugara 10 egység, a trapéz szárai pedig $10\sqrt{2}$ egység hosszúak, (a Pitagorasz-tétel megfordítása miatt) az AKD és a CKB háromszögek derékszögek.	1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont
---	--

Ezért a $\overrightarrow{KA}(-10; 0)$ vektor 90° -os elforgatottja a $\overrightarrow{KD}$ vektor, a $\overrightarrow{KB}(6; -8)$ vektor 90° -os elforgatottja pedig a $\overrightarrow{KC}$ vektor.	1 pont	Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.
Ezért vagy $\overrightarrow{KD}(0; 10)$ vagy $\overrightarrow{KD}(0; -10)$, azaz vagy $D(3; 12)$ vagy $D(3; -8)$.	2 pont 1 pont	
A $(3; -8)$ pont a trapéz szimmetriatengelyének A -val ellentétes oldalán van, így nem lehet az AD szár másik végpontja, tehát $D(3; 12)$.	1 pont	
Hasonlóan vagy $\overrightarrow{KC}(8; 6)$ vagy $\overrightarrow{KC}(-8; -6)$, azaz vagy $C(11; 8)$ vagy $C(-5; -4)$.	2 pont 1 pont	
A $(-5; -4)$ pont a trapéz szimmetriatengelyének B -vel ellentétes oldalán van, így nem lehet a BC szár másik végpontja, tehát $C(11; 8)$.	1 pont	
Összesen: 16 pont		

Megjegyzés: Ha a vizsgáló a $\overrightarrow{KA}$ és $\overrightarrow{KB}$ vektorok két-két lehetséges 90° -os elforgatottja közül csak az egyik lehetőséggel foglalkozik, akkor ezért összesen 2 pontot veszíten.

6. a) 	1 pont	Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgáló ábra nélkül helyesen számol.
A belső négyzet oldala $\frac{5}{7}$ méter.	1 pont	
A belső négyzet a külső négyzet oldalait x és $1-x$ hosszú szakaszokra bontja. (A 90° -os forgásszimmetria miatt) ez a felosztás mind a négy oldalon megismétlődik. (A Pitagorasz-tételt alkalmazva) $x^2 + (1-x)^2 = \left(\frac{5}{7}\right)^2$, ahonnan $2x^2 - 2x + \frac{24}{49} = 0$. Ennek megoldásai $x_1 = \frac{4}{7}$ és $x_2 = \frac{3}{7}$, ahonnan $1 - x_1 = \frac{3}{7}$ és $1 - x_2 = \frac{4}{7}$. A belső négyzet a külső négyzet oldalait 3:4 (vagy 4:3) arányban osztja.	1 pont 1 pont 1 pont 1 pont	Ez a 2 pont akkor is jár, ha ezek a gondolatok csak a megoldásból derülnek ki.
Összesen: 10 pont		