

a feladat sor- száma		pontszám			
		maximális	elért	maximális	elért
I. rész	1.	11		51	
	2.	14			
	3.	12			
	4.	14			
II. rész		16		64	
		16			
		16			
		16			
		16			
		← nem választott feladat			
Az írásbeli vizsgarész pontszáma		115			

dátum

javító tanár

pontszáma egész számra kerekítve		programba beírt	
I. rész			
II. rész			

dátum

dátum

javító tanár

jegyző

MATEMATIKA

EMELT SZINTŰ
ÍRÁSBELI VIZSGA

2018. október 16. 8:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

[illegible][illegible]A full page of blank graph paper with a uniform grid of small squares. The grid consists of 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 small square units. The lines are thin and gray, set against a white background. There are no margins or additional markings on the page.

Fontos tudnivalók

- 1. A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- 2. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- 3. A II. részben kitűzött öt feladat közül csak négyet kell megoldania. **A nem választott feladat sorszámat írja be a dolgozat befejezésekor az alábbi négyzetbe!** Ha a javító tanár számára *nem derül ki egyértelműen*, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, akkor a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladatra nem kap pontot.

- 4. A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet és bármilyen négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- 5. **A megoldások gondolatmenetét minden esetben írja le, mert a feladatra adható pontszám jelentős része erre jár!**
- 6. **Ügyeljen arra, hogy a lényegesebb részszámítások is nyomon követhetők legyenek!**
- 7. A gondolatmenet kifejtése során **a zsebszámológép használata – további matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, $n!$, $\left(\begin{smallmatrix}n\\k\end{smallmatrix}\right)$ kiszámítása, a függvénytáblázatban feltehető táblázatok helyettesítése ($\sin$, $\cos$, $\lg$ és ezek inverzei), a π és az e szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek az átlag és a szórás kiszámítására abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, így azokért nem jár pont.**

- 8. A feladatok megoldásánál használt tételek közül az iskolában tanult, névvel ellátott tételeket (pl. Pitagorasz-tétel, magasságtétel) nem kell pontosan megfogalmazva kimondania, elég csak a tétel megnevezését említenie, de az alkalmazhatóságát röviden indokolnia kell. Egyéb tétel(ek)re való hivatkozás csak akkor fogadható el teljes értékűnek, ha az állítást minden feltétellel együtt pontosan mondja ki (bizonyítás nélkül), és az adott problémában az alkalmazhatóságát indokolja.
- 9. A feladatok végeredményét (a feltett kérdésre adandó választ) szöveges megfogalmazásban is közölje!
- 10. A dolgozatot tollal írja, de az ábrákat ceruzával is rajzolhatja. Az ábrákon kívül a ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti. Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető.
- 11. Minden feladatnak csak egy megoldása értékelhető. Több megoldási próbálkozás esetén **egyértelműen jelölje**, hogy melyiket tartja érvényesnek!
- 12. Kérjük, hogy **a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!**

I.

1. a) Egy mértani sorozat hányadosa $\frac{1}{4}$, a sorozat első öt tagjának összege 852,5. Határozza meg a sorozat első tagját! Számításai során ne használjon közelítő értéket!
- b) Egy számtani sorozat első öt tagjának összege 852,5; első tíz tagjának összege pedig 2330. Számítsa ki a sorozat első tagját és differenciáját!

a)	4 pont	
b)	7 pont	
Ö.:	11 pont	

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania.
A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9.
- a)

Határozza meg a $p > 0$ paraméter értékét úgy, hogy $\int_0^p (3x^2 - 24x + 20)dx = 0$
teljesüljön!

b)

Határozza meg az a, b, c valós paraméterek értékét úgy, hogy az
 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 28$ ($x \in \mathbf{R}$) függvénynek $x = 2$ -ben zérushelye, $x = -4$ -ben
lokális maximumhelye, $x = -1$ -ben pedig inflexió pontja legyen!

a)	5 pont	
b)	11 pont	
Ö.::	16 pont	

2. a) Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán!



$$25 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^x - 50 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{x+1} + 30 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{x+2} = 81$$

b) Igazolja, hogy $\frac{\lg 5^x + \lg 5^{-x}}{2} \leq \lg \frac{5^x + 5^{-x}}{2} \quad (x \in \mathbf{R}).$

a)	7 pont	
b)	7 pont	
Ö.:	14 pont	

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania.
A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

8. Az $ABCDEF$ GH négyzetes oszlop AE , BF , CG , DH élei merőlegesek az $ABCD$ alaplagra. Az A csúsból kiinduló három él hossza $AB = AD = 8$ egység, $AE = 15$ egység.
- a) Számítsa ki az $\overrightarrow{EF}$ és $\overrightarrow{AH}$ vektorok skaláris szorzatát!
- A négyzetes oszlop köré egy P csúspontú forgáskúpot illesztünk úgy, hogy az A , B , C , D csúcsok a kúp alaplajára, az E , F , G , H csúcsok pedig a kúp palástjára illeszkedjenek. (A kúp és a négyzetes oszlop tengelye egybeesik.) A kúp magassága 45 egység.
- b) Számítsa ki a kúp felszínét!




- c) Hány olyan derékszögű háromszög van, amelynek egyik befogója 15 egység hosszú, és a másik két oldala is egész szám hosszúságú? (Az egybevágó háromszögeket nem tekintjük különbözőeknek.)

a)	3 pont
b)	7 pont
c)	6 pont
Ö.:	16 pont

3. Egy nagy méretű, köztéren felállítandó óra számlapiját szabályos 12-szög alakúra tervezik. Az $A_1A_2...A_{12}$ számlapot egy $260\text{ cm} \times 180\text{ cm}$ -es téglalap alakú alumíniumlemezből vágják ki az ábra szerint.
- a) Mekkora tömegű az óralap, ha az alumíniumlemez vastagsága 2 mm , és 1 m^3 alumínium tömege 2700 kg ?

b) Jelöljük meg a szabályos tizenkészsög A_1 csúcsát! Hány olyan derékszögű háromszög van, amelynek egyik csúcsa az A_1 , a másik két csúcsa pedig szintén a tizenkészsög valamelyik két csúcsával azonos? (Két háromszöget akkor tekintünk különböző-zőnek, ha legalább az egyik csúcsuk különböző.)



a)	7 pont
b)	5 pont
Ö.:	12 pont

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania.
A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

7. 
- A római katonák az úgynevezett *taxillus*-szal játszottak „kockajátékok”. (A *taxillus* a kecske vagy a juh térdkalácsából faragott esontocska; ld. a képen.)
Dobás után egy *taxillus* négy különböző oldalára eshetett. Jelölje ezt a négy különböző helyzetet A , B , C és D . Az egyes dobáskimenetek nem voltak egyformán valószínűek: az A , illetve a B helyzet egyaránt $\frac{4}{10}$, a C , illetve a D helyzet pedig egyaránt $\frac{1}{10}$ valószínűséggel következett be.

A rómaiak általában négy *taxillus*-t dobtak fel egyszerre. A *Venus*-dobás volt az egyik legértékesebb, ekkor a négy esontocska mindegyike más-más oldalára esett.¹

- a) Mennyi a *Venus*-dobás valószínűsége?
- b) Az alábbi két esemény közül melyiknek nagyobb a valószínűsége?

- I. Négy feldobott *taxillus* között lesz olyan, amelyik C helyzetben érkezik le.
- II. Négy feldobott *taxillus* között pontosan egy érkezik le az A helyzetben.

Thalész, a hét görög böles egyike, egy nevezetes, neki tulajdonított mérés során egy folyóban lévő sziget AB hosszát a folyóparton maradva határozta meg.
Először felvett egy e egyenest a parton. Ezen az e egyenesen megkereste azt a C , illetve D pontot, amelyekben a CA , illetve a DB irány merőleges az e egyenesre. Ezután a CD szakasz F felezőpontját is megjelölte egy jelzőkaróval. Ezt követően az AC egyenesen haladva megjelölte azt a G pontot, amelyre B , F és G egy egyenesre illeszkedik; és hasonlóan az AF és BD egyenesek H metszéspontját is megjelölte. Thalész azt állította, hogy a sziget hossza a GH távolsággal egyezik meg.

- c) Igazolja Thalész állításának helyességét!

a)	5 pont
b)	5 pont
c)	6 pont
Ö.:	16 pont

¹ Rényi Alfréd: Levelek a valószínűségről.

4. Egy zöldségárus vállalkozó egyik reggel 200 kg első osztályú barackot vizs eladásra a piacra. Tapasztalatból tudja, hogy az első osztályú barack eladási egységára és a napi eladott mennyiség között (jó közelítéssel) lineáris kapcsolat van (az eladott mennyiség az eladási egységár lineáris függvénye). Ha egész nap 500 Ft/kg áron kínálná a barackot, akkor várhatóan a fele fogyna el, míg ha 300 Ft/kg áron adná, akkor a 70%-a.
- a) Mennyi lenne a zöldségárusnak az első osztályú barack eladásából származó bevétele, ha egész nap 400 Ft/kg-os egységáron kínálná a barackot?
- b) Igazolja, hogy ha egész nap x (Ft/kg) az első osztályú barack egységára, y (kg) pedig a napi eladott mennyiség, akkor a közöttük lévő kapcsolatot:
- $$y = -\frac{1}{5}x + 200 \quad (0 < x < 1000).$$

- A nap végén a 200 kg-ból megmaradó barackot a zöldségárus másnap már nem adhatja el első osztályúként. Ezért a megmaradó teljes mennyiséget eladja egy gyümölcsfeldolgozó vállalkozásnak, mégpedig 80 Ft/kg egységáron.
- c) Mekkora eladási egységáron kínálja a barackot a zöldségárus napközben, hogy a napi bevétele maximális legyen? (A napi bevétel az első osztályúként eladott barackból származó bevétel plusz a gyümölcsfeldolgozó által fizetett összeg.)

a)	3 pont
b)	4 pont
c)	7 pont
Ö.:	14 pont

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania.
A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

6. a) Határozza meg az alábbi két állítás logikai értékét (igaz vagy hamis)! Válaszeit in-
dokolja!
- I. Ha egy trapéznek 2-2 szöge egyenlő, akkor a trapéz húrtrapéz.
- II. Ha egy háromszögben $a = b$, akkor $\sin 3\alpha = \sin 3\beta$.
- (A háromszög oldalai a , b és c , a velük szemközti szögek rendre α , β és γ .)
- b) Fogalmazza meg a II. állítás megfordítását, és a megfordított állításról is döntse el,
 hogy igaz vagy hamis! Válaszát indokolja!

Egy matematika-vizsgafeladatban három állítás logikai értékét kell meghatározni (igaz vagy hamis). Három helyes válasz esetén 2, két helyes válasz esetén 1, kettőnél kevesebb helyes válasz esetén 0 pontot kap a vizsgázó. Béla tanult egy keveset, de bizonytalan a tudása: mindegyik kérdésnél 0,6 valószínűséggel találja el a helyes választ.

- c) Számítsa ki annak a négy eseménynek a valószínűségét, hogy Béla sikeres tippjei-
nek száma 3, 2, 1, illetve 0, és határozza meg Béla pontszámának várható értékét!

a)	6 pont
b)	4 pont
c)	6 pont
Ö.:	16 pont

II.

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania.
A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Kinga a következő tanítási napra hat házi feladatot kapott, három kötelezőt és három szor-
galmit. Egy-egy kötelező házi feladatot kapott matematikából, angolból és magyarból,
ezeket biztosan elkészíti. Szorgalmi házi feladatot biológiából, németből és történelemből
kapott, ezeket nem feltétlenül csinálja meg: lehet, hogy mind a hármat elkészíti, lehet,
hogy csak kettőt vagy egyet, de az is lehet, hogy egyet sem készít el.
- a) Összesen hányféle különböző sorrendben készítheti el Kinga a házi feladatait?
(Két esetet különbözőnek tekintünk, ha vagy nem ugyanazokat a házi feladatokat,
vagy ugyanazokat a házi feladatokat, de más sorrendben oldja meg.)

Kinga matematika-házifeladata ez volt: „500 különböző pozitív egész szám átlaga 1000.
Legfeljebb mekkora lehet a számok közül a legnagyobb?”

- b) Adja meg Kinga matematika-házifeladatának megoldását!

Kinga, Linda, Misi és Nándi elvállalta, hogy az alacsonyabb évfolyamok tanulói közül
hét diákot rendszeresen korrepetálni fog. Az egyénenként vállalt tanulók számát egy meg-
beszélésen döntik el.

- c) Hány különböző módon állapodhatnak meg abban, hogy melyikük hány tanulót kor-
repetáljon, ha mindegyikük vállal legalább egy tanulót?
(Két megállapodást különbözőnek tekintünk, ha legalább egyikük nem ugyanannyi
tanulót korrepetál a két megállapodás szerint.)

a)	6 pont
b)	5 pont
c)	5 pont
Ö.::	16 pont