

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. május 5.

MATEMATIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

- 1. Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal, olvashatóan** javítsa ki.
- 2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerüljön.
- 3. **Kifogástalan megoldás** esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetése mellett kipipálással jelezze, hogy az adott gondolati egységet látta, és jónak minősítette.
- 4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy **a hiba jelzése** mellett az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy fölösleges.
- 5. A javítás során **alkalmazza az alábbi jelöléseket**.
 - helyes lépés: *kipipálás*
 - elvi hiba: *kétszeres aláhúzás*
 - számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: *egyszeres aláhúzás*
 - rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: *szaggatott* vagy *áthúzott kipipálás*
 - hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: *hiányjel*
 - nem érthető rész: *kérdőjel* és/vagy *hullámvonal*
- 6. Az ábrán kívül **ceruzával** írt részeket ne értékelje.

Tartalmi kérések:

- 1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadjuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenerértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
- 2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók, ha csak az útmutató másképp nem rendelkezik**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
- 3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
- 4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel – mint kiinduló adattal – helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdésekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
- 5. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.

9. c) második megoldás		
Ha v km/h átlagssebességgel 1 km hosszú utat tesz meg a mozdony, akkor ehhez $\frac{1}{v}$ óra szükséges. (A modell szerint) a szénfogyasztás 1 km-es távon: $\frac{1}{v} \cdot (0,5v^2 - 65v + 3800)$ kg.	1 pont	
$\frac{1}{v} \cdot (0,5v^2 - 65v + 3800) = 0,5v - 65 + \frac{3800}{v}$	1 pont	
A 6,1 tonna szén akkor lesz a leghosszabb útra elegendő, ha az 1 km-es távolságra eső szénfogyasztás a lehető legkisebb.	1 pont	
Az $c(v) = 0,5v - 65 + \frac{3800}{v}$ ($50 < v < 100$) függvénynek ott lehet minimuma, ahol a deriváltja 0.	1 pont*	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
$c'(v) = 0,5 - \frac{3800}{v^2}$	2 pont*	
$c'(v) = 0$, ha $v = \sqrt{7600} \approx 87,2$ (mert $v > 0$) (és ez eleme az értelmezési tartománynak).	1 pont*	
A deriváltfüggvény értékei $v < \sqrt{7600}$ esetén negatívak, $v > \sqrt{7600}$ esetén pedig pozitívak. Ezért a $\sqrt{7600}$ a c függvénynek abszolút minimumhelye.	1 pont*	$c''(v) = \frac{7600}{v^3}$, a második derivált tehát mindenhol pozitív. Ezért $\sqrt{7600}$ -nál abszolút minimuma van c -nek.
A 6,1 tonna szénnel tehát kb. 87 km/h átlagssebesség esetén jut legmesszebbre a mozdony (kb. 275 km-re).	1 pont	
Összesen:		9 pont

Megjegyzés: A *gal jelölt 5 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.


(Mivel $v > 0$, ezért) a számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenség miatt	1 pont	
$0,5v - 65 + \frac{3800}{v} \geq 2 \cdot \sqrt{0,5v \cdot \frac{3800}{v}} - 65 = 2 \cdot \sqrt{1900} - 65$ ($\approx 22,2$).	1 pont	<i>kb. 22,2 kg az 1 km-re eső minimális szénfogyasztás.</i>
A legkisebb érték akkor lehetséges, ha $0,5v = \frac{3800}{v}$.	1 pont	
Ebből $v^2 = 7600$, vagyis $v = \sqrt{7600}$.	1 pont	
A $\sqrt{7600}$ ($\approx 87,2$) eleme a c függvény értelmezési tartományának, ezért a függvénynek itt abszolút minimuma van.	1 pont	


9. b)	
A megadott átlagsebesség esetén $0,5 \cdot 60^2 - 65 \cdot 60 + 3800 = 1700$ kg/óra a szénfogyasztás.	1 pont
A 6100 kg szén tehát $6100 : 1700 (\approx 3,59)$ órára elegendő.	1 pont
Ennyi idő alatt kb. $(3,59 \cdot 60 \approx) 215$ km hosszúságú utat tesz meg a mozdony.	1 pont
Összesen:	3 pont
9. c) első megoldás	
Ha 1 óra alatt $0,5v^2 - 65v + 3800$ kg szénre van szükség, akkor a 6100 kg szén $\frac{6100}{0,5v^2 - 65v + 3800}$ órára elegendő.	1 pont
Ennyi idő alatt $\frac{6100v}{0,5v^2 - 65v + 3800}$ km távolságot tesz meg a mozdony.	1 pont
Az $s(v) = \frac{6100v}{0,5v^2 - 65v + 3800}$ ($50 < v < 100$) függvénynek ott lehet maximuma, ahol a deriváltja 0.	1 pont
$s'(v) = \frac{6100(0,5v^2 - 65v + 3800) - 6100v(v - 65)}{(0,5v^2 - 65v + 3800)^2} =$	2 pont
$= \frac{6100(0,5v^2 - 65v + 3800 - v^2 + 65v)}{(0,5v^2 - 65v + 3800)^2} =$	1 pont
$= \frac{3050(7600 - v^2)}{(0,5v^2 - 65v + 3800)^2}$	
$s'(v) = 0$, ha $7600 - v^2 = 0$.	
Ebből ($v > 0$ miatt) $v = \sqrt{7600} \approx 87,2$ (és ez eleme az értelmezési tartománynak).	1 pont
A deriváltfüggvény értékei $v < \sqrt{7600}$ esetén pozitívak, $v > \sqrt{7600}$ esetén pedig negatívak. Ezért a $\sqrt{7600}$ az s függvénynek abszolút maximumhelye.	1 pont
A 6,1 tonna szénnel tehát kb. 87 km/h átlagsebesség esetén jut legmesszebbre a mozdony (kb. 275 km-re).	1 pont
Összesen:	9 pont

Megjegyzés: $s'(v) = \frac{3050(v^3 - 22\,800v + 988\,000)}{(0,5v^2 - 65v + 3800)^3}$ és $s'(\sqrt{7600}) \approx -0,142$; ebből következik, hogy az s függvénynek valóban maximuma van az adott helyen.

6. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem.
7. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrésze előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
8. Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám **nem lehet negatív**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. A gondolatmenet kifejtése során **a zsebszámológép használata – további matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el**: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, $n!$, $\binom{n}{k}$ kiszámítása, a függvénytablázatban fellelhető táblázatok helyettesítése ($\sin$, $\cos$, $\lg$, $\log$ és ezek inverzei), a π és az e szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek az átlag és a szórás kiszámítására abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. **Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, így azokért nem jár pont**.
11. Az **ábrák** bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása méréssel) nem elfogadható.
12. **Valószínűségek** megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a százalékban megadott helyes válasz is elfogadható.
13. Ha egy feladat szövege nem ír elő kerekítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadottól eltérő, **észszerű és helyes kerekítésekkel** kapott rész- és végeredmény is elfogadható.
14. **A vizsgafeladatsor II. részében kitűzött 5 feladat közül csak 4 feladat megoldása értékelhető**. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozathól sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.

I.

1. a)		1 pont
		
A feladat feltételeit helyesen tükröző ábra. (Az ábra jelöléseit használva) az ADM derékszögű háromszögből: $DM = \sqrt{17^2 - 8^2} = 15$ (cm).		1 pont
Az ADM háromszög területe: $\frac{8 \cdot 15}{2} = 60$ (cm ²).		1 pont
Az ADM háromszögből $\cos \varepsilon = \frac{8}{17}$, $\varepsilon \approx 61,93^\circ$.		1 pont
A BAM köreikk középponti szöge: $\varphi = 90^\circ - \varepsilon \approx 28,07^\circ$,		1 pont
területe: $\frac{17^2 \pi \cdot 28,07^\circ}{360^\circ} \approx 70,8$ (cm ²).		1 pont
A téglalaplóból lefedett rész területe körülbelül: $60 + 70,8 = 130,8$ cm ² .		1 pont
Összesen:	7 pont	

1. b) első megoldás		
		1 pont
Megfelelő ábra. (A rombusz oldalának hossza x cm.) Az AQD derékszögű háromszögben (Pitagorasz-tétel): $(17 - x)^2 + 8^2 = x^2$.		1 pont
$289 - 34x + x^2 + 64 = x^2$ $34x = 353$ $x = \frac{353}{34} \approx 10,38$ (cm)		1 pont
A rombusz területe $4x = \frac{706}{17} \approx 41,5$ cm.		1 pont
Összesen:	5 pont	

8. b) első megoldás

(Az a) feladat megoldásában alkalmazottakhoz hasonló lépésekkel kapjuk, hogy) az n -edik hónap után $S_n = 700 \cdot 0,76^n + 60 \cdot 0,76^{n-1} + 60 \cdot 0,76^{n-1} + \dots + 60$ kg levespor lesz a raktárban. Felhasználva a mértani sorozat összegképletét: $S_n = 700 \cdot 0,76^n + 60 \cdot \frac{0,76^n - 1}{0,76 - 1}$.	1 pont
$S_n = 700 \cdot 0,76^n - 250 \cdot (0,76^n - 1) = 450 \cdot 0,76^n + 250$	2 pont
A $\{0,76^n\}$ szigorúan monoton csökkenő sorozat, amelynek a határértéke 0.	1 pont
Ezért az $\{S_n\}$ is szigorúan monoton csökkenő sorozat, amelynek a határértéke 250. Ezzel a feladat mindkét állítását bizonyítottuk.	2 pont
Összesen:	7 pont

8. b) második megoldás

Teljes indukcióval látjuk be, hogy az n -edik hónap után a raktárkészlet 250 kg-nál több, azaz $S_n > 250$.	1 pont
$n = 1$ -re igaz az állítás ($S_1 = 592$).	1 pont
Ha valamely $k \in \mathbb{N}^+$ -ra igaz az állítás, azaz $S_k > 250$, akkor belátjuk, hogy $S_{k+1} > 250$ is teljesül.	1 pont
A raktárkészlet 76%-a megmarad a következő hónapra, ezért $S_k > 250$ miatt ez a megmaradó mennyiség $(250 \cdot 0,76 = 190$ kg-nál több.	1 pont
Ezt a megmaradó mennyiséget még az újonnan előállított 60 kg-mal megnövelik, ezért valóban teljesül $S_{k+1} > 250$ (az állításnak ezt a részét ezzel beláttuk).	1 pont
Ha az aktuális raktárkészlet 250 kg-nál több, akkor a raktárkészlet 24%-a több $(250 \cdot 0,24 = 60$ kg-nál. Ekkor több, mint 60 kg-mal csökken a készlet, de csak 60 kg-mal nő, vagyis a raktárkészlet csökken.	1 pont
Mivel azt már beláttuk, hogy a raktárkészlet minden hónapban több lesz 250 kg-nál, ebből következik, hogy a készlet minden hónapban csökkenni fog.	1 pont
Összesen:	7 pont

9. a)

90 km/h = 1,5 km/perc = 1500 m/perc	1 pont
A hajtókerék kerülete: $1740\pi \approx 5466$ (mm), ami kb. 5,47 m.	2 pont
Egy perc alatt a kerék $\frac{1500}{5,47} \approx 274$ -et fordul.	1 pont
A kerék fordulatszáma $\frac{1}{274}$ perc.	
Összesen:	4 pont

8. a)		
(Az n -edik hónap végi rakárkészletet jelölje S_n .) Az első hónap után $S_1 = 700 \cdot 0,76 + 60$, a 2. hónap után $S_2 = (700 \cdot 0,76 + 60) \cdot 0,76 + 60$, és így tovább, a 18. hónap után pedig $S_{18} = (...((700 \cdot 0,76 + 60) \cdot 0,76 + ...) \cdot 0,76 + 60$ kg levespor lesz a rakárban (ahol a 0,76-os szorzók és a +60-as tagok száma is 18).	2 pont	
A zárójelket felbontva és a műveleteket elvégezve: $S_{18} = 700 \cdot 0,76^{18} + 60 \cdot 0,76^{17} + 60 \cdot 0,76^{16} + ... + 60 =$ $= 700 \cdot 0,76^{18} + 60 \cdot (0,76^{17} + 0,76^{16} + ... + 1)$.	1 pont	
A zárójelben egy mértani sorozat 18 tagja szerepel (az első tag 1, a hányados 0,76). A mértani sorozat összegképletét használva: $S_{18} = 700 \cdot 0,76^{18} + 60 \cdot \frac{0,76^{18} - 1}{0,76 - 1}$ $\approx$ $(\approx 5,009 + 248,211) = 253,22$.	2 pont	
Eredetileg 700 kg volt a rakárkészlet, és a 18 hónap alatt még gyártottak $(18 \cdot 60 =) 1080$ kg-ot. Így a terv megvalósulása esetén a 18. hónap alatt kb. $(700 + 1080 - 253 =) 1527$ kg lesz az eladott/eltárolódott levespor mennyisége.	1 pont	
Összesen:	9 pont	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó hónapról hónapra, észszerű és helyes kerekítésekkel kiszámítja a csökkenés mértékét, és ez alapján helyes választ ad, akkor teljes pontszámot kapjon.

hónap sorszáma	induló készlet (kg)	csökkenés (kg)
1.	700	168
2.	592	142,1
3.	509,9	122,4
4.	447,5	107,4
5.	400,1	96,0
6.	364,1	87,4
7.	336,7	80,8
8.	315,9	75,8
9.	300,1	72,0

hónap sorszáma	induló készlet (kg)	csökkenés (kg)
10.	288,1	69,1
11.	278,9	66,9
12.	272,0	65,3
13.	266,7	64,0
14.	262,7	63,0
15.	259,7	62,3
16.	257,3	61,8
17.	255,6	61,3
18.	254,2	61,0

1. b) második megoldás			
Megfelelő ábra. (A rombusz oldalának hossza x cm.) Ha $\angle CAB = \alpha$, akkor az ABC derékszögű háromszögben $\operatorname{tg} \alpha = \frac{8}{17}$, $\alpha \approx 25,2^\circ$.		1 pont	
$\angle D A Q = 90^\circ - 2\alpha \approx 39,6^\circ$		1 pont*	
Az ADQ háromszögből: $x = \frac{8}{\cos 39,6^\circ} \approx 10,38$ (cm).		1 pont*	
A rombusz területe $4x \approx 41,5$ cm.		1 pont	
Összesen:		5 pont	

Megjegyzés: A *-gal jelölt 2 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.


$AC = \sqrt{17^2 + 8^2} = \sqrt{353} \approx 18,79$ (cm) (Szinusztétellel az ACQ háromszögből)	1 pont
$x = \frac{\sin 25,2^\circ}{\sqrt{353} \cdot \sin(180^\circ - 2 \cdot 25,2^\circ)},$ ahonnan $x \approx 10,38$ (cm).	1 pont

2. a) első megoldás

Ha $x > 2$, akkor az eredeti egyenlet: $x - 2 = 7 + x - 0,25x^2$;	1 pont
ha $x \leq 2$, akkor pedig az eredeti egyenlet: $2 - x = 7 + x - 0,25x^2$.	1 pont
Nullára rendezve az első esetben $x^2 - 36 = 0$, a második esetben $x^2 - 8x - 20 = 0$ adódik.	1 pont
Az $x^2 - 36 = 0$ egyenlet gyökei a 6 és a -6,	1 pont
az $x^2 - 8x - 20 = 0$ egyenlet gyökei a 10 és a -2.	1 pont
A -6, illetve a 10 nem eleme a kijelölt alaphalmaznak (a 6 és a -2 igen).	1 pont
Ekvivalens átalakításokat végeztünk, így a 6 és a -2 gyöke az eredeti egyenletnek.	
	1 pont
Összesen: 7 pont	


Megjegyzés: Ha a vizsgázó az abszolútértéket indoklás nélkül elhagyja, megoldja a valós számok halmazán az $x - 2 = 7 + x - 0,25x^2$ egyenletet, majd ellenőrzi a kapott gyököket, akkor megoldására legfeljebb 3 pontot kaphat.

2. a) második megoldás	
$7 + x - 0,25x^2 = -\frac{1}{4}(x-2)^2 + 8$	1 pont
Az f : $x \mapsto x-2 $ függvény ábrázolása.	1 pont
A g : $x \mapsto -\frac{1}{4}(x-2)^2 + 8$ függvény ábrázolása (ugyanabban a koordináta-rendszerben).	2 pont
A metszéspontok első koordinátái: $x_1 = -2$ és $x_2 = 6$.	1 pont
$f(-2) = g(-2) = 4$ és $f(6) = g(6) = 4$, tehát az egyenletnek két megoldása van, a -2 és a 6 .	2 pont
Összesen:	7 pont




2. a) harmadik megoldás	
$7 + x - 0,25x^2 = -\frac{1}{4}(x-2)^2 + 8$	1 pont
Mivel $(x-2)^2 = x-2 ^2$, így $ x-2 = -\frac{1}{4} x-2 ^2 + 8$.	1 pont
Az adott egyenlet $ x-2 $ -re nézve másodfokú:	1 pont
$ x-2 ^2 + 4 x-2 - 32 = 0$.	1 pont
Az egyenlet gyökei $ x-2 = 4$ vagy $ x-2 = -8$.	1 pont
Az első esetből $x_1 = -2$ vagy $x_2 = 6$,	1 pont
a második eset viszont nem lehetséges ($ x-2 \geq 0$).	1 pont
Ellenőrzés behelyettesítéssel vagy ekvivalens átalakításokra való hivatkozással.	1 pont
Összesen:	7 pont

2. b) első megoldás	
Értelmezési tartomány: $x^2 - 200 > 0$ (azaz $x^2 > 200$).	1 pont
A 2-es alapú logaritmusfüggvény szigorúan monoton nő, ezért az eredeti egyenlőtlenségből $x^2 - 200 < 2^{20}$, azaz $x^2 < 2^{20} + 200$ következik, tehát $200 < x^2 < 2^{20} + 200$,	1 pont
azaz $\sqrt{200} < x < \sqrt{2^{20} + 200}$ ($\approx 1024,1$).	1 pont
(Mivel x egész szám, ezért) $15 \leq x \leq 1024$.	1 pont
$ x $ lehetséges értékeinek száma $1024 - 14 (= 1010)$.	1 pont
Mivel x negatív egész szám is lehet, az egyenlőtlenség megoldásainak száma $2 \cdot (1024 - 14) = 2020$.	1 pont
Összesen:	6 pont

7. c)	
Az alsó réteg négy gömbjének középpontja (az ábrán A, B, C és D) és a második réteg egyetlen gömbjének középpontja (az ábrán E) az $ABCDE$ szabályos négy-oldalú gúlát határozza meg. A gúla mindegyik éle 2 cm hosszú.	2 pont
	1 pont
A két rétegű piramis magassága a szabályos gúla (EF) magasságánál $(1 + 1 =) 2$ cm-rel nagyobb (mert az alsó réteg gömbjei az $ABCD$ négyzet síkja alatt 1 cm-rel érintik a vízszintes síkot, a piramis legfelső pontja pedig a gúla E csúcsa fölött van 1 cm-rel).	1 pont
Az $ABCD$ négyzet átlójának hossza $2\sqrt{2}$, ennek fele: $AF = \sqrt{2}$ (cm).	1 pont*
Az AFE derékszögű háromszögben (Pitagorasz-tétel-lel): $EF = \sqrt{2^2 - \sqrt{2}^2} = \sqrt{2}$ (cm).	1 pont*
A két rétegű piramis magassága tehát $(\sqrt{2} + 2 \approx) 3,41$ cm.	1 pont
Összesen:	6 pont

<i>Megjegyzés: A *-gal jelölt 2 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.</i>	
Az ADE szabályos háromszög EG magassága $\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 =\right) \sqrt{3}$ (cm).	1 pont
Az EGF derékszögű háromszögben (Pitagorasz-tétel-lel): $EF = \sqrt{\sqrt{3}^2 - 1^2} = \sqrt{2}$ (cm).	1 pont



7. b) első megoldás

(Teljes indukcióval bizonyítunk.) $n = 1$ esetén az állítás igaz, mert $1^2 = \frac{1 \cdot (1+1) \cdot (2+1)}{6} = 1$.	1 pont
Ha valamely $k \in \mathbf{N}^+$ esetén igaz az állítás, akkor belátjuk, hogy $k+1$ esetén is igaz, vagyis $1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$.	1 pont
Az indukciós feltevés miatt $1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 =$ $= (k+1) \left(\frac{k(2k+1)}{6} + k+1 \right) = (k+1) \cdot \frac{2k^2 + k + 6k + 6}{6} =$ $= \frac{(k+1)(2k^2 + 7k + 6)}{6}$.	1 pont
Mivel $2k^2 + 7k + 6 = (k+2)(2k+3)$, ezért $k+1$ esetén, és így minden pozitív egész esetén is igaz az állítás.	1 pont
Összesen:	6 pont

7. b) második megoldás

(Teljes indukcióval bizonyítunk.) $n = 1$ esetén az állítás igaz, mert $1^2 = \frac{1 \cdot (1+1) \cdot (2+1)}{6} = 1$.	1 pont
Ha valamely $k \in \mathbf{N}^+$ esetén igaz az állítás, akkor belátjuk, hogy $k+1$ esetén is igaz, vagyis $1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$.	1 pont
A bal oldalon felhasználva az indukciós feltevést: $\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$.	1 pont
Mindkét oldalt $(k+1)$ -gyel osztva ($k \neq -1$) és 6-tal szorozva: $k(2k+1) + 6(k+1) = (k+2)(2k+3)$. $2k^2 + k + 6k + 6 = 2k^2 + 7k + 6$.	1 pont
Ez azonososság, minden $k \in \mathbf{N}^+$ esetén igaz.	1 pont
Ekvivalens átalakításokat végeztünk, ezért az eredeti állításunk minden $n \in \mathbf{N}^+$ esetén igaz.	1 pont
Összesen:	6 pont

2. b) második megoldás

Értelmezési tartomány: $x^2 - 200 > 0$ (azaz $x^2 > 200$).	1 pont
A 2-es alapú logaritmusfüggvény szigorúan monoton nő, ezért az eredeti egyenlőtlenségből $x^2 - 200 < 2^{20}$, azaz $x^2 < 2^{20} + 200$ következik, 1-től 200-ig 14 darab pozitív négyzetszám van ($14^2 = 196$).	1 pont
Mivel $(2^{10})^2 < 2^{20} + 200 < (2^{10} + 1)^2$, ezért x^2 legnagyobb értéke $(2^{10})^2$.	1 pont
x^2 lehetséges értékeinek száma $2^{10} - 14 (= 1010)$.	1 pont
Mivel x negatív egész szám is lehet, az egyenlőtlenség megoldásainak száma $2 \cdot (2^{10} - 14) = 2020$.	1 pont
Összesen:	6 pont

3. a)

Há 67 000 fő az álláskereső 26,0%-a, akkor az álláskereső 1%-a $\left(\frac{67\,000}{26} \approx \right) 2577$ fő, az összes álláskereső száma pedig kb. 257 700,	1 pont	Az álláskeresők száma $\frac{67\,000}{0,26} \approx 257\,692$,
ami tízezer főre kerekítve 260 ezer fő.	1 pont	Ez a pont nem jár, ha a vizsgázó nem kerekít, vagy rosszul kerekít.
Összesen:	3 pont	

Megjegyzés: A 26,0% kerekített érték, ezért az álláskeresők számára (á) néve fennáll:
 $\frac{67\,000}{0,2605} < \hat{a} \leq \frac{67\,000}{0,2595}$, vagyis $257\,197 \leq \hat{a} \leq 258\,189$.

Ha a hírből szereplő 67 000 fő ezresre kerekített, akkor ez a szám a $[66\,500; 67\,499] \cap \mathbf{N}$ halmaz egyik eleme, és így $255\,279 \leq \hat{a} \leq 260\,112$ adódik. A 260 000 fő tehát ebben az esetben is helyes válasz a feladat kérdésére.

3. b) első megoldás

Az álláskeresők száma (á) a munkavállalási korú népesség létszámával (m) kifejezve: $\hat{a} = m \cdot 0,038$, a gazdaságilag aktív népesség létszámával (g) kifejezve pedig: $\hat{a} = g \cdot 0,056$. $m \cdot 0,038 = g \cdot 0,056$	1 pont
$g = m \cdot \frac{0,038}{0,056} = m \cdot \frac{19}{28} \approx m \cdot 0,679$.	1 pont
A munkavállalási korú népességnek kb. 68%-a volt a gazdaságilag aktív népesség.	1 pont
Összesen:	4 pont

Megjegyzés: Ha a vizsgázó további szöveges indoklás nélkül, csak a 3,8 és az 5,6 (vagy a 0,038 és a 0,056) hányadosának kiszámításával ad választ a feladat kérdésére, akkor legfeljebb 2 pontot kaphat.

3. b) második megoldás	
(Az álláskeresők száma az a) feladat alapján 260 000 fő, ezért), a gazdaságilag aktív népesség létszáma $260\,000:0,056 \approx 4\,640\,000$ fő,	1 pont
a munkavállalási korú népesség létszáma 260 000 : 0,038 $\approx$ 6 840 000 fő.	1 pont
A két szám aránya: $(4\,640\,000:6\,840\,000 \approx) 0,678$.	1 pont
A munkavállalási korú népességnek kb. 68%-a volt a gazdaságilag aktív népesség.	1 pont
Összesen:	4 pont

Megjegyzés: Ha a vizsgázó az a) feladatban hibásan állapította meg az álláskeresők számát, de a hibás adattal helyesen számol (és így helyes végeredményre is jut), akkor teljes pontszámot kapjon.

3. c)	
Például 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21.	2 pont
Ebben a példában a medián 4,	
az átlag $\left(\frac{1+2+3+4+5+6+21}{7} = \frac{42}{7}\right) = 6$.	1 pont
Összesen:	3 pont

Megjegyzés: Ha a vizsgázó olyan számokat ad meg, amelyek között egyenlők is vannak, akkor összesen legfeljebb 2 pontot kaphat.

3. d) első megoldás	
Azt, hogy a dolgozók felének legfeljebb (legalább) mennyi a bére, a mediánból mutatja meg. Az átlagbér nem ad információt a bérek tényleges eloszlásáról. (A mediánból több vagy kevesebb is lehet, mint az átlagbér.)	2 pont
Összesen:	2 pont

3. d) második megoldás	
Ha a dolgozók egy (kisebb) részének kiugróan magas a bére (jóval magasabb, mint a medián), akkor az átlagbér magasabb is lehet, mint a mediánból. Virág úr bére így lehet több, mint a dolgozók felének a bére, de mégis kevesebb, mint az átlagbér.	2 pont
Összesen:	2 pont

Megjegyzés: A vizsgázó hivatkozhat a c) feladatban adott válaszára is. Például a c) feladat fenti megoldásában adott hét szám esetén a medián 4, az átlag 6. Virág úr fizetésének pedig az 5 felel meg: az 5 nagyobb, mint az adatok fele, mégis „átlag alatti”.

7. a) negyedik megoldás	
A piramist alkotó 30 golyó helyét 1-től 30-ig sorsozozzuk meg (az alsó rétegtől kezdve), a dobozba kikészített 30 golyót pedig állítsuk sorba. A golyókat a sorban elfoglalt helyükkel azonos sorszámú helyre tesszük a piramisban.	1 pont
A 30 golyó a színek alapján $\frac{30!}{15! \cdot 15!}$ ($= 155\,117\,520$) különböző módon állítható sorba (összes eset száma).	1 pont
A kedvező esetek azok, amelyekben a piramis 26., 27., 28. és 29. sorszámú helyén sötét golyó áll (a többi 26 helyen pedig tetszőleges sorrendben áll a többi golyó).	1 pont
A kedvező esetek száma tehát: $\frac{26!}{11! \cdot 15!}$ ($= 7\,726\,160$).	
A keresett valószínűség: $\frac{7\,726\,160}{155\,117\,520} = \frac{13}{261} \approx 0,0498$.	1 pont
Összesen:	4 pont

7. a) ötödik megoldás	
(Ha a piramist „alulról felfelé” haladva építjük, akkor) az utolsó 5 helyre $\binom{30}{5}$ ($= 142\,506$)-féleképpen kerülhet golyó (az összes eset száma).	1 pont
Ezek közül $\binom{15}{5}$ esetben az utolsó 5 golyó sötét, $\binom{15}{1} \cdot \binom{15}{4}$ esetben pedig az utolsó 5 golyó között 4 sötét és 1 világos van.	1 pont
Ez utóbbiak egyötödében, azaz $\frac{15 \cdot \binom{15}{4}}{5}$ esetben az utolsó golyó világos, az előtte levő 4 pedig sötét.	
A kedvező esetek száma: $\binom{15}{5} + 3 \cdot \binom{15}{4}$ ($= 7098$).	1 pont
A keresett valószínűség: $\frac{7098}{142\,506} = \frac{13}{261} \approx 0,0498$.	1 pont
Összesen:	4 pont


7. a) első megoldás	
Válasszuk ki először a vizsgált második rétegbe kerülő golyókat (a többi golyó kiválasztása a keresett valószínűséget nem befolyásolja). Az első golyó 15, a második 14, a harmadik 13, a negyedik 12, a ötödik 29, a hatodik 28, a hetedik 27 valószínűséggel lesz sötét.	2 pont
A keresett valószínűség a négy szám szorzata: $\frac{15}{30} \cdot \frac{14}{29} \cdot \frac{13}{28} \cdot \frac{12}{27},$	1 pont
vagyis $\frac{32\,760}{657\,720} = \frac{13}{261} \approx 0,0498$.	1 pont
Összesen:	4 pont

7. a) második megoldás	
Sorrendre való tekintet nélkül $\binom{30}{4}$ ($= 27\,405$)-féle- képpen választhatunk 4 golyót a második rétegbe (ezek a kiválasztások mind egyenlően valószínűk; ez az összes eset száma),	1 pont
ezek között $\binom{15}{4}$ ($= 1365$) kedvező eset van.	1 pont
A keresett valószínűség a két szám hányadosa: $\frac{\binom{15}{4}}{\binom{30}{4}},$	1 pont
vagyis $\frac{1365}{27\,405} = \frac{13}{261} \approx 0,0498$.	1 pont
Összesen:	4 pont

7. a) harmadik megoldás	
Sorsámozzuk meg 1-től 30-ig a kikészített golyókat! A piramis 30 helyére 30! különböző sorrendben helyezhetjük el őket (ezek az elhelyezések mind egyenlően valószínűk; ez az összes eset száma).	1 pont
A felülről második szintre 4 (sorszámozott) sötét golyót 15 · 14 · 13 · 12 különböző módon tehetünk.	1 pont
A megmaradt 26 golyót tetszőleges sorrendben felhasználva egy-egy kedvező esetet kapunk, tehát a kedvező esetek száma: 26! · 15 · 14 · 13 · 12.	1 pont
A keresett valószínűség: $\frac{26! \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12}{30!} = \frac{13}{261} \approx 0,0498.$	1 pont
Összesen:	4 pont

4. a)	
(Az e nem megy át az origón.) A négyzet másik átlóegyeneseinek meredeksége 2; ez az egyenes átmegy az origón, így egyenlete $y = 2x$. A négyzet E középpontja az átlóegyeneseinek metszéspontja, ennek koordinátáit az alábbi egyenletrendszer megoldása adja. $y = 7 - \frac{1}{2}x$ $y = 2x$	1 pont
(Behelyettesítő módszerrel dolgozva.) $2x = 7 - \frac{1}{2}x, \quad x = \frac{14}{2} = 2,8, \quad y = 2 \cdot 2,8 = 5,6$. Tehát $E(2,8; 5,6)$.	1 pont
Az origó és E távolsága: $OE = \sqrt{2,8^2 + 5,6^2} = \sqrt{39,2}$.	1 pont*
A négyzet területe $\frac{2OE \cdot 2OE}{2} =$	1 pont*
$= 78,4$ (területegység).	1 pont
Összesen:	7 pont
<i>A négyzet oldala</i> $a = \sqrt{2} \cdot OE = \sqrt{2} \cdot \sqrt{39,2},$ <i>területe</i> $a^2 = 78,4$ (te).	

<i>Megjegyzés: A *-gal jelölt 2 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.</i> Az e egyenlete $x + 2y - 14 = 0$ alakra hozható. (A pont és egyenes távolságképlete szerint) az origó és az e távolsága $\frac{ 0 + 2 \cdot 0 - 14 }{\sqrt{5}} = \frac{14}{\sqrt{5}}.$	1 pont
A négyzet területe $\frac{\left(\frac{14}{\sqrt{5}}\right)^2}{2} \cdot 2 =$	1 pont
<i>Megjegyzés: A négyzet csúcsainak koordinátái</i> $(0; 0), (8,4; 2,8), (5,6; 11,2), (-2,8; 8,4)$.	

4. b)		
A két görbe közös pontjainak első koordinátáját a $7 - \frac{1}{2}x = -\frac{(x-4)^2}{4} + 7$ egyenlet megoldásai adják.	1 pont	
$x^2 - 10x + 16 = 0$,	1 pont	
innen $x_1 = 2$, $x_2 = 8$.	1 pont	
Legyen $f: x \mapsto 7 - \frac{1}{2}x$ és $g: x \mapsto -\frac{(x-4)^2}{4} + 7$ ($x \in \mathbf{R}$). (Mivel a g grafikonja a metszéspontok között az f grafikonja fölött van, ezért) a kérdezett T területre fennáll: $T = \int_2^8 (g - f)$.	1 pont*	$T = \int_2^8 (f - g)$
$g(x) - f(x) = \frac{(x-4)^2}{4} + 7 - 7 + \frac{1}{2}x = \frac{-x^2 + 10x - 16}{4}$	1 pont*	
$T = \int_2^8 \frac{-x^2 + 10x - 16}{4} dx = \left[-\frac{x^3}{12} + \frac{5x^2}{4} - 4x \right]_2^8 =$ $= -\frac{8^3}{12} + \frac{5 \cdot 8^2}{4} - 4 \cdot 8 - \left(-\frac{2^3}{12} + \frac{5 \cdot 2^2}{4} - 4 \cdot 2 \right) =$ $= \frac{16}{3} + \frac{11}{3} = 9$ (te)	1 pont*	
	1 pont*	
	Összesen:	7 pont
<i>Megjegyzés: A *-gal jelölt 4 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.</i> (A metszéspontok közötti parabolaív az x tengely fölött van, ezért) a parabolaív alatti terület:		
$\int_2^8 \left(\frac{(x-4)^2}{4} + 7 \right) dx = \int_2^8 \left(-\frac{1}{4}x^2 + 2x + 3 \right) dx =$ $= \left[-\frac{x^3}{12} + x^2 + 3x \right]_2^8 =$ $= \frac{8^3}{12} + 8^2 + 3 \cdot 8 - \left(\frac{2^3}{12} + 2^2 + 3 \cdot 2 \right) = \frac{136}{3} - \frac{28}{3} = 36$.	1 pont	$\int_2^8 \left(-\frac{(x-4)^2}{4} + 7 \right) dx =$ $= \left[-\frac{(x-4)^3}{12} + 7x \right]_2^8 =$
A metszéspontok közötti (az x tengely fölött elhelyezkedő) szakasz alatti derékszögű trapéz párhuzamos oldalainak hossza ($f(2) = 6$, illetve ($f(8) = 5$)) 3, magassága 6, területe pedig $\frac{6+5}{2} \cdot 6 = 27$.	1 pont	
A kérdezett terület nagysága $36 - 27 = 9$ (te).	1 pont	

ezért ugyanannyi-féleképpen választható a piros éllel közös csúcsú él, mint olyan él, amelynek azzal nincs közös csúcsa: $\frac{(n-2)(n-3)}{2} = 2(n-2)$.	2 pont	
Mivel $n - 2 \neq 0$, ezért $\frac{n-3}{2} = 2$.	1 pont	
$n = 7$ (tehát 7 pontú a gráf).	1 pont	
Összesen:	9 pont	
6. c) második megoldás		
Az n pontú teljes gráfnak $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ éle van, így a második él $\frac{n(n-1)}{2} - 1$ darab él közül választható ki (összes eset száma).	1 pont	
Egy olyan él, amelynek nincs közös csúcsa a piros éllel, a maradék $(n-2)$ pontú teljes gráf egyik éle. Ilyen élből $\binom{n-2}{2} = \frac{(n-2)(n-3)}{2}$ van (kedvező esetek száma).	2 pont	<i>A piros él mindkét végpontjából $n-2$ további él indul, tehát $2(n-2)$ olyan él van, melynek van közös csúcsa a piros éllel.</i>
Mivel A és B események egymásnak komplementerei, és a feladat szövege szerint $P(A) = P(B)$, ezért $P(A) = 0,5$.	1 pont	$P(B) = 0,5$
Innen $\frac{\frac{(n-2)(n-3)}{2}}{\frac{n(n-1)}{2} - 1} = \frac{1}{2}$.	1 pont	$\frac{2(n-2)}{n(n-1) - 1} = \frac{1}{2}$
$\frac{n^2 - 5n + 6}{n^2 - n - 2} = \frac{1}{2}$	1 pont	$\frac{4(n-2)}{n^2 - n - 2} = \frac{1}{2}$
Nullára rendezve $n^2 - 9n + 14 = 0$.	1 pont	$\frac{4(n-2)}{(n-2)(n+1)} = \frac{1}{2}$
A másodfokú egyenlet gyökei 2 és 7.	1 pont	$\frac{(n \neq 2 \text{ miatt})}{n+1} = \frac{1}{2}$ $8 = n + 1,$
(Az $n \geq 3$ feltétel miatt) a 2 nem megoldása a feladatnak, tehát 7 pontú a gráf.	1 pont	$n = 7$ (tehát 7 pontú a gráf).
Összesen:	9 pont	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó igazolja, hogy a 7 pontú teljes gráf megfelelő, de nem bizonyítja, hogy más megoldása nincs a feladatnak, akkor ezért 3 pontot kapjon.


6. a)

A szabályos tízsög egy belső szöge 144° -os.	1 pont
	2 pont*
A tízsög oldalának (cm-ben mért) hosszát jelölje x . Koszínusztétellel: $6^2 = x^2 + x^2 - 2 \cdot x \cdot x \cdot \cos 144^\circ = 2 \cdot (1 - \cos 144^\circ) \cdot x^2$, ahonnan ($x > 0$ miatt) $x \approx 3,15$ (cm).	
Összesen:	1 pont 4 pont


Megjegyzés: A *-gal jelzett 2 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.

A legrovidebb átló által levágott egyenlő szárú háromszög másik két szöge 18° -os. A tízsög oldalának (cm-ben mért) hosszát jelölje x . Szinusztétellel:

$\frac{x}{6} = \frac{\sin 18^\circ}{\sin 144^\circ}$.

	2 pont
Ha a tízsög oldalának hossza x cm, akkor az ábrán látható derékszögű háromszögből: $\sin 72^\circ = \frac{3}{x}$,	

6. b)

Nem igaz.	1 pont
Jó ellenpélda, például: 	2 pont
Összesen:	3 pont

6. c) első megoldás

Egy olyan él, amelynek nincs közös csúcsa a piros éllel, a maradék $(n - 2)$ pontú teljes gráf egyik éle. Ilyen élből $\binom{n-2}{2} = \frac{(n-2)(n-3)}{2}$ van.	2 pont
A piros él mindkét végpontjából $n - 2$ további él indul, tehát $2(n - 2)$ olyan él van, melynek van közös csúcsa az elsőnek kiválasztott éllel.	2 pont
Mivel $P(A) = P(B)$, és az összes eset száma megegyezik,	1 pont

II.

5. a) első megoldás

Ha a sorozat első tagja az 1, akkor a következő 10 lehetőség van: 1, 3, 5, 7; 1, 3, 5, 8; 1, 3, 5, 9; 1, 3, 6, 8; 1, 3, 6, 9; 1, 3, 7, 9; 1, 4, 6, 8; 1, 4, 6, 9; 1, 4, 7, 9; 1, 5, 7, 9.	2 pont*
Ha a sorozat első tagja a 2, akkor a következő 4 lehetőség van: 2, 4, 6, 8; 2, 4, 6, 9; 2, 4, 7, 9; 2, 5, 7, 9.	1 pont
Ha a sorozat első tagja a 3, akkor egyetlen lehetőség van: 3, 5, 7, 9.	1 pont
(A sorozat első tagja nem lehet 3-nál nagyobb.) Összesen tehát $(10 + 4 + 1 =) 15$ lehetőség van a sorozat első négy tagjának megválasztására.	1 pont
Összesen:	5 pont

Megjegyzés: Hibát követ el a vizsgázó, ha a felsorolt négy szám között vannak szomszédosak, ha 10-nél kevesebb lehetőséget ad meg, vagy ha 10 lehetőséget ad meg, de ezek közötti azonosak is vannak. Egy vagy két hiba esetén a *-gal jelölt 2 pontból 1 pontot kapjon, több hiba esetén pedig 0 pontot.

5. a) második megoldás

Rendezzük nagyság szerint növekedő sorrendbe az $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$ halmaz elemeit, majd ebben a sorban jelölje $\bullet$ a kiválasztott, $\times$ pedig a nem kiválasztott számokat. (Ezzel a jelöléssel például az $\bullet \times \times \times \times \bullet \times \times \bullet \times$ jelso-rozat az 1, 3, 6, 8 „jó” választásnak felel meg.)	1 pont
A követelményeknek eleget tevő minden egyes számnegyessel kölcsönösen egyértelműen feleltethető meg egy olyan 9 hosszúságú jelsorozat, amelyben 5 darab $\times$ és 4 darab $\bullet$ van, és a $\bullet$ jelek között nincsenek szomszédosak.	1 pont
Az 5 darab $\times$ megadása 6 lehetőséget ad meg a 4 darab $\bullet$ helyének megválasztására ($*\times*\times*\times*\times*$).	1 pont*
Összesen tehát $\binom{6}{4} = 15$ lehetőség van a sorozat első négy tagjának megválasztására.	2 pont*
Összesen:	5 pont

<i>Megjegyzés: A *-gal jelölt 3 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.</i>		
A 4 darab $\bullet$ elhelyezése után 3 darab $\times$ -et tegyünk közéjük: $\bullet \times \bullet \times \bullet \times \bullet \times \bullet$.	1 pont	
A fennmaradó 2 darab $\times$ a $\bullet$ jelek által meghatározott 5 hely bármelyikére tehető, ismétléssel is.		
Ez 5 elem másodosztályú ismétléses kombinációja, összesen tehát $\binom{5+2-1}{2} = \binom{6}{2} = 15$ lehetőség van.	2 pont	
5. a) harmadik megoldás		
Ha a sorozat második tagjából 1-et, a harmadik tagjából 2-t, a negyedik tagjából pedig 3-at levonunk, akkor egy olyan szigorúan monoton növekedő sorozat első négy tagját kapjuk, amely tagokat az $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ halmazból választottuk.	2 pont	
Fordítva, ha az $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ halmazból választott, nagyság szerint növekedő sorrendben megadott négy szám közül a másodikhoz 1-et, a harmadikhoz 2-t, a negyedikhez 3-at adunk, akkor olyan négy számot kapunk, amely a sorozat első négy tagja lehet.	1 pont	
Ennek a négy tagnak a megválasztására $\binom{6}{4} = 15$ lehetőségünk van. (A kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés miatt tehát) összesen 15 különböző lehetőség van a sorozat első négy tagjának megválasztására.	2 pont	
Összesen:		5 pont

5. a) negyedik megoldás	
Jelölje $f(n, k)$ azoknak a szigorúan monoton növekvő sorozatoknak a számát, amelyek első k tagját az $\{1; 2; \dots; n\}$ halmazból választjuk ki, és a sorozat tagjai között nincsenek szomszédos egész számok. A feladat $f(9, 4)$ meghatározása.	
Fennáll az $f(n, k) = f(n-1, k) + f(n-2, k-1)$ összefüggés. Ugyanis, ha n nincs a sorozat első k tagja között, akkor az $\{1; 2; \dots; n-1\}$ halmazból kell k darab elemet kiválasztani; míg ha n tagja a sorozatnak, akkor az $n-1$ nem lehet tagja, és így az $\{1; 2; \dots; n-2\}$ halmazból kell $k-1$ darab elemet kiválasztani.	2 pont

A kezdeti értékek: $f(n, 1) = n$, továbbá $f(7, 4) = f(5, 3) = f(3, 2) = f(1, 1) = 1$. A rekurzív formulát alkalmazva: $f(9, 4) = f(8, 4) + f(7, 3)$, ahol $f(8, 4) = f(7, 4) + f(6, 3) = 1 + f(6, 3)$ és $f(7, 3) = f(6, 3) + f(5, 2)$, $f(6, 3) = f(5, 3) + f(4, 2) = 1 + f(4, 2)$, $f(5, 2) = f(4, 2) + f(3, 1) = f(4, 2) + 3$, és végül $f(4, 2) = f(3, 2) + f(2, 1) = 1 + 2 = 3$. Innen „visszafelé lépkedve”: $f(5, 2) = 6$, $f(6, 3) = 4$, $f(7, 3) = 10$, $f(8, 4) = 5$, $f(9, 4) = 15$.	3 pont	$f(9, 4) =$ $= 1 + 2f(6, 3) + f(5, 2) =$ $= 6 + 3f(4, 2) =$ $= 6 + 3 \cdot 3 = 15$
Összesen:		5 pont
5. b)		
A háromjegyű számok száma 900 (összes eset).	1 pont	
Legyenek a , b és c szomszédos számjegyek ($b = a + 1$ és $c = b + 1 = a + 2$). Ekkor a keresett szám lehet $\overline{abc}$ vagy $\overline{cba}$ alakú.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
$\overline{abc}$ alakú megfelelő háromjegyű számból 7 darab van (mert ekkor $1 \leq a \leq 7$), $\overline{cba}$ alakú megfelelő számból 8 darab van (mert ekkor $0 \leq a \leq 7$), Összesen tehát 15 darab megfelelő szám van (kétvezető esetek száma).	2 pont	$\overline{abc}$ alakú: 789, 678, 567, 456, 345, 234, 123; $\overline{cba}$ alakú: 210, 321, 432, 543, 654, 765, 872, 981. Ez összesen 15 megfelelő szám.
A kértezett valószínűség $\frac{15}{900} = \frac{1}{60}$ ($\approx 0,017$).	1 pont	
Összesen:		5 pont

5. c)		
$b = a + 1$, $c = a + 2$ és $d = a + 3$. (A kilences számrendszer helyiértékei 1, 9 és 81, így) $N = 81a + 9(a + 1) + (a + 2)$; (a nyolcas számrendszer helyiértékei 1, 8 és 64, így) $N = 64(a + 1) + 8(a + 2) + (a + 3)$.	2 pont	
$81a + 9(a + 1) + (a + 2) = 64(a + 1) + 8(a + 2) + (a + 3)$	1 pont	
$91a + 11 = 73a + 83$	1 pont	
$18a = 72$, azaz $a = 4$.	1 pont	
A tízes számrendszerben $N = (91a + 11 =) 375$.	1 pont	
Ellenőrzés: $375_{10} = 456_9 = 567_8$, és ezek valóban megfelelőek a kilences és nyolcas számrendszerben.	1 pont	
Összesen:		6 pont

Megjegyzés: Teljes pontszámot kapjon a vizsgázó, ha a szóba jöhető öt, nyolcas számrendszerbeli szám kilences számrendszerbeli alakját ellenőrizve helyes választ ad
($123_8 = 83_{10} = 102_9$, $234_8 = 156_{10} = 183_9$, $345_8 = 229_{10} = 274_9$, $456_8 = 302_{10} = 365_9$, $567_8 = 375_{10} = 456_9$).