

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. május 3.

MATEMATIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Fontos tudnivalók

Formai előírások:


- Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal, olvashatóan** javítsa ki.
- A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerüljön.
- Kifogástalan megoldás** esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetése mellett kipipálással jelezze, hogy az adott gondolati egységet látta, és jónak minősítette.
- Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy **a hiba jelzése** mellett az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy fölösleges.
- A javítás során **alkalmazza az alábbi jelöléseket**.
 - helyes lépés: *kipipálás*
 - elvi hiba: *készszeres aláhúzás*
 - számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: *egyszeres aláhúzás*
 - rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: *szaggatott vagy áthúzott kipipálás*
 - hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: *hiányjel*
 - nem érthető rész: *kérdőjel és/vagy hullámvonal*
- Az ábrán kívül **ceruzával** írt részeket ne értékelje.

Tartalmi kérések:

- Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadjuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
- A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók, ha csak az útmutató másképp nem rendelkezik**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
- Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
- Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel – mint kiinduló adattal – helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdésekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
- Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.

9. b) második megoldás		
$(2\sqrt{2})^2 + 2 \cdot 4 = 16$, valamint $(2\sqrt{2})^2 + (4 - 3)^2 = 9$ is igaz (ezért Q valóban pontja a parabolának és a körnek is).	2 pont	
A kör $Q(2\sqrt{2}; 4)$ pontbeli érintőjének egy normálvektora $\mathbf{n} = \overrightarrow{CQ} = (2\sqrt{2}; 1)$,	1 pont	
ezért az érintő meredeksége $-\frac{2\sqrt{2}}{1} = -2\sqrt{2}$.	1 pont	<i>Az érintő egyenlete</i> $2\sqrt{2}x + y = 12$.
Az $f(x) = -\frac{1}{2}x^3 + 8$ ($x \in \mathbf{R}$) függvény deriváltfüggvénye $f'(x) = -x$,	1 pont	
ezért a parabolához a Q -ban húzott érintő meredeksége $f'(2\sqrt{2}) = -2\sqrt{2}$.	1 pont	<i>Az érintő egyenlete</i> $y = -2\sqrt{2}x + 12$.
A két görbének tehát valóban közös a Q -beli érintője.	1 pont	
Összesen:	7 pont	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó megoldásához közelítő értéket is felhasznál, akkor legfeljebb 6 pontot kapjon.



9. c)		
Az $x^2 = 16$ egyenlet megoldásaiból kapjuk, hogy a parabola -4 -ben és 4 -ben metszi az x tengelyt.	1 pont	
A parabola és az x tengely által közrezárt korlátos síkidom területe $\int_{-4}^4 \left(-\frac{1}{2}x^2 + 8\right) dx =$	1 pont	
$= \left[-\frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + 8x\right]_{-4}^4 =$	1 pont	
$= \left(-\frac{32}{3} + 32\right) - \left(\frac{32}{3} - 32\right) =$	1 pont	
$= \frac{128}{3}$.	1 pont	
Összesen:	5 pont	

6. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem.
7. A megoldásokért jutalompont (az adott feladatra vagy feladatrésze előírt maximális pontszámot meghaladó pont) nem adható.
8. Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám nem lehet negatív.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért nem jár pontlevonás, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használt fel.
10. A gondolatmenet kifejtése során a zsebszámológép használata – további matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, $n!$, $\binom{n}{k}$ kiszámítása, a függvénytáblázatban fellelhető táblázatok helyettesítése ($\sin$, $\cos$, $\lg$, $\log$ és ezek inverzei), a π és az e szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek az átlag és a szórás kiszámítására abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, így azokért nem jár pont.
11. Az ábrák bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása méréssel) nem elfogadható.
12. Valósínűségek megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a százlékban megadott helyes válasz is elfogadható.
13. Ha egy feladat szövege nem ír elő kerekítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadottól eltérő, észszerű és helyes kerekítésekkel kapott rész- és végeredmény is elfogadható.
14. A vizsgafeladat sor II. részében kitűzött 5 feladat közül csak 4 feladat megoldása értékelhető. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.

I.

1. a)	
$9 \cdot 9^x + 15 \cdot 3^x - 6 = 0$	1 pont
Mivel $9^x = (3^x)^2$, ezért az egyenlet 3^x -ben másodfokú:	1 pont
$9 \cdot (3^x)^2 + 15 \cdot 3^x - 6 = 0$.	
$3^x = -2$ vagy $3^x = \frac{1}{3}$.	1 pont
Az első eset nem lehetséges (mert $3^x > 0$),	1 pont
a második esetből pedig $x = -1$ adódik.	1 pont
Ellenőrzés behelyettesítéssel vagy ekvivalens átalakításokra való hivatkozással.	1 pont
Összesen:	6 pont

1. b)	
$\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$	1 pont
$2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k \cdot 2\pi$ vagy $2x - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbf{Z}$.	2 pont
$x = \frac{\pi}{4} + k \cdot \pi$ vagy $x = \frac{7\pi}{12} + k \cdot \pi, k \in \mathbf{Z}$.	2 pont
Összesen:	5 pont

Megjegyzések:


- Ha a vizsgázó a megoldásokat fokban helyesen adja meg, akkor legfeljebb 4 pontot kaphat.
- Ha a vizsgázó a választát periódus nélkül vagy hibás periódussal adja meg, akkor legfeljebb 3 pontot kaphat.
- Ha a vizsgázó a választát periódussal adja meg, de a $k \in \mathbf{Z}$ feltételt egyszer sem említi, akkor legfeljebb 4 pontot kaphat.

2. a)	
A számtani sorozat összegképletét használva:	1 pont
$\frac{2 \cdot 5 + 3(n-1)}{2} \cdot n = 4900$.	
$3n^2 + 7n - 9800 = 0$	2 pont
$n_1 = 56$ (ami valóban megoldása a feladatnak),	1 pont
$n_2 (= -58, \hat{3}) < 0$, ami nem megoldás.	1 pont
Összesen:	5 pont

8. c)		
András, Csaba és Dóra összes lehetséges dobásainak száma $6^3 (= 216)$.	1 pont	
Bori pontosan akkor nyer, ha		
– a többiek mindhármán 5-nél kisebbet dobnak,		
– vagy a többiek mindhármán 6-ost dobnak,	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
– vagy pontosan ketten dobnak 6-ost, egy valaki pedig 5-nél kisebbet dob.		
Mindhármán 5-nél kisebbet $4^3 (= 64)$ -féleképpen dobhatnak.	1 pont	
Mindhármán 6-ost csak 1-féleképpen dobhatnak.	1 pont	
A három dobás között pontosan két 6-os és egy 5-nél kisebb dobás $\binom{3}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 4 (= 12)$ -féleképpen lehetséges.	1 pont	
A kérdezett valószínűség:		
$\frac{64 + 1 + 12}{216} = \frac{77}{216} \quad (\approx 0,356)$.	1 pont	
Összesen:	6 pont	

9. a)		
A parabola egyenlete átrendezve: $y = -\frac{1}{2}x^2 + 8$.	1 pont	
Ez tehát egy „lefelé nyíló” parabola, melynek paramétere $p = 1$, tengelypontja pedig a $(0; 8)$ pont.	1 pont	
A parabola fókuszpontja ezért a $(0; 7,5)$ pont.	1 pont	
A kör középpontja a $C(0; 3)$ pont.	1 pont	
Összesen:	4 pont	


9. b) első megoldás		
$(2\sqrt{2})^2 + 2 \cdot 4 = 16$,		
valamint $(2\sqrt{2})^2 + (4 - 3)^2 = 9$ is igaz (ezért Q valóban pontja a parabolának és a körnek is).	2 pont	
A kör $Q(2\sqrt{2}; 4)$ pontbeli érintőjének egy normálvektora $\mathbf{n} = \overrightarrow{CQ} = (2\sqrt{2}; 1)$,	1 pont	
egyenlete $2\sqrt{2}x + y (= 2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} + 1 \cdot 4) = 12$.	1 pont	
Az érintő egyenletéből y -t kifejezve és beírva a parabola egyenletébe: $x^2 + 24 - 4\sqrt{2}x = 16$.	1 pont	
Rendezve $x^2 - 4\sqrt{2}x + 8 = 0$, azaz $(x - 2\sqrt{2})^2 = 0$.	1 pont	
Ennek az egyenletnek egy megoldása van ($x = 2\sqrt{2}$), ezért a kör érintőjének egy közös pontja van a parabolával (és nem párhuzamos az y tengellyel), tehát érinti a parabolát is.	1 pont	
Összesen:	7 pont	

8. b) első megoldás		
Ha a lejátszott 9 mérkőzést a hatpontú $ABCDEF$ egyszerű gráffal szemléltetjük, akkor a gráfban a csúcsok fokszámának összege $(2 \cdot 9 =) 18$.	1 pont	
	1 pont	
A feladat szövege szerint B, C, D, E, F fokszáma 1, 3 vagy 5 lehet, és az öt fokszám összege 17 (mert 4 fokszáma 1).		
Legalább egy 5 fokszámú csúcsnak lennie kell közöttük (ha nem lenne, akkor a fokszámok összege legfeljebb $5 \cdot 3 = 15$ lenne).	1 pont	
Csak a B csúcsnak lehet 5 a fokszáma, mert csak B játszott A -val.	1 pont	
Ezzel a feltétellekkel a C, D, E, F csúcsok fokszáma csak 3 lehet (mert a négy csúcs fokszámának összege 12).	1 pont	<i>Elkork CDEF részgráfban minden csúcs fokszáma 2,</i>
Mivel C és E között nincs él, ezért a CB, CD, CF élek és az EB, ED, EF élek is léteznek.	1 pont	<i>és a CE él nem létezik.</i>
Így a D -ből induló 3 él DB, DC és DE . A DF él tehát nem létezik. Dóra nem játszott még Fanni ellen.	1 pont	
Összesen: 7 pont		
<i>Megjegyzés: Ha a vizsgázo további indoklás nélkül helyesen felrajtolja a már lejátszott mérkőzések gráfját, és ez alapján jól válaszol, akkor ezért 4 pontot kapjon.</i>		
8. b) második megoldás		
Ha a lejátszott 9 mérkőzést a hatpontú $ABCDEF$ egyszerű gráffal szemléltetjük, akkor a $BCDEF$ részgráfban 8 élt kell behúzni az összesen lehetséges 10-ből (mert az A -ból csak B -be indul él).	3 pont	
	1 pont	
A két hiányzó él közül az egyik a CE . A másik hiányzó él nem indulhat sem C -ből, sem E -ből, mert akkor annak a pontnak a fokszáma 2 lenne (tehát páros), sem B -ből, mert akkor ennek a fokszáma 4 lenne (tehát páros).	2 pont	
A másik nem behúzott él ezért csak a DF lehet, azaz Dóra nem játszott még Fanni ellen.	1 pont	
Összesen: 7 pont		

2. b) első megoldás		
Jelölje a mértani sorozat első tagját a , hányadosát q . $\begin{cases} a + aq = 6 \\ aq^2 + aq^3 = 96 \end{cases}$	2 pont	
	2 pont	
A második egyenlet átalakítva: $q^2(a + aq) = 96$. Ezt az egyenletet elosztva az elsővel megkapjuk, hogy $q^2 = 16$, amiből $q = 4$ vagy $q = -4$.	1 pont	
(Az első egyenletből) $q = 4$ esetén $a = \frac{6}{5}$,	1 pont	<i>Az első négy tag: 1,2; 4,8; 19,2; 76,8.</i>
$q = -4$ esetén $a = -2$.	1 pont	<i>vagy -2; 8; -32; 128.</i>
Ellenőrzés: $\frac{6}{5} + \frac{24}{5} \left(= \frac{30}{5} \right) = 6$ és $\frac{96}{5} + \frac{384}{5} \left(= \frac{480}{5} \right) = 96$,	1 pont	
illetve $(-2) + 8 = 6$ és $(-32) + 128 = 96$.		
Összesen: 8 pont		
2. b) második megoldás		
Jelölje a mértani sorozat első tagját a , hányadosát q . $\begin{cases} a + aq = 6 \\ aq^2 + aq^3 = 96 \end{cases}$	2 pont	
	1 pont	
Az első egyenletből q -t kifejezve: $q = \frac{6-a}{a}$ ($a \neq 0$). Ezt a második egyenletbe behelyettesítve: $\frac{a}{(6-a)^2} + \frac{(6-a)^3}{a^2} = 96.$		
$a(36 - 12a + a^2) + (216 - 108a + 18a^2 - a^3) = 96a^2$ Rendezve és 18-cal osztva: $5a^2 + 4a - 12 = 0$,	1 pont	$\frac{(6-a)^2}{(6-a)^2} = (4a)^2$ $6-a = 4a$ vagy $a-6 = 4a$
amiből $a = \frac{6}{5}$ vagy $a = -2$.	1 pont	
$a = \frac{6}{5}$ esetén $q = 4$,	1 pont	
$a = -2$ esetén $q = -4$.	1 pont	
Ellenőrzés: $\frac{6}{5} + \frac{24}{5} \left(= \frac{30}{5} \right) = 6$ és $\frac{96}{5} + \frac{384}{5} \left(= \frac{480}{5} \right) = 96$,	1 pont	
illetve $(-2) + 8 = 6$ és $(-32) + 128 = 96$.		
Összesen: 8 pont		

3. a)								
A lakók közül 19 nő, 31 férfi, illetve 16 szemüveges, 34 nem szemüveges.	1 pont							
Legfeljebb 31 nem szemüveges férfi lehet,	1 pont							
ha egyik férfi sem szemüveges.	1 pont	<table><tr><td colspan="2">N(19)</td><td>F(31)</td></tr><tr><td>3</td><td>Sz 16 0</td><td>31</td></tr></table>	N(19)		F(31)	3	Sz 16 0	31
N(19)		F(31)						
3	Sz 16 0	31						
Legalább $(31 - 16 =) 15$ nem szemüveges férfi van,	1 pont*							
ha minden szemüveges lakó férfi.	1 pont*	<table><tr><td colspan="2">N(19)</td><td>F(31)</td></tr><tr><td>19</td><td>Sz 0 16</td><td>15</td></tr></table>	N(19)		F(31)	19	Sz 0 16	15
N(19)		F(31)						
19	Sz 0 16	15						
Összesen:		5 pont						

Megjegyzés: A *-gal jelölt 2 pontot az alábbi gondolameneréért is megkaphatja a vizsgázó.
A férfiak és a nem szemüvegesek számának összege $31 + 34 = 65$, de csak 50 lakó van, így legalább 15-öt mindkét részhalmban megszámoltunk, tehát legalább 15 nem szemüveges férfi van.

3. b)		
A feladat megértését tükröző ábra.		1 pont
(Használjuk az ábra betűzéseit: A fűvesített terület az ADC háromszög. Az öntözött terület a D középpontú negyedkör. Keressük a sötétített síkidom területét.)		
(Az ADC derékszögű háromszögből) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{15}{10}$,		1 pont
innen $\alpha \approx 56,3^\circ$.		1 pont
Mivel $DA = DM = 10$ (m), ezért DÁM háromszög egyenlőszárú, így $\beta = 180^\circ - 2\alpha \approx 67,4^\circ$.		1 pont

7. c)		
A nyereségfüggvény: $n(x) = -0,8x^4 + 3,6x^3 - 3,6x^2$.	1 pont	
Ennek deriváltfüggvénye:	1 pont	
$n'(x) = -3,2x^3 + 10,8x^2 - 7,2x$.		
Az n függvénynek szélsőértéke lehet, ha $n'(x) = 0$.	1 pont	
$-3,2x^3 + 10,8x^2 - 7,2x = 0$		
Kiemelve x -et, az $x(-3,2x^2 + 10,8x - 7,2) = 0$	2 pont	
egyenlet gyökei: $x_1 = 0$, $x_2 \approx 0,91$, $x_3 \approx 2,46$.		
Mivel csak $1,5 < x < 3$ esetén nyereséges a termelés, ezért az $x \approx 2,46$ helyen kell megvizsgálni a függvényt.	1 pont	
A második derivált: $n''(x) = -9,6x^2 + 21,6x - 7,2$.	1 pont	
$n''(2,46) < 0$, tehát az n függvénynek itt (abszolút) maximuma van.		
$n(2,46) = 0,8 \cdot 2,46^2 \cdot (-0,54) \cdot (-0,96) \approx 2,51$.	1 pont	
A legnagyobb elérhető napi nyereség tehát körülbelül 25 100 tallér, ami kb. 2,46 tonna liszt előállításával és eladásával érhető el.	1 pont	
Összesen:		9 pont


8. a) első megoldás		
Két lány között $\binom{5}{2} = 10$,	1 pont	
egy lány és egy fiú között $5 \cdot 7 = 35$ ölelés volt.	1 pont	
Összesen $(10 + 35 =) 45$ találkozásnál volt ölelés.	1 pont	
Összesen:		3 pont

8. a) második megoldás		
Összesen $\binom{12}{2} = 66$ köszöntés volt,	1 pont	
ebből $\binom{7}{2} = 21$ volt kézfogás.	1 pont	
Tehát $(66 - 21 =) 45$ találkozásnál volt ölelés.	1 pont	
Összesen:		3 pont

7. a) első megoldás	
Összesen $450 + 400 + 500 = 1350$ gramm lisztből sítított kenyeret Flóra.	1 pont
Ehhez $1350 \cdot \frac{5}{9} = 750$ gramm búzaliszt kell.	1 pont
Tehát a hozzáadott lisztből $(750 - 450 =)$ 300 gramm volt a búzaliszt.	1 pont
Összesen:	3 pont

7. a) második megoldás	
Jelölje x a hozzáadott búzaliszt tömegét (grammban). Ekkor a rozsliszt tömege $500 - x$ (gramm). A kétfajta liszt tömegének aránya: $\frac{450 + x}{400 + (500 - x)} = \frac{5}{4}.$ $1800 + 4x = 4500 - 5x$ $x = 300$ (Tehát a hozzáadott lisztből 300 gramm volt a búzaliszt.)	1 pont
	1 pont
	1 pont
Összesen:	3 pont

7. a) harmadik megoldás	
50 gramm búzaliszt hozzáadásával éppen elérhető az előírt arány $(500 : 400 = 5 : 4)$.	1 pont
A maradék 450 gramm hozzákevert lisztben is $5 : 4$ arányban kell lennie a búzalisztnek és a rozslisztnek, azaz $\left(450 \cdot \frac{5}{9} = \right)$ 250 gramm a búzaliszt mennyisége.	1 pont
Tehát a hozzáadott lisztből $(50 + 250 =)$ 300 gramm volt a búzaliszt.	1 pont
Összesen:	3 pont

7. b)	
Ha $0 < x < 5$, akkor x^2 pozitív, tehát pontosan akkor van nyereség, ha $(x - 3)(1,5 - x) > 0$.	1 pont
	1 pont
Ez akkor teljesül, ha a két tényező azonos előjelű. A két tényező egyszerre nem lehet pozitív. Mindkettő negatív, ha $1,5 < x < 3$. (Ezzel az állítást beláttuk.)	2 pont
	
Összesen:	4 pont

A fűvesített terület: $T_1 = \frac{10 \cdot 15}{2} = 75 \text{ (m}^2\text{)}$.	1 pont*
A $\gamma = 90^\circ - \beta \approx 22,6^\circ$ középponti szögű, 10 méter sugarú körívk terület: $T_2 = \frac{22,6}{360} \cdot 10^2 \cdot \pi \approx 19,7 \text{ (m}^2\text{)}$.	1 pont*
A DAM háromszög területe: $T_3 = \frac{10 \cdot 10 \cdot \sin 67,4^\circ}{2} \approx 46,2 \text{ (m}^2\text{)}$.	1 pont*
A locsolásból kimaradó fűvesített terület nagysága: $T_1 - (T_2 + T_3) = 75 - 65,9 = 9,1 \text{ m}^2$.	1 pont*
Összesen:	8 pont

<i>Megjegyzés: A *-gal jelölt 4 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.</i>	
$DM = DA = 10 \text{ (m)}$ és $DC = 15 \text{ (m)}$, valamint $\gamma = 90^\circ - \beta \approx 22,6^\circ$, így a CDM háromszög területe: $T_4 = \frac{15 \cdot 10 \cdot \sin 22,6^\circ}{2} \approx 28,8 \text{ (m}^2\text{)}$,	1 pont
A γ középponti szögű, 10 méter sugarú körívk terület: $T_2 = \frac{22,6}{360} \cdot 10^2 \cdot \pi \approx 19,7 \text{ (m}^2\text{)}$.	1 pont
A locsolásból kimaradó fűvesített terület nagysága: $T_4 - T_2 = 9,1 \text{ m}^2$.	1 pont

*Megjegyzés: A *-gal jelölt 4 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó.*
Jelölje T_1 a fűvesített területet, T_3 a DAM háromszög területét, T_5 az $AD = 10$ méter sugarú negyedkör területét, T_6 a β középponti szögű, 10 méter sugarú körívk területét, végül T_7 az AM húr által határolt kisebbik körselekt területét.


$$T_1 = \frac{10 \cdot 15}{2} = 75 \text{ m}^2, \quad T_3 = \frac{10 \cdot 10 \cdot \sin 67,4^\circ}{2} \approx 46,2 \text{ m}^2, \quad T_5 = \frac{10^2 \cdot \pi}{4} \approx 78,5 \text{ m}^2,$$
$$T_6 = \frac{67,4}{360} \cdot 10^2 \cdot \pi \approx 58,8 \text{ m}^2, \quad T_7 = T_6 - T_3 = 12,6 \text{ m}^2.$$

Ezzelkel: $T_{\text{kimaradó}} = T_{\text{fűvesített}} - T_{\text{meglocsolott fűvesített}} = T_1 - (T_5 - T_7) = T_1 - (T_5 - (T_6 - T_3)) =$


$$= T_1 - T_5 + T_6 - T_3 = 9,1 \text{ m}^2.$$

4. a)		
Az első két kritériumnak megfelel a készlet.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgáló a kiszámolt szórásra hivatkozva helyesen válaszol.</i>
A mért tömegek átlaga $\left(\frac{5 \cdot 163 + 164 + 165 + 2 \cdot 166}{9} = \frac{1476}{9} = 164\right)$ (gramm).	1 pont	<i>Ezek a pontok akkor is járnak, ha a vizsgáló számlológéppel helyesen számol.</i>
A mért tömegek szórása: $\sqrt{\frac{5 \cdot (163 - 164)^2 + (165 - 164)^2 + 2 \cdot (166 - 164)^2}{9}} =$	1 pont	
$= \frac{\sqrt{14}}{3} \approx 1,25$ (gramm).	1 pont	
A készlet nem hitelesíthető.	1 pont	
	Összesen:	5 pont

4. b) első megoldás		
$P(\text{lesz piros}) = 1 - P(\text{mindkettő kék})$	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
Két kék golyót (a sorrendre való tekintet nélkül) $\binom{7}{2}$ ($= 21$)-féleképpen tudunk kiválasztani (kedvező esetek száma).	1 pont	<i>A sorrendet is figyelembe véve $7 \cdot 6$ ($= 42$).</i>
Két golyót összesen $\binom{10}{2}$ ($= 45$)-féleképpen tudunk kiválasztani (összes eset száma).	1 pont	$10 \cdot 9$ ($= 90$)
A keresett valószínűség tehát $1 - \frac{21}{45} = \frac{8}{15} \approx 0,533$.	1 pont	
	Összesen:	4 pont

6. c) első megoldás		
A csonkakúp magassága $\sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ (cm),	2 pont	
térfogata $V_{cs} = \frac{8\pi}{3} (14^2 + 14 \cdot 8 + 8^2) = 992\pi$ (≈ 3116) (cm ³).	2 pont	
A közelítő henger alapkörének sugara $((14 + 8) : 2 =) 11$ (cm),	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
térfogata $V_h = 8 \cdot 11^2 \cdot \pi = 968\pi$ (≈ 3041) (cm ³).	1 pont	
Ez a pontos értéknek $(3041 : 3116 \approx) 0,976$ -szerece, azaz 97,6%-a.	1 pont	$968\pi : 992\pi \approx 0,976$
A relatív hiba tehát $-2,4\%$.	1 pont	<i>A 2,4% is elfogadható.</i>
	Összesen:	8 pont

6. c) második megoldás		
A csonkakúp térfogata $V_{cs} = \frac{m\pi}{3} (14^2 + 14 \cdot 8 + 8^2)$.	2 pont	
A közelítő henger alapkörének sugara $((14 + 8) : 2 =) 11$ (cm),	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
térfogata $V_h = 8 \cdot 11^2 \cdot \pi$.	1 pont	
A két térfogat hányadosa: $\frac{V_h}{V_{cs}} = \frac{m \cdot 11^2 \cdot \pi}{\frac{m\pi}{3} (14^2 + 14 \cdot 8 + 8^2)}$.	1 pont	
Egyszerűsítve: $\frac{V_h}{V_{cs}} = \frac{11^2}{14^2 + 14 \cdot 8 + 8^2} = \frac{121}{124} \approx$	1 pont	
$\approx 0,976$, azaz a henger térfogata a csonkakúp térfogatának 97,6%-a.	1 pont	
A relatív hiba tehát $-2,4\%$.	1 pont	<i>A 2,4% is elfogadható.</i>
	Összesen:	8 pont

6. a) első megoldás	
	2 pont*
Mivel $AC = BC$, ezért a B csúsnál fekvő szög $\beta \approx 59,9951^\circ$.	1 pont
$\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta) \approx 180^\circ - 119,9902^\circ = 60,0098^\circ$.	1 pont
Három tizedesjegyre kerekítve a háromszög szögei $59,995^\circ$, $59,995^\circ$ és $60,010^\circ$. (Tehát Gézának nincs igaza, a háromszög nem szabályos.)	1 pont
Összesen:	5 pont

Megjegyzés: A *-gal jelölt 2 pont akkor is jár, ha a vizsgáló az $\overline{AB}$ és $\overline{AC}$ vektorok skaláris szorzatát kétféleképpen felírja, és ezek egyenlőségéből fejezi ki $\cos \alpha$ -t:

$$\cos \alpha = \frac{82 \cdot 41 + 0 \cdot 71}{82 \cdot \sqrt{6722}} \quad (\approx 0,50007). \text{ Ebből } \alpha \approx 59,9951^\circ.$$

6. a) második megoldás	
$AB = 82$, $BC = CA = \sqrt{6722}$	1 pont
Koszinusztétellel: $\cos \gamma = \frac{2 \cdot 6722 - 82^2}{2 \cdot 6722} \quad (\approx 0,49985)$,	1 pont
amiből $\gamma \approx 60,0098^\circ$.	1 pont
$\alpha = \beta = \frac{180^\circ - \gamma}{2} \approx 59,9951^\circ$	1 pont
Három tizedesjegyre kerekítve a háromszög szögei $59,995^\circ$, $59,995^\circ$ és $60,010^\circ$. (Tehát Gézának nincs igaza, a háromszög nem szabályos.)	1 pont
Összesen:	5 pont

6. b)	
$AC = \sqrt{6722} \quad (\approx 81,9878)$	1 pont
Így $\frac{AC}{AB} = \frac{\sqrt{6722}}{82} \quad (\approx 0,999851)$.	1 pont
Négy tizedesjegyre kerekítve az arány 0,9999.	1 pont
Összesen:	3 pont

Megjegyzések: 1. Az $\frac{AB}{AC}$ arány $(\approx 1,0001)$ is elfogadható.

2. Kerekítési hiba miatt a vizsgáló a feladatban összesen legfeljebb 1 pontot veszíten.

4. b) második megoldás	
$P(\text{lesz piros}) = P(1 \text{ piros}) + P(2 \text{ piros})$	1 pont
$P(1 \text{ piros}) = \frac{\binom{3}{1} \cdot \binom{7}{1}}{\binom{10}{2}} = \frac{21}{45}$	1 pont
$P(2 \text{ piros}) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{3}{45}$	1 pont
A keresett valószínűség tehát $\frac{21}{45} + \frac{3}{45} = \frac{8}{15} \approx 0,533$.	1 pont
Összesen:	4 pont

4. c) első megoldás	
$P(AB) = P(A) = \frac{\binom{3}{2}}{2} \cdot 0,3^2 \cdot 0,7 \quad (= 0,189)$	2 pont
$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - 0,7^3 \quad (= 0,657)$	2 pont
$P(A B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,189}{0,657} \approx 0,288$	1 pont
Összesen:	5 pont

4. c) második megoldás	
$10^3 - 7^3 = 657$ olyan eset van, amelyben a kihúzott golyók közt van piros (ez az összes eset száma a keresett feltételes valószínűségre vonatkozóan).	2 pont
Ezek közül $3 \cdot 3^2 \cdot 7 = 189$ esetben van 2 piros golyó (kedvező esetek száma).	2 pont
Tehát a keresett valószínűség $\frac{189}{657} \approx 0,288$.	1 pont
Összesen:	5 pont

