

a feladat sorszáma	maximális elért	ponszám	maximális elért
I. rész	1.	13	
	2.	13	51
	3.	13	
	4.	12	
II. rész		16	
		16	64
		16	
		16	
← nem választott feladat			
Az írásbeli vizsgárt sz pontszáma		115	

dátum

javító tanár

ponszama egész számról kerekítve	
elért	programba beírt
I. rész	
II. rész	

dátum

javító tanár

jeszű

Pótlapok száma
Tisztázati
Piszkozati


Időtartam: 240 perc

2024. május 7. 9:00

ERETTSÉGI VIZSGA · 2024. május 7.

OKTATÁSI HIVATAL

Azonosító jel: _____



Azonosító jel: _____



Fontos tudnivalók

1. A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
2. A feladatok megoldási sorrendje tétszőleges.
3. A II. részben kitűzött öt feladat közül csak négyet kell megoldania. **A nem választott feladat sorszámát írja be a dolgozat befejezéskor az áltábbi négyzetbe!** Ha a javító tanár számára *nem derül ki egyértelműen*, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, akkor a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladatra nem kap pontot.



4. A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet és bármilyen négyesű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédcsözök használata tilos!
5. **A megoldások gondolatmenetét minden esetben írja le, mert a feladatra adható pontszám jelentős része erre jár!**
6. Ügyeljen arra, hogy a lényegesebb részszámítások is nyomon követhetők legyenek!
7. A gondolatmenet kifejtése során a zsebszámológép használata – további matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökövönás, $n!$, $\binom{n}{k}$ kiszámítása, a függvénytáblázatban feljelhető táblázatok helyettesítése (\sin , \cos , \tg , \log és ezek inverzei), a π és az e szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek az átlag és a szorás kiszámítására abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részszámítások bemutatását is. Egyéb esetekben a géppel elvezetett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, így azokért nem jár pont.
8. A feladatok megoldásánál használt közül az iskolában tanult, névvel ellátott tételeket (pl. Pitagorasz-tétel, magasság-tétel) nem kell pontosan megfogalmazva kimondania, elég csak a térel megnevezését említenie, de az alkalmazhatóságát röviden indokolnia kell. Egyéb térel(ek)rre való hivatkozás csak akkor fogadható el teljes értékük, ha az állítást minden feltételevel együtt pontosan mondja ki (bizonyítás nélkül), és az adott problémában az alkalmazhatóságát indokolja.
9. A feladatok végeredményét (a feltett kérdésre adandó választ) szöveges megfogalmazásban is közölje!
10. A dolgozatot tollal írja, de az ábrákat ceruzával is rajzolhatja. Az ábrákon kívül a ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti. Ha valamelyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető.
11. minden feladatnak csak egy megoldása értékelhető. Több megoldási próbálkozás esetén **egyértelműen jelezze**, hogy melyiket tartja érvényesnek!
12. Kérjük, hogy a szírkített téglalapokba semmit ne írjon!

I.

- 1.** Oldja meg az alábbi egyenleteket a valós számok halmazán!

a) $\sqrt{2^x} = 2^{x+1} - 1$

b) $2 \sin^2 x + 3 \cos x = 0$

a)	6 pont	
b)	7 pont	
Ö:	13 pont	

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania.
A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. Legyen f a valós számok halmazán értelmezett függvény, ahol $f(x) = x^2$.

- a) Határozza meg a és b értékét, ha $\int_a^b f(x) = 63$ és $f'(a) = b$.

Legyen h a valós számok halmazán értelmezett függvény, ahol $h(x) = x^2 + px + r$.

- b) Határozza meg p és r értékét, ha $h(1), h(3)$ és $h(4)$ (ebben a sorrendben) egy számtani, $h(1), h(2)$ és $h(4)$ pedig (ebben a sorrendben) egy mértani sorozat egymást követő tagjai!

a)	7 pont
b)	9 pont
Ö:	16 pont

2. Egy szöveget ketten lektorálnak, Aliz és Hanna. Aliz az összes hiba $p\%$ -át fedezte fel, és a Hanna által feltételezett hibáknak is éppen a $p\%$ -át találta meg.
A szövegben Aliz 35, Hanna 40 hibát vett észre, ezek közül 28 hibát mindenkiten észrevevették.

- a) Az összes hiba közül hányat nem vett észre egyikük sem?
- Egy gyakorlott gépirónő a tapasztalatok szerint ötszáz karakterből átlagosan egynél hibázik (ezt tekinthetjük úgy, hogy minden egyes karaktert $\frac{1}{500}$ valószínűséggel ír le hibáisan). Egy gépelt oldal kb. 2000 karaktert tartalmaz.
- b) Igazolja, hogy a gépirónő körülbelül 0,0182 valószínűséggel gépel le hibátlanul egy teljes oldalt!
- c) Ha a gépirónónak **egy** 150 oldalas szöveget kell legépílnie, akkor mennyi annak a valószínűsége, hogy a legépelt szövegenek lesz **legalább** két hibátlan oldala?

a)	5 pont
b)	3 pont
c)	5 pont
Ö:	13 pont

Az 5-9. feladatok közötti tetszés szerint választott négyet kell megoldania.
A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

8. Egy háromszög oldalainak hossza $p^2 + q^2$, $p^2 - q^2$, illetve $2pq$, ahol p és q olyan pozitív egész számok, melyekre $p > q$ teljesül.

- a) Igazolja, hogy a három oldalhossz közül $p^2 + q^2$ a legnagyobb!
- b) Igazolja, hogy a háromszög derékszögű!
- c) Igazolja, hogy a háromszög területe $p^3 q - q^3 p$!
- d) Jelölje a háromszögbé írt kör sugarának hosszát r . Igazolja, hogy r értéke egész szám!

a)	4 pont	
b)	4 pont	
c)	2 pont	
d)	6 pont	
Ö:	16 pont	

3. Adott az $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$; $f(x) = -0,5x^2 + 3x$ másodfokú függvény.

- a) Határozza meg az f értékkészletét!
- b) A $P(6; 0)$ pont rajta van az f grafikonján. Adj meg a grafikon P -re illeszkedő érintőjének meredekségét, és ennek az érintőnek az egyenletét!
- c) Adj meg azt a valós számok halmazán értelmezett g függvényt, amelyre igaz, hogy $g' = f$ és $g(3) = 7$ (g' a g deriváltfüggvényét jelöli).

a)	4 pont
b)	5 pont
c)	4 pont
Ö:	13 pont

Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania.
A kihagyott feladat sorzámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

7. Endre, Frici és Gyuri sportlövök. A löteren hat löällás van egymás mellett, 1-től 6-ig megszámozva. Egyik nap az edzőjük vételünszerű osztja be ötöt egy-egy különböző löällásba.

- a) Melyik esemény a valószínűbb: az, hogy három egymás melletti löälláshba kerülnek, vagy az, hogy köztük semelyik kető nem kerül szomszédos löälláshba?

Egy sportlövőverseny minden lövessel 5, 4, 3, 2, 1 vagy 0 pontot lehet szerzni.
 A győzlelemhez Endrének az utolsó öt lövessel összesen **legalább** 22 pontot kell elérnie.

- b) Hányfélképpen lehet öt lövessel legalább 22 pontot elérni?
 (Két ötlövész sorozatot azonosnak tekintünk, ha legfeljebb a szerzett pontszámok sorrendjében témék el egymástól.)

Ugyanzen a versenyen Gyuri utolsó tíz lövése között nem volt 0 pontos. A tíz lövés pontszámának terjedelme, mediana és átlaga is 3, egyetlen módszsa pedig a 2 volt.


- c) Határozza meg monoton növekvő sorrendben Gyuri utolsó tíz lövésénél pontértékét! (Megoldása során indokolja, hogy a tíz lövés pontértéke – sorrendjükktől eltérve – egyértelmű.)

a)	4 pont	
b)	4 pont	
c)	8 pont	
Ö:	16 pont	

- 4.** Az utakon látható STOP tábla méretét egy miniszteri rendelet pontosan szabályozza: a tábla alakja egy olyan szabályos nyolcszög, amelynek az ábrán D -vel jelölt méretei egyaránt 600 mm-esek (lakk terítéten belülük táblák esetén).

a) Mekkora a szabályos nyolcszög egy oldalának hossza?

A méhek (megközelítőleg) szabályos hatszög alakú sejtekből építik fel a lépet. Az építkezés első „lépése” után 1, a második lépése után 7, a harmadik lépése után 19 sejt készült már el összesen. Az első harom lépést szemlélteti az alábbi ábra.



Tegyük fel, hogy az ábra szerint vázolt „körkörös” stratégia szerint építkeznék tovább a méhek, azaz minden egyes további lépéshoz újabb szabályos hatszög alakú sejtekkel veszik körül az előzőleg már elkészült építményt. Így a harmadik építéstől kezdve minden egyes lépésben 6-tal több ijjú szabályos hatszögöt építenek meg, mint az előző lépéshoz.

- b) Igazolja (teljes indukcióval vagy más módszerrel), hogy az n -edik lépés után összesen $3n^2 - 3n + 1$ darab hatszög készült el!

a)	6 pont	
b)	6 pont	
Ö:	12 pont	

**Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania.
A kihagyott feladat sorszámnát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**



6. Az ABC derékszögű háromszög A csúcsánál fekvő szöge 30°

- a) A háromszög AB átfogójának F felezőpontjában merőlegest állítunk az átfogóra. Ez a merőleges az AC befogót az E pontban meisszi. Milyen arányban oszja két részre az E pont az AC befogót?

A háromszögűből az átfogójához tartozó CP_1 magassága minden levágjuk a H_1 -gyel jejtőt háromszöget. Az így megmaradó ACP_1 derékszögű háromszögben végrehajtuk ugyanezt a lépést: a H_2 háromszöget vágjuk le a háromszög átfogójához tartozó P_1P_2 magassága mentén, és így tovább (lásd az ábrán).

- b) Ha ezt az eljárást 13-szor hajtjuk végre, akkor a 13 háromszög levágása után mennyi maradó háromszög területe hány százaléka az ABC háromszög területének?

- c) Mekkora a végtelen sok szakaszból álló $CP_1P_2P_3P_4\dots$ törlőtvonal hosszának pontos értéke, ha $CP_1 = 2 - \sqrt{3}$?



a)	5 pont
b)	6 pont
c)	5 pont
Ö:	16 pont

II.

**Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania.
A kihagyott feladat sorszámnát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**

- 5.** Egy építőjáék olyan (kockától különböző) egybevágó négyzetes oszlopokat tartalmaz, amelyeknek minden lapja vagy kékre, vagy sárgára van festve. Mindegyik oszlop több sárga színű lap van, mint kék színű. Az építőjáék a felételnek megfelelő minden külön-böző színezésű oszlopból egy darabot tartalmaz.

- a) Hány négyzetes oszlop van az építőjáékban? (Két színezett oszlop különböző, ha terbeli mozgatással nem vihetők át egymásba.)

Egy négyzetes oszlop felszíne 384 cm^2 .

- b) Számítsa ki az oszlop térfogatát, ha oldalélei 22 cm hosszúak!
c) Hogyan válasszuk meg a 384 cm^2 felszíni négyzetes oszlop alapéléit, illetve oldaléléit, hogy a nyolc alapfelület és a négy oldalélei hosszának az összege minimális legyen?

a)	5 pont	
b)	3 pont	
c)	8 pont	
Ö:	16 pont	