

18. c)		
A kúpba írt gömb sugara megegyezik az egyenlő szárú háromszögbe írt kör sugarával.	2 pont	<i>Ha az ábrából vagy a számolásból derül ki ennek a felismerése, akkor is jár a 2 pont.</i>
A háromszög alapon fekvő szöge $\alpha = 67,38^\circ$.	1 pont	
$\operatorname{tg} 33,69^\circ = \frac{\rho}{20}$	1 pont	
$\rho = 13,33$ (cm)	1 pont	
A gömb felszíne : $A \approx 2234,01$ (cm ²)	1 pont	$\rho = 13,33$ -dal számolva $A \approx 2232,90$ (cm ²), ezért is jár az 1 pont.
Összesen: 6 pont		
18. d)		
A köríkk ívének hossza: $i = 2r\pi$, $i = 2 \cdot 20 \cdot \pi \approx 125,66$ (cm)	2 pont	
$T_{\text{pálást}} = \frac{i \cdot R}{2} = 2 \cdot 20 \cdot \pi \cdot 26$	1 pont	
$T_{\text{pálást}} \approx 3267,26$ (cm ²)	1 pont	<i>i két tizedes jegyre való kerekített értékével számolva 3267,16 (cm²), ezért is jár az 1 pont.</i>
Összesen: 4 pont		

MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI
ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI
ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTERIUM

Fontos tudnivalók


Formai előírások:

1. A dolgozatot a vizsgázó által használt szintű **eltérő színű tollal** kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám** a mellette levő **téglalapba** kerül.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.
5. Az ábrán kívül ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti.

Tartalmi kérések:

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szereplőnél **kevésbé részletezett**.
4. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
5. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
6. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
7. Egy feladatra adott többféle helyes megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**.
8. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrésze előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. **A vizsgafeladatsor II./B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben –feltehetőleg– megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

18. a)



Jó vázlatrajz az adatok feltüntetésével. 2 pont

Ha a kúp nyílásszöge φ , akkor $\sin \frac{\varphi}{2} = \frac{20}{52} = 0,3846$ 1 pont

Ebből $\varphi = 45,24^\circ$ 1 pont

Összesen: 4 pont

18. b)

$$m = \sqrt{2704 - 400} = 48 \quad 1 \text{ pont}$$

$$V = \frac{r^2 \cdot \pi \cdot m}{3} = \frac{400 \cdot \pi \cdot 48}{3} \quad 1 \text{ pont}$$

$$V \approx 20106,19 \text{ (cm}^3\text{)} \quad 1 \text{ pont}$$

Összesen: 3 pont

Az $x \mapsto 20x - x^2$ függvény maximumát keressük a 20-nál kisebb pozitív egészek körében. A maximum hely (akár grafikusan, akár teljes négyzetté való kiegészítéssel, akár a számtani-mértani közép összefüggésre való hivatkozással, akár az esetek végigszámolásával) $x = 10$.	3 pont
Tíz játékos helyes válasza esetén lesz a játékosok összpontszáma a lehető legtöbb.	1 pont
Összesen: 7 pont	

17. a)		
A lehetséges sorrendek száma: $5!$	2 pont	
Az unokák 120-féle sorrendben kaphatják meg a levelet.	1 pont	
Összesen: 3 pont		
17. b)		
Az utolsó hétre az 5 unoka bármelyike egyenlő valószínűséggel kerül.	2 pont	Kedvező esetek száma $4!$, az összes eset $5!$, ezen modell választása esetén is jár a 2 pont.
A keresett valószínűség tehát: $\frac{1}{5}$.	1 pont	
Összesen: 3 pont		
17. c)		
Az egyes napokon kötött darabok hosszúságai mértani sorozatot alkotnak.	1 pont	Ha ez a gondolat a megoldásból derül csak ki, akkor is jár az 1 pont.
A mértani sorozatban $a_1 = 8$, $q = 1,2$	2 pont	
A sál teljes hossza a mértani sorozat első n elemének összegeként adódik.	1 pont	Ha ez a megállapítás a használt képletek alapján derül csak ki, akkor is jár a 2 pont.
$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$	1 pont	
$200 = 8 \cdot \frac{1,2^n - 1}{0,2}$	1 pont	
$5 + 1 = 1,2^n$	1 pont	
$n = \frac{\lg 6}{\lg 1,2}$	2 pont	Ha ismételt szorzással keresi meg az n -et, akkor is jár a 3 pont.
$n \approx 9,83$	1 pont	
A sál a tizedik napon készül el.	1 pont	
Összesen: 11 pont		

I.

1.		
$A \cap B = \{5, 7, 9\}$	2 pont	
Összesen: 2 pont		$Az\ A\ \text{és}\ B\ \text{halmaz}\ \text{felírása}\ \text{külön}\ \text{nem}\ \text{pontozható.}$
2.		
$C = -2$	2 pont	$Az\ \frac{1}{C}\ \text{helyes}\ \text{meghatározásért}\ 1\ \text{pont}\ \text{adható.}$
Összesen: 2 pont		
3.		
$A = -1, B = -2$	1 pont	
$A > B$	1 pont	
Összesen: 2 pont		
4.		
A kék golyók száma: 9.	1 pont	
A piros golyók száma: 11.	1 pont	
$P = \frac{\text{kedvező esetek száma}}{\text{összes eset}} = \frac{11}{20} = 0,55$	1 pont	
Összesen: 3 pont		$A\ \text{jó}\ \text{végeredmény}\ \text{közlése}\ 3\ \text{pontot}\ \text{ér.}$ $Ha\ a\ \text{választ}\ \text{úgy}\ \text{adja}\ \text{meg,}\ \text{hogy}\ \text{a}\ \text{piros}\ \text{golyók}\ \text{aránya}\ 55\ \%,\ \text{tehát}\ \text{a}\ \text{keresett}\ \text{valószínűség}\ 0,55,\ \text{akkor}\ \text{is}\ 3\ \text{pontot}\ \text{kap.}$
5.		
a) hamis	1 pont	
b) igaz	1 pont	
c) hamis	1 pont	
Összesen: 3 pont		
6.		
A pozitív valós számok halmaza.	2 pont	$Az\ x > 0\ \text{válaszra}\ \text{is}\ \text{jár}\ \text{a}\ 2\ \text{pont.}$
Összesen: 2 pont		

7.		
$S_5 = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$	1 pont-*	*Ha a képlet nem szerepel, de jól használja az összefüggést, akkor is jár az 1 pont.
$S_5 = \frac{60}{2} \cdot 5$	1 pont	
$S_5 = 150$	1 pont	
Összesen:	3 pont	

8.		
$5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$	2 pont	Ha felsorolás után adja meg a helyes választ, akkor is jár a 2 pont.
Összesen:	2 pont	Ha a keresett számokból legalább 30-at, de nem az összeset felsorolja, 1 pontot kaphat.

9.		
$x_1 = \frac{\pi}{6}$	1 pont	
$x_2 = \frac{5\pi}{6}$	1 pont	
Összesen:	2 pont	Ha periódust is használ, csak egy pontot kaphat. Ha a megoldást fokban adja meg, legfeljebb 1 pont adható.

10.		
$c = 2a - b, c = 2(3i - 2j) - (-i + 5j)$	1 pont	
$c = 6i - 4j + i - 5j$	1 pont	
$c = 7i - 9j$	1 pont	
Összesen:	3 pont	A jó végeredmény közlése 3 pontot ér.

II./B

16. a)

Első forduló eredményei	1. kérdés	2. kérdés	3. kérdés	4. kérdés
Anikó válasza	helyes	hibás	helyes	hibás
Jó válaszok száma	7	10	15	8
Anikó elért pontszáma	13	0	5	0

Minden helyes beírt adat 1-1 pont.

16. b)

A 2. kérdés oszlopa így módosul: helyes, 11, 9; Anikó tehát 9 pontot kapott. Anikó elért pontszáma ezzel 27 lesz. Ez a régi pontszám 150 százaléka, tehát a pontszám 50%-kal emelkedett volna.	1 pont	
	1 pont	
	1 pont	A válasz úgy is kikövetkeztethető, hogy a 9 pontos növekedés a régi pontszám 50%-a.

Összesen: 3 pont

16. c)

<u>Első megoldás:</u> Anikó összesen $3^4 = 81$ -féle módon válaszolhat a négy kérdésre. Egyetlen esetben lesz minden válasza helyes, ezért a keresett valószínűség: $\frac{1}{81}$.	2 pont
	1 pont
<u>Második megoldás:</u> Minden kérdésnél a helyes válasz valószínűsége: $\frac{1}{3}$. Az egyes válaszok egymástól függetlenek, ezért a keresett valószínűség: $\left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{81}$.	1 pont
	2 pont

Összesen: 3 pont

16. d)

Ha x jó válasz születik a vizsgált kérdésre, akkor a jól válaszolók $20 - x$ pontot kapnak személyenként. Az elért összpontszám: $x(20 - x)$.	1 pont
	2 pont


15. b)		
$\sin \alpha = \frac{m_a}{a}$ (ahol α hegyesszög)	1 pont	
$\alpha = 30^\circ$	1 pont	
$\beta = 150^\circ$	1 pont	
Összesen:	3 pont	
15. c)		
Bármelyik lehetséges derékszögű háromszögből jó összefüggést felír a hosszabbik átló segítségével, $\frac{e}{13} \cdot \cos 15^\circ = \frac{2}{13}.$ például $\cos 15^\circ = \frac{2}{13}$.	2 pont	
$e = 2 \cdot 13 \cdot \cos 15^\circ$	1 pont	
$e = 25,11$ (cm)	1 pont	
Összesen:	4 pont	Más helyes megoldás (pl. koszinusztétel alkalmazása) esetén is teljes pontszám jár.

11.		
Legyen az ötödik szám x , ekkor $\frac{1+8+9+12+x}{5} = 7$.	1 pont	
$x = 5$	2 pont	
Összesen:	3 pont	
12.		
A függvény legkisebb értéke az 1, az adott intervallum végpontjaiban a függvény értéke 5, illetve 10, a függvény értékkészlete az $[1; 10]$ intervallum.	1 pont* 1 pont* 1 pont	*Helyes értékkészlet megadott helyes értékkészlet is határozása esetén jár az 1 – 1 pont.
Összesen:	3 pont	Bármilyen formában megadott helyes értékkészlet is 3 pontot ér.

II./A

13. a)	
Az (5 alapú exponenciális) függvény szigorúan monoton növekedése miatt	1 pont
$x - 2 < 13 - 2x$	1 pont
$x < 5$	1 pont
Az egyenlőtlenség megoldása: $\{1; 2; 3; 4\}$	1 pont
Összesen:	4 pont
<i>Ha felsorolja a megoldást adó 4 számot, 2 pontot kap, ha hivatkozik arra, hogy más megoldás nincs, további 2 pont jár.</i>	
13. b)	
$x \geq 0$	1 pont*
$3^{2\sqrt{x}} = 3^{x-3}$	1 pont
A (3 alapú exponenciális) függvény szigorú monotonitása miatt $2\sqrt{x} = x - 3$.	1 pont
$4x = x^2 - 6x + 9$	1 pont
$x^2 - 10x + 9 = 0$	1 pont
$x_1 = 1 \quad x_2 = 9$	1 pont
Az $x = 1$ nem megoldása az egyenletnek. Az egyenlet megoldása a valós számok halmazán az $x = 9$.	2 pont*
Összesen:	8 pont
<i>*Ha behelyettesítéssel, vagy az értéktészlet vizsgálata alapján adja meg jól a megoldáshalmazt, teljes pontszámot kap.</i>	

14. a)	
A teremben x rajzasztal van és az osztály létszáma y .	1 pont
$2x + 8 = y$	1 pont
$3x - 7 = y$	1 pont
$x = 15$ és $y = 38$	1 pont
Ellenőrzés	1 pont
15 asztal van a teremben, és a kérdéses osztálylétszám 38 fő.	1 pont
Összesen:	6 pont

14. b)	
A lehetséges „ dátumok ” száma: 12·4·10,	2 pont
tehát 480 „ dátum ” forgatható ki.	1 pont
Összesen:	3 pont
14. c)	
Valóságos dátumból nem szökőévben 365 van,	1 pont
minden lehetséges „ dátum ” egyenlő valószínűséggel forgatható ki*,	
ezért valóságos dátumot $\frac{365}{480}$ ($= 0,7604$)	2 pont
valószínűséggel kapunk.	
Összesen:	3 pont
<i>*Jó válasz esetén akkor is jár a 2 pont, ha az indoklásban ez a gondolat nincs leírva.</i>	
15. a)	
	
Helyes ábra (amelyik kifejezi a négyzet és rombusz kapcsolatának megértését).	1 pont*
($T_{\text{négyzet}} = a^2$ és $T_{\text{rombusz}} = am_a$)	
$\frac{a^2}{am_a} = \frac{2}{1}$	3 pont
A rombusz magassága: $m_a = 6,5$ (cm)	1 pont
Összesen:	5 pont