

18. a)		
A vásárolt kabátok között biztosan lesz legalább 4 selejtes.	2 pont	
Tehát annak a valószínűségét kell kiszámítani, hogy 4 vagy 5 selejtes kabát lesz a 15 között.	1 pont	
Az egyes esetek valószínűségét a (valószínűség kombinatorikus kiszámítására megismert összefüggés szerinti) $p = \frac{k}{n}$ képlettel számolhatjuk.	1 pont	<i>Ha ez csak a megoldás gondolatmenetéből olvasható ki, akkor is jár a pont.</i>
A 15 kabátot $\binom{20}{15}$ (= 15 504) -féleképpen ($=n$) lehet kiválasztani a 20 közül,	1 pont	
$\binom{9}{4}\binom{11}{1}$ (= 126) esetben lesz a kabátok között 4 selejtes, (ennek valószínűsége $p_4 = \frac{126}{15\,504} \approx 0,008$)	1 pont	<i>Csak a kedvező esetek számáért jár az 1-1 pont, a $\frac{k}{n}$-ért külön megkapja az 1 pontot, tehát ezért itt már nem adunk pontot.</i>
$\binom{9}{5}\binom{11}{10}$ (= 1386) esetben lesz a kabátok között 5 selejtes, (ennek valószínűsége $p_5 = \frac{1386}{15\,504} \approx 0,089$)	1 pont	
Annak a valószínűsége, hogy legfeljebb 5 szövési hibás kabát lesz a 15 között, egyenlő a két valószínűség összegével:	1 pont	<i>Ha ez csak a megoldás gondolatmenetéből olvasható ki, akkor is jár a pont.</i>
$p = p_4 + p_5$	1 pont	
$\frac{1512}{15\,504} \approx 0,098$	1 pont	<i>0,097 is elfogadható.</i>
Összesen: 10 pont		
18. b)		
Ha a megvásárolt kabátok között x db szövési hibás volt, akkor eredetileg $11\,000x + 17\,000(15 - x)$ Ft-ot kellett volna fizetnié.	2 pont	
A kiskereskedő $14\,000 \cdot 15 = 210\,000$ forintot fizetett, így $11\,000x + 17\,000(15 - x) > 210\,000$.	1 pont	
$255 - 6x > 210$	1 pont	
$x < \frac{45}{6} = 7,5$	1 pont	
Legfeljebb 7 szövési hibás kabát volt a 15 között.	1 pont	
Összesen:	7 pont	<i>Véges sok eset –indokolt– végigszámlálása után adott válasz is teljes értékű.</i>

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

1. A dolgozatot a vizsgázó által használt szintűtől **eltérő színű tollal** kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a mellette levő téglalapba** kerül.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.
5. Az ábrán kívül ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti.

Tartalmi kérések:


1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szereplőnél **kevésbé részletezett**.
4. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
5. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
6. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
7. Egy feladatra adott többféle helyes megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**.
8. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
9. Az olyan részszámításokért, részlepésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. **A vizsgafeladatsor II./B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető**. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltéhetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

17. d) második megoldás	
$x \mapsto \frac{1}{2}x^2$ ábrázolása.	1 pont
$x \mapsto 2x + \frac{5}{2}$ ábrázolása.	1 pont
Metszéspontok első koordinátáinak leolvasása: $x_1 = -1$; $x_2 = 5$.	1 pont
Egész megoldások helyes felsorolása.	3 pont
Összesen:	6 pont

Ha a helyes intervallumból minden valós számot elfogad, 1 pontot kaphat.


17. d) harmadik megoldás	
Egy oldalra rendez,	1 pont
megadja a zérushelyeket: $x_1 = -1$; $x_2 = 5$.	1 pont
Grafikus vázlattal vagy a főegyüttható előjével indokol.	1 pont
Egész megoldások helyes felsorolása.	3 pont
Összesen:	6 pont

Ha helyes intervallumból minden valós számot elfogad, 1 pontot kaphat.

17. a)		
A függvény hozzárendelési szabálya: $f(x) = \frac{1}{2}(x-2)^2 - 4,5$.	3 pont	a, u, v helyes felírása 1-1 pont.
		Az
Összesen:	3 pont	$f(x) = \left(\frac{1}{2}x - 2\right)^2 - 4,5$ felírása 1 pontot ér.
17. b)		
A $0,5(x-2)^2 - 4,5 = 0$ egyenletet kell megoldani.	1 pont	
$0,5x^2 - 2x - 2,5 = 0$.	1 pont	
$x_1 = 5$.	1 pont	
$x_2 = -1$.	1 pont	
Összesen:	4 pont	Ha az a) részben hibásan felírt másodfokú függvény képletével helyesen számol, 4 pontot kap.
17. c)		
	4 pont	A tengelypont helyes megnevezése 1 pont, a zérushelyek helyes megnevezése 2 pont, az intervallum- végpontokban helyes értékek 1 pont. Ha hibásan felírt képlet alapján legalább két transzformációs lépéssel rajzolt grafikont jól ábrázol, akkor 2 pontot kapjon.
Összesen:	4 pont	
17. d) első megoldás		
Átrendezve az egyenlőtlenséget, éppen az $f(x) \leq 0$ alakhoz jutunk,	3 pont	
ennek egész megoldásai: $-1; 0; 1; 2; 3; 4$ és 5 .	3 pont	Ha a helyes intervall- lumból minden valós számot elfogad, 1 pontot kaphat.
Összesen:	6 pont	

I.		
1.		
Az egyenlet gyökei: $-1,5$ és 8 .	2 pont	Helyes gyökökért 1-1 pont jár.
Összesen:	2 pont	
2.		
A mértani közép: 30 .	2 pont	
Összesen:	2 pont	
3.		
Pl.: 	2 pont	Ez a 2 pont nem bont- ható.
Összesen:	2 pont	
4.		
a) igaz	1 pont	
b) hamis	1 pont	Mivel van olyan tan- könyv, ami a periódus fogalmát a szokásostól eltérően definiálja, az igaz válasz is elfogad- ható.
Összesen:	2 pont	
5.		
$32 \cdot 31 = 992$ -féleképpen.	2 pont	
Összesen:	2 pont	
6.		
A kifejezés értéke 4 .	2 pont	
Összesen:	2 pont	
7.		
A megfelelő képlet megtalálása.	1 pont	Ez a pont akkor is jár, ha a megfelelő képlet csak a behelyettesített alakban szerepel.
A képletbe való helyes behelyettesítés.	1 pont	
A sorozat ötödik tagja: -48 .	1 pont	
Összesen:	3 pont	A megoldás menetének leírását a közbülső tagok helyes felsorolása is jelenlítheti.

8.		1 pont	Bármilyen helyes magyarázat 2 pontot ér.
$24 = 2^3 \cdot 3$.		1 pont	
$80 = 2^4 \cdot 5$.		1 pont	
A legkisebb közös többszörös: $2^4 \cdot 3 \cdot 5 (= 240)$.		1 pont	
Összesen:		3 pont	
9.			
$A \cup B = [-1,5 ; 20]$.		2 pont	Csak hibátlan válaszokért jár a 2-2 pont.
$B \cap A = [3 ; 12]$.		2 pont	Aki a helyes megoldás során szögletes zárójel helyetti kapcsos zárójellet használ, 1 pontot veszíten.
			Ha az intervallumok helyetti az egész számok halmazán dolgozik és a műveleteket helyesen végzi el, 1-1 pontot kap.
Összesen:		4 pont	Aki az alaphalmazt és a végpontok valamelyikét is hibásan kezeli, 0 pontot kap.
10.			
$(0 ; 9)$.		2 pont	Helyes koordinátáinként 1 pont.
Összesen:		2 pont	
11.			
18 gépnek kellene dolgoznia.		2 pont	Ez a 2 pont nem bontható.
Összesen:		2 pont	
12.			
Ha a gömb sugara r , akkor: $\frac{4\pi r^3}{3} = 5000$.		1 pont	
$r^3 = \frac{15\,000}{4\pi} (\approx 1194)$,		1 pont	
ebből $r = \sqrt[3]{\frac{15\,000}{4\pi}}$.		1 pont	Helyes válasz esetén ez a pont akkor is jár, ha ez az alak külön nem szerepel.
A gömb sugara 10,6 méter.		1 pont	
Összesen:		4 pont	Hibás képlet használata esetén a feladatra 0 pontot kap.

16. c)			
			
A szabályos 20-szög egy oldalához tartozó (konvex) középponti szög 18° -os.		1 pont	
$\operatorname{tg} 9^\circ = \frac{a}{2 \cdot 15}$		1 pont	
$a = 30 \cdot \operatorname{tg} 9^\circ$		1 pont	
$a \approx 4,75$ (cm).		1 pont	
A legrövidebb átló egy 162° -szárszögű egyenlő szárú háromszögből számolható ki, amelynek szárai $\approx 4,75$ cm hosszúak.		1 pont	Az 1 pont a helyes háromszög megtalálásáért jár.
$\sin 81^\circ \approx \frac{d}{2 \cdot 4,75}$		1 pont	Koszinusz-tétellel is számolható.
$d \approx 9,5 \cdot \sin 81^\circ$		1 pont	
$d \approx 2 \cdot 4,75 \cdot \sin 81^\circ \approx 9,38$ (cm).		1 pont	9,39 is elfogadható.
Összesen:		8 pont	

Megjegyzés: Ha az indoklás utáni végső válaszok csak a táblázatban szerepelnek, vagy ha a vizsgázo a megoldás során jól megadja a válaszokat, és a táblázatba beírásokról téveszt, ne veszítsen pontot.

belső szögek nagysága	162°
külső szögek nagysága	18°
átlók száma	170
szimmetriatengelyek száma	20
az egy csúcsból húzható különböző hosszúságú átlók száma	9
a legrövidebb átló hossza	9,38(cm)


II/B

16. a)		2 pont	<i>Ha egy szöveget ad meg, a külsőt vagy a belsőt, akkor 2 pontot kap, a mellékszög megadásáért 1 pont jár.</i>
	a külső szögek 18°-osak.	1 pont	
Összesen:		3 pont	

16. b)		2 pont	<i>A képlet helyes használata 1 pont, jó számolás 1 pont. Az összes átló helyes le-számolása is 2 pontot ér.</i>
Az összes átlók száma $\frac{20 \cdot 17}{2} = 170$. Szemközti csúcsokat összekötő átlóból 10 van, (ezek egyenese 1–1 szimmetriatengely) szemközti oldalak felezőpontját összekötő szimmetriatengelyből szintén 10, tehát összesen 20 szimmetriatengelye van a sokszögnek. Egy csúcsból 17 átló húzható, ezek között 8-8 páronként egyenlő hosszú, tehát 9 különböző hosszúságú átló húzható egy csúcsból.		1 pont	<i>Indoklás nélküli helyes választásért a 2 pontból 1 pont jár.</i>
		1 pont	
		1 pont	
	Összesen:	6 pont	

II/A

13. a)		1 pont	
A 20-39 éves korcsoport volt a legnépesebb (2 893 ezer fő).			
4 792 ezer (4 792 000) férfi és 5 251 ezer (5 251 000) nő élt az országban.		1 pont	
Összesen:		3 pont	


13. b)		1 pont	
			
A tengelyek helyes felvétele (egyértelműen kiderülnek a szereplő mennyiségek és a lépték).		1 pont	
Helyes grafikon, jól látható arányokkal.		4 pont	<i>Adatsoroként (férfiak illetve nők) 2-2 pont. Helyes sávdiaagram készítése is teljes értékű.</i>
Összesen:		5 pont	<i>Ha az összlakosságra készít oszlopdiagramot, akkor legfeljebb 3 pontot kaphat. Két külön rajzolt helyes diagram 4 pontot ér.</i>

13. c)		
A 20 évnél fiatalabb férfiak száma 1214 ezer, a korcsoport lélekszáma 2372 ezer fő volt,	1 pont	<i>Ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki, ez az 1 pont akkor is jár.</i>
tehát a férfiak százalékos aránya: $\frac{1214}{2372} \approx 0,512 = 51,2\%$.	1 pont	
A legalább 80 éves férfiak száma 75 ezer, a korcsoport lélekszáma 245 ezer fő volt,	1 pont	<i>Ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki, ez az 1 pont akkor is jár.</i>
tehát a férfiak százalékos aránya: $\frac{75}{245} \approx 0,306 = 30,6\%$.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

14. a)		
Mivel 1-50-ig 7 darab 7-tel osztható szám van,	1 pont	<i>Ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki, ez az 1 pont akkor is jár.</i>
az első versenyző $\frac{7}{50}$ valószínűséggel húz 7-tel osztható számot.	2 pont	
Összesen:	3 pont	

14. b)		
Ha a jutalom ötödrésze 16 000 forint, akkor a teljes jutalmat 80 000 forintra tervezték.	2 pont	
Az arányok szerint 1 egység a teljes jutalom 10-ed része,	1 pont	<i>Ha ezek a gondolatok a megoldás lépéseiből derülnek ki, ez az 1-1 pont akkor is jár.</i>
egy egység 8 000 forintot ér.	1 pont	
Bea kapott volna 16 000 forintot, így ő mondott le a jutalomról.	2 pont	
Összesen:	6 pont	<i>Bármilyen más helyes indoklás esetén is járnak a pontok.</i>

14. c)		
Mivel 1:3:4 arányban osztották szét a könyvtalványokat,	1 pont	
Anna 10 000, Csaba 30 000, Dani pedig 40 000 forint értékben kapott könyvtalványt.	2 pont	
Összesen:	3 pont	

15. a) első megoldás		
		
$(\operatorname{tg} \alpha) = \frac{a}{b} = \frac{3}{2}$.	2 pont	<i>A feladat tartalmának megértése.</i>
$(T =) \frac{ab}{2} = 12$.	1 pont	
Az első egyenletből: $a = \frac{3}{2}b$.	1 pont	
A második egyenletbe behelyettesítés és rendezés után: $b^2 = 16$.	1 pont	
A (pozitív) megoldás: $b = 4$,	1 pont	
$a = 6$.	1 pont	
A befogók hossza 6 cm és 4 cm.	1 pont	
Összesen:	8 pont	

15. a) második megoldás		
A befogók aránya 3:2.	2 pont	<i>A feladat tartalmának megértése.</i>
Az egyik befogó 3x, a másik 2x.	1 pont	
a háromszög területe: $\frac{a \cdot b}{2}$.	1 pont	
$12 = \frac{3x \cdot 2x}{2}$.	1 pont	
$x^2 = 4$.	1 pont	
A (pozitív) megoldás: $x = 2$.	1 pont	
A befogók hossza 6 cm és 4 cm.	1 pont	
Összesen:	8 pont	

15. b)		
Az α hegyesszög $56,3^\circ$,	1 pont	
a másik hegyesszög $33,7^\circ$ -os.	1 pont	
A derékszögű háromszög átfogója (Pitagorasz tétele szerint) $\sqrt{52} \approx 7,2$ (cm),	1 pont	
a kör sugara (az átfogó fele): $\sqrt{13} \approx 3,6$ (cm).	1 pont	
Összesen:	4 pont	<i>Kerekítési hiba esetén összesen 1 pontot veszíten.</i>