

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. október 20.

MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI
ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI
ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTERIUM

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

1. A dolgozatot a vizsgázó által használt szintűről **eltérő színű tollal** kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám** a mellette levő **téglalapba** kerül.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.
5. Az ábrán kívül ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti.

Tartalmi kérések:

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjait tovább **bonthatók**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szereplőnél **kevésbé részletezett**.
4. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
5. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel mint kinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
6. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
7. Egy feladatra adott többféle helyes megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**.
8. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészeire előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. **A vizsgafeladatsor II./B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető**. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

18. c) második megoldás		
1 csillag van kirajzolva: $\binom{4}{1} \cdot 2 = 8$ eset.	1 pont	
2 csillag van kirajzolva: $\binom{4}{2} \cdot (1 + 2 + 1) = 24$ eset. (Négy csillag közül kettőt hatféleképpen választhatunk ki, mindkettőt kirajzolhatjuk kék vagy zöld fénnyel, vagy különböző színekkel.)	2 pont	
3 csillag van kirajzolva: $\binom{4}{3} \cdot (1 + 3 + 3 + 1) = 32$ eset. (A négy csillagból hármat négyféleképpen választhatunk ki. Ezeket azonos színnel kétféleképpen rajzolhatjuk ki. Az egyik kék, kettő zöld kirajzolása 3-féle lehetőséget ad. Ugyanez igaz a színek felcserélésekor is.)	2 pont	
4 csillag van kirajzolva: $2 \cdot 1 + 2 \cdot 4 + \binom{4}{2} = 16$ eset. (Egyszínű csillagok kétféle lehetőség, három azonos és egy másik színű $2 \cdot 4$ lehetőség, két két azonos színű csillag $\binom{4}{2}$ lehetőség.)	2 pont	
Összesen: $8 + 24 + 32 + 16 = 80$ dekorációs terv készülhet.	1 pont	
Összesen:	8 pont	

18. c) harmadik megoldás	
Minden kirajzolt csillag kétféle szín lehet: kék vagy zöld.	2 pont
Egy csillag van kirajzolva: $4 \cdot 2 = 8$ lehetőség.	1 pont
Két csillag van kirajzolva: $\binom{4}{2} \cdot 2^2 = 24$ lehetőség. (Két csillagot hatféleképpen lehet kirajzolni és ezek bármelyikét 2^2 -féleképpen lehet színezni.)	2 pont
Három csillag van kirajzolva: $4 \cdot 2^3 = 32$ lehetőség.	1 pont
Négy csillag van kirajzolva: $2^4 = 16$ lehetőség. (Bármelyik csillag kétféle színnel rajzolható ki.)	1 pont
Összesen: $8 + 24 + 32 + 16 = 80$ dekorációs terv készülhet.	1 pont
Összesen:	8 pont

I.		
1.		
A számtani közép értéke: 73.	1 pont	
A mértani közép értéke: 55.	1 pont	
Összesen:	2 pont	
2.		
Az A halmaz elemei: $\{2;3;5;7\}$.	1 pont	
A B halmaz elemei: $\{6;12;18;24;30\}$.	1 pont	
Az $A \cup B$ halmaz elemei: $\{2;3;5;6;7;12;18;24;30\}$.	1 pont	
Összesen:	3 pont	
3.		
A fekete golyók száma: 12.	2 pont	H a a válasz hibás, de a keresett adatra helyes egyenletet írt fel, 1 pont adható.
Összesen:	2 pont	
4.		
A kifejezés értéke: 25.	2 pont	A pontszám nem bontható.
Összesen:	2 pont	
5.		
$\alpha = 27^\circ$	2 pont	H a csak a kerekítés hibás, 1 pont adható.
Összesen:	2 pont	
6.		
$a_{11} = (-5) \cdot (-2)^{10}$	1 pont	
$a_{11} = -5120$	1 pont	
Összesen:	1 pont	
7. első megoldás		
A hozzárendelési utasítás: $x \mapsto - x-1 + 5$	3 pont	A három transzformációs lépés 1-1 pontot ér.
Összesen:	3 pont	
7. második megoldás		
A hozzárendelési utasítás: $x \mapsto \begin{cases} x+4, & \text{ha } x \leq 1 \\ -x+6, & \text{ha } 1 < x \end{cases}$	3 pont	1-1 pont a helyes képlet és 1 pont az értelmezési tartomány helyes megjelölése.
Összesen:	3 pont	

8.		
A helyes kifejezés: F	3 pont	A 3 pont nem bontható. Ha a betűjel helyett a helyes kifejezést írja fel, a pontok járnak.
Összesen:	3 pont	
9.		
Az elhagyott szám: 5.	2 pont	
Összesen:	2 pont	
10.		
A két vektor skaláris szorzata 0.	2 pont	A pontszám nem bontható.
A két vektor szöge derékszög.	1 pont	
Összesen:	3 pont	
11.		
A kockába tehető legnagyobb felszínű gömb sugara 10 cm,	1 pont	
ennek felszíne $400\pi \approx 1256(\text{cm}^2)$.	1 pont	
Nem fér bele a gömb a dobozba.	1 pont	Ha kiszámolja a gömb sugarát ($r \approx 11,28 \text{ cm}$) és megmutatja, hogy az átmérő nagyobb 20 cm-nél, a pontok járnak.
Összesen:	3 pont	
12.		
$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}\right) =$	1 pont	
$= 2 \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) =$	1 pont	
$= -1$	1 pont	
Összesen:	3 pont	

18. b)		
Megoldandó a $0,15 = 0,1^{\frac{x}{6}}$ egyenlet (ahol x a keresett távolság mm-ben mérve).	2 pont	A 2 pont nem bontható.
$\lg 0,15 = \frac{x}{6} \cdot \lg 0,1$	2 pont	
$x = 6 \cdot \frac{\lg 0,15}{\lg 0,1}$		
$x \approx 4,9$	1 pont	
A lézersugár intenzitása kb. 4,9 mm mélységben csökken az eredeti érték 15%-ára.	1 pont	
Összesen:	6 pont	
1) Ha a 4,9-et próbálgatással (számológép) kapja meg, akkor ezért legfeljebb 3 pont jár. 2) Ha próbálgatással kapja meg a 4,9-et és hivatkozik az 1 függvény szigorú monotonitására, akkor teljes pontszámot kap.		
18. c) első megoldás		
Minden csillag esetében három lehetőség van a megvilágításra: kék, zöld, nincs kirajzolva.	3 pont	A 3 pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a számolásból derül ki.
A különböző dekorációs tervek száma ezért: $3^4 = 81$.	4 pont	
Legalább egy csillagot ki kell rajzolni, így a lehetőségek száma $81 - 1 = 80$.	1 pont	
Összesen:	8 pont	
Ha a modelt két állapotra számolja végig, legfeljebb 4 pontot kaphat.		

17. c)																															
A vízfelszín területe a valóságban: $9 \cdot 10^8 \cdot 4,7 \cdot 3,8 \cdot \sin 44,1^\circ \approx 1,119 \cdot 10^{10}$ (cm ²) (Heron-képlet is használható),		2 pont		A 2 pont megbontható a következőképpen: a (térképen látható vagy a valódi) paralelogramma területének elvileg helyes felírásáért (a paralelogramma területképletének helyes alkalmazása, vagy Heron-képlet felírása, vagy két egybevágó háromszögre bontás esetén a háromszög területének felírása) 1 pont, a terület helyes kiszámítása 1 pont.																											
ami $1,119 \cdot 10^6$ m ² .		1 pont		Ez a pont a vízfelszín területének m ² -ben való megadásáért, vagy – ha más mértékegységben adja meg ezt a területet és a térfogatot így nem m ³ -ben kapja meg – a kéndezett térfogat m ³ -be történő helyes átváltásáért jár.																											
Tehát kb. $1,119 \cdot 10^6 \cdot 0,15 \approx 1,679 \cdot 10^5$ m ³ -rel lesz több víz a tárolóban,		2 pont		Ha a mértékegységeket nem egyeztetni helyesen, legfeljebb 1 pont adható.																											
ami ezer köbméterre kerekítve 168 ezer m ³ vízmennyiséget jelent.		1 pont																													
Összesen:		6 pont																													
18. a)																															
<table><tr><td>x (mm)</td><td>0</td><td>0,3</td><td>0,6</td><td>1,2</td><td>1,5</td><td>2,1</td><td>3</td></tr><tr><td>$I(x)$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>$\left(\frac{\text{watt}}{\text{m}^2}\right)$</td><td>800</td><td>713</td><td>635</td><td>505</td><td>450</td><td>357</td><td>253</td></tr></table>		x (mm)	0	0,3	0,6	1,2	1,5	2,1	3	$I(x)$								$\left(\frac{\text{watt}}{\text{m}^2}\right)$	800	713	635	505	450	357	253	3 pont		Két-két helyes (és megfelelően kerekített) függvényértékért jár 1-1 pont. Ha a hat függvényérték bármelyikét hibás kerekítéssel adja meg, akkor legfeljebb 2 pontot kaphat, de további kerekítési hibák miatt már nem vonható le pont.			
x (mm)	0	0,3	0,6	1,2	1,5	2,1	3																								
$I(x)$																															
$\left(\frac{\text{watt}}{\text{m}^2}\right)$	800	713	635	505	450	357	253																								
Összesen:		3 pont																													

II./A

13. a)	
A zárójelek felbontása: $x^2 + 4x + 4 - 90 = 2,5x - 85$.	1 pont
$x^2 + 1,5x - 1 = 0$.	1 pont
$x_1 = 0,5, x_2 = -2$.	2 pont
A gyökök a valós számok halmazán megfelelnek.	1 pont
Összesen:	5 pont
13. b) első megoldás	
Ha $x > 0$, akkor $3 - x < 14x$.	1 pont
$x > 0,2$.	1 pont
a feltétellel összevetve $x > 0,2$.	1 pont
Ha $x < 0$, akkor $3 - x > 14x$.	1 pont
$x < 0,2$.	1 pont
a feltétellel összevetve: $x < 0$.	1 pont
Az egyenlőtlenség megoldása: $] -\infty; 0 [\cup] 0,2; \infty [$.	1 pont
Összesen:	7 pont
13. b) második megoldás	
$\frac{3-x}{7x} - 2 < 0$.	1 pont
$\frac{3-15x}{7x} < 0$.	1 pont
$3 - 15x > 0$ és $7x < 0$.	1 pont
$x < 0$	1 pont
vagy $3 - 15x < 0$ és $7x > 0$.	1 pont
$x > 0,2$.	1 pont
Az egyenlőtlenség megoldása: $] -\infty; 0 [\cup] 0,2; \infty [$.	1 pont
Összesen:	7 pont

14. a)	
(A soronként elhelyezett járólapok számát annak a számtani sorozatnak egymást követő tagjai adják, amelyre:) $a_1 = 8, d = 2$.	1 pont
$\frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n =$	1 pont
$= 858$.	1 pont
$n^2 + 7n - 858 = 0$.	1 pont
$n_1 = 26$ és $n_2 = -33$. (A megfelelő pozitív egész szám $n = 26$.)	1 pont
Angéla 26 teljes sort rakott le (ez a megoldás a feltételeknek megfelel).	1 pont
Összesen:	6 pont
<i>Ha tagonként összegezve jut el $n = 26$ – ig, nem utal arra, hogy más megoldás nem lehet, 4 pont adható.</i>	

14. b)		<i>Helyes százalékszámításért és a csomagok számának figyelembevételért 1-1 pont jár.</i>
A bordó járólapok száma 144.	2 pont	
A huszonhatodik sorba $a_{26} = a_1 + 25d = 8 + 50 = 58$ járólap került.	1 pont	
A burkolt rész peremére $8 + 58 + 2 \cdot 24 = 114$ bordó színű került.	1 pont	
30 bordó járólap maradt ki.	1 pont	
Összesen $900 - 858 = 42$ járólap maradt ki, ezek közül 12 szürke és 30 bordó.	1 pont	
Összesen:	6 pont	

15. a)	
A dobható négyzetszámok: 16, 25, 36, 64.	1 pont
Összesen 36 különböző kétjegyű számot kaphat.	1 pont
A keresett valószínűség $p = \frac{1}{9} (= 0,11)$.	1 pont
Összesen:	3 pont

15. b)	
Az egyes helyiértéken 6-féle, ettől függetlenül a tízes helyiértéken is 6-féle számot kaphat.	1 pont
A számjegyek 6 esetben egyeznek meg, ez a kedvező esetek száma.	1 pont
A valószínűség $\frac{1}{6}$.	1 pont
Összesen:	3 pont

17. b)			
Az AC szakasz a leghosszabb.	1 pont		Ennek a gondolatnak a megoldás során való felhasználása esetén is jár a pont.
Az ABD háromszögre felírjuk a koszinusztételt: $3,3^2 = 4,7^2 + 3,8^2 - 2 \cdot 4,7 \cdot 3,8 \cdot \cos BAD \hat{=}$.	1 pont		
Ebből: $\cos BAD \hat{=} \frac{4,7^2 + 3,8^2 - 3,3^2}{2 \cdot 4,7 \cdot 3,8} \approx$	1 pont		
$\approx 0,7178$	1 pont		
(tehát $BAD \hat{=} \approx 44,1^\circ$ és így $ABC \hat{=} \approx 135,9^\circ$).	1 pont		
Az ABC háromszögből koszinusztétellel: $AC^2 = 4,7^2 + 3,8^2 - 2 \cdot 4,7 \cdot 3,8 \cdot \cos ABC \hat{=}$,	1 pont		
amiből $AC \approx 7,9$ (cm).	1 pont		
Ez a valóságban (egy tizedes jegyre kerekítve) 2,4 km.	1 pont		
Összesen:	7 pont		
<i>A valódi távolságokkal is számolhat, ekkor (felhasználva, hogy $BD = 0,99$ km):</i>			
$\cos BAD \hat{=} \frac{1,41^2 + 1,14^2 - 0,99^2}{2 \cdot 1,41 \cdot 1,14} \approx 0,7178$, illetve			
$AC^2 \approx 1,41^2 + 1,14^2 + 2 \cdot 1,41 \cdot 1,14 \cdot 0,7178$, amiből $AC^2 \approx 5,595$, így AC egy tizedes jegyre kerekítve 2,4 km-nek adódik.			


16. c) második megoldás		
A rövidebb PQ körívhez tartozó 2α középponti szög a PCQ háromszögből koszinusztétellel kiszámítható. A CFP derékszögű háromszögből Pitagorasz-tétellel: $FP = 7,2$ (cm), így $PQ = 14,4$ (cm).	1 pont	<i>A PQ szakasz hosszának kiszámításáért csak abban az esetben adható ez a pont, ha a megoldásból egyértelműen kiderül, hogy a PCQ háromszögből akarja meghatározni a középponti szöveget.</i>
$\cos 2\alpha = \frac{2 \cdot 9^2 - 14,4^2}{2 \cdot 9^2} =$,	1 pont	
$= -0,28$,	1 pont	
amiből $2\alpha \approx 106,26^\circ$.	1 pont	
A rövidebb körív hossza kb. $\frac{2 \cdot 9 \cdot \pi \cdot 106,26}{360} \approx 16,7$ (cm)	1 pont	
A hosszabbik PQ körív hossza kb. 39,8 cm.	1 pont	
Összesen:	6 pont	
<i>A többszöri kerekítés és különböző kiszámítási módok miatt (pl. a második körív hosszát kivonással vagy a körív hosszára vonatkozó képlet újbóli alkalmazásával számítja, vagy pl. a π közelítő értékét használja a számításokban) a fentiekől elértő hosszak is elfogadhatók, ha azokat elvileg helyesen, a kerekítési szabályoknak megfelelően adta meg a vizsgázó.</i>		
17. a) első megoldás		
A térrképen a paralelogramma kerülete 17,0 cm, a kerékpárút pedig $17,0 \cdot 1,25 = 21,25$ cm hosszú.	1 pont	
A valóságban a kerékpárút hossza $21,25 \cdot 3 \cdot 10^4$ cm,	1 pont	
azaz 6,375 km.	1 pont	
Egy tízedes jegyre kerekítve tehát a kerékpárút hossza 6,4 km.	1 pont	
Összesen:	4 pont	
17. a) második megoldás		
A valóságban a paralelogramma oldalainak hossza: $AB = 4,7 \cdot 3 \cdot 10^4$ cm=1,41 km, illetve	1 pont	
$AD = 3,8 \cdot 3 \cdot 10^4$ cm=1,14 km (és $BD = 0,99$ km).	1 pont	
A paralelogramma kerülete 5,1 km, a kerékpárút hossza tehát $1,25 \cdot 5,1 = 6,375$ km.	1 pont	
Egy tízedes jegyre kerekítve tehát a kerékpárút hossza 6,4 km.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

15. c) első megoldás		
A számjegyek összege legfeljebb 9: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63 számok esetében.	4 pont	<i>Ezt a 4 pontot megkaphatja bármilyen helyes indoklásért, a 30 szám felsorolása nem szükséges.</i>
A kedvező esetek száma: 30.	1 pont	
A valószínűség: $30/36 = 5/6$.	1 pont	
Összesen:	6 pont	
15. c) második megoldás		
A komplementer esemény (az összeg nagyobb 9-nél) valószínűségét számítjuk ki.	2 pont	<i>Ha ez a gondolat csak a megoldásban jelent meg, akkor is jár a 2 pont.</i>
A számjegyek összege nagyobb 9-nél: 46, 55, 56, 64, 65, 66.	2 pont	
A kedvező esetek száma: 6, a komplementer esemény valószínűsége: $6/36 = 1/6$.	1 pont	
A keresett valószínűség: $1 - 1/6 = 5/6$.	1 pont	
Összesen:	6 pont	

II./B

16. a)	
Megoldandó az $x^2 + y^2 - 6x + 8y - 56 = 0 \wedge x = 8,4$ egyenletrendszer.	1 pont
Behelyettesítés után: $y^2 + 8y - 35,84 = 0$, amelyből $y = 3,2$ vagy $y = -11,2$.	1 pont
Két közös pont van: $P_1(8,4; 3,2)$, $P_2(8,4; -11,2)$.	2 pont
Összesen:	6 pont
16. b)	
A kör egyenlete átalakítva: $(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 81$.	1 pont
A kör középpontja $C(3; -4)$ (és sugara 9).	1 pont
Az egyenes párhuzamos az ordinátatengellyel, ezért a $C(3; -4)$ pontból az egyenesre bocsátott merőleges talppontja $T(8,4; -4)$.	1 pont
Az egyenes $\overline{TC} = 8,4 - 3 = 5,4$ egységre távolságra van a kör középpontjától.	1 pont
Összesen:	5 pont

16. c) első megoldás

	
A helyes ábra.	1 pont
Ez a pont akkor is jár, ha a helyes adatokat a késsőbbiekben jól használja.	
A CFP derékszögű háromszögből: $\cos \alpha = \frac{5,4}{9} = 0,6$, tehát $\alpha \approx 53,13^\circ$.	1 pont
A PQ hosszabb körívhez tartozó középponti szög $360^\circ - 2\alpha \approx 253,74^\circ$.	1 pont
A körív hossza: $\frac{2 \cdot 9 \cdot \pi \cdot 253,74}{360} \approx 39,9$.	1 pont
A hosszabb PQ körív hossza kb. 39,9 cm.	1 pont
Összesen:	6 pont
A középponti szöget radiánban is megadhatja (4,43) és az ennek megfelelő képlet alkalmazásával számíthatja a körív hosszát (39,9 cm).	