
ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. október 18.

MATEMATIKA

**KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI
ÉRETTSÉGI VIZSGA**

**JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI
ÚTMUTATÓ**

**NEMZETI ERŐFORRÁS
MINISZTERIUM**

Fontos tudnivalók


Formai előírások:

1. A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal** kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám** a mellette levő **téglalapba** kerül.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.
5. Az ábrán kívül ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti.

Tartalmi kérések:

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjait tovább **bonthatók**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szereplőnél **kevésbé részletezett**.
4. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
5. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
6. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
7. Egy feladatra adott többféle helyes megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**.
8. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészeire előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. **A vizsgafeladat sor II. B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető**. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

I.

1.			
$420 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 (= 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7).$		2 pont	<i>A pontszám nem bontható.</i>
Összesen:		2 pont	
2.			
20 000 és 16 000.		2 pont	<i>Ha tudja, hogy a 36 000-et kilenc egyenlő részre kell osztani, akkor 1 pontot kap.</i>
Összesen:		2 pont	
3.			
A 8 nap alatt 4-szer kétszereződött meg a sejtek száma (s).		1 pont	<i>Ha helyesen felírja a sorozat első négy elemét, jár ez a 2 pont.</i>
$s = 5000 \cdot 2^4$.		1 pont	
$s = 80\,000$.		1 pont	
Összesen:		3 pont	
4.			
a) $\mathbb{N}$;		1 pont	<i>Bármilyen formában megadott helyes válasz esetén járnak a pontok.</i>
b) $\mathbb{Z}$;		1 pont	
c) $\emptyset$.		1 pont	
Összesen:		3 pont	
5.			
$a = 2$.		1 pont	
$b = -3$.		1 pont	
Összesen:		2 pont	
6.			
A medián: 7.		2 pont	<i>A pontszám nem bontható.</i>
Összesen:		2 pont	
7.			
Helyesen megadott gráf pl.		2 pont	<i>A pontszám nem bontható.</i>
Összesen:		2 pont	

8.		1 pont
$d = -3$		1 pont
$a_{40} = a_1 + 49d$		1 pont
$a_1 = 176$		1 pont
Összesen:	3 pont	

9.		2 pont
B)	A 2 pont nem bontható.	2 pont
Összesen:		

10.		2 pont
B)	A 2 pont nem bontható.	2 pont
Összesen:		

11.		1 pont
$2000 \cdot 1,06^x = 4024$.	$Ha\ ez\ a\ gondolat$ $a\ számolás\ során\ derül$ $ki,\ akkor\ is\ jár\ ez\ a\ pont.$	
x kiszámítása	$Ha\ zsebszámológéppel$ $számolva,\ évről\ évre$ $megadva\ az\ összeget$ $kapja\ meg\ a\ 12\ évet,\ az\ is$ $teljes\ értékű\ megoldás.$	2 pont
$x = \frac{\lg 4024 - \lg 2000}{\lg 1,06} \approx 11,998$.		
12 teljes év alatt.		1 pont
Összesen:		4 pont

12.		2 pont
Az egy csúcsból kiinduló (bármelyik) két lapátló a végpontjaik által meghatározott harmadik lapátlóval kiegészítve szabályos háromszöget határoz meg.	$A\ helyesen\ berajzolt$ $lapátlóért\ 1\ pont\ jár.$	
a keresett szög ezért 60° -os.		1 pont
Összesen:		3 pont

18. b) első megoldás		
Komplementer eseménnyel számolunk.	1 pont	<i>Ezt a pontot akkor is megkapja, ha ez a gondolat csak a számításokból derül ki.</i>
Sérült doboz kiválasztásának a valószínűsége 0,03, ezért a jó doboz kiválasztásának a valószínűsége 0,97.	1 pont	
Annak a valószínűsége, hogy az ellenőr nem talál selejtes terméket $0,97^{10}$,	2 pont	
tehát annak a valószínűsége, hogy talál selejtest $1 - 0,97^{10} (\approx 0,2626)$.	1 pont	
A keresett valószínűség két tizedesjegyre kerekítve 0,26.	1 pont	<i>Ha a valószínűséget százalékban adja meg a vizsgázó (26%, illetve 26,26%), akkor is jár ez a pont.</i>
Összesen:	6 pont	

18. b) második megoldás		
Sérült doboz kiválasztásának a valószínűsége 0,03, ezért a jó doboz kiválasztásának a valószínűsége 0,97.	1 pont	
Legyen $P(k)$ annak a valószínűsége, hogy a kiválasztott 10 doboz között k darab selejtes van.		<i>1 pont jár, ha legalább egy esetben jól alkalmazza a binomiális eloszlásra vonatkozó összefüggést (jól helyettesít be). 1 pont jár, ha azt tudja, hogy 10 esetet kell vizsgálnia.</i>
$P(1) = \binom{10}{1} \cdot 0,03 \cdot 0,97^9 \approx 0,228$;		<i>Teljes pontszámot (3 pont) akkor kaphat, ha a fent leírt megoldás gondatlanmenetét alkalmazva jut jó eredményre, illetve ha mind a 10 esetet helyesen felírja.</i>
$P(2) = \binom{10}{2} \cdot 0,03^2 \cdot 0,97^8 \approx 0,032$;	3 pont	
$P(3) = \binom{10}{3} \cdot 0,03^3 \cdot 0,97^7 \approx 0,003$;		
$P(4) = \binom{10}{4} \cdot 0,03^4 \cdot 0,97^6 \approx 0,0001$.		
Az $5 \leq k \leq 10$ esetben mindegyik valószínűség 0,00001-nél kisebb lesz, tehát a két tizedesjegyre kerekített értéket ezek összege nem befolyásolja.		
A keresett valószínűség tehát körülbelül $0,228 + 0,032 + 0,003 = 0,263$,	1 pont	
két tizedesjegyre kerekítve 0,26.	1 pont	
Összesen:	6 pont	

II.A

13. a)		
A négyzetgyök értéke csak nemnegatív lehet: $x \leq 5$, és csak nemnegatív számnak van négyzetgyöke: $ x \geq \sqrt{35,5}$.	1 pont*	
Négyzetre emelve: $x^2 - 10x + 25 = 2x^2 - 71$.	1 pont	
Rendezve: $x^2 + 10x - 96 = 0$, amelynek valós gyökei $a = -16$ és $a = 6$.	1 pont	
Az utóbbi nem felel meg az első feltételnek, ezért nem megoldása az egyenletnek. Az egyenlet egyetlen megoldása $a = -16$, hiszen ez mindkét feltételnek megfelel, s az adott feltételek mellett csak ekvivalens átalakításokat végeztünk.	1 pont*	<i>A *-gal jelölt pontokat akkor is megkapja, ha nem fogalmazza meg a feltételeket, de bevehettesítésekkel eldönti, hogy a másodfokú egyenlet két gyöke közül melyik megoldása az eredeti egyenletnek.</i>
Összesen:		6 pont

13. b)		
A bal oldalon a $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ helyettesítést elvégezve kapjuk: $1 - \cos^2 x = 1 + 2\cos x$.	1 pont	
$\cos^2 x + 2\cos x = 0$;	1 pont	
$\cos x (\cos x + 2) = 0$.	1 pont	
Ha $\cos x = 0$, akkor $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, ahol $k \in \mathbb{Z}$.		<i>Ha a megoldást a felirt alakban adja meg, de nem szerepel az, hogy a k melyik halmaz eleme, vagy 2π-t ad meg periódusként, akkor 1 pontot kap. Ha $x = 90^\circ + k \cdot 180^\circ$ ($k \in \mathbb{Z}$) alakban adja meg a megoldást, vagy fok és radián vegyesen szerepel a megoldás felírásában, akkor erre a részre 1 pontot kap. Ha lehagyja a periódust (például a választ $x = 90^\circ$), akkor nem kap pontot.</i>
A $\cos x + 2 = 0$ egyenletnek nincs megoldása (mert $\cos x = -2$ nem lehetséges).	2 pont	
Összesen:		6 pont

Megjegyzés: Ha a másodfokú egyenlet megoldóképletével oldja meg az egyenletet, akkor is teljes pontszám járt.


18 a)	
A trapezoid \$ABCD\$ is shown with its height \$m\$. A line segment \$PQ\$ is drawn parallel to the bases \$AD\$ and \$BC\$, intersecting \$AB\$ at \$P\$ and \$CD\$ at \$Q\$. The diagram includes various length measurements along the top edge (\$DP=2.5, PE=3, EF=3, FC=5.5\$) and the right side (\$BH=3, HC=3\$). The bottom base \$AD\$ has a length of \$8.5\$. The height \$m\$ is indicated by dashed lines from point \$G\$ on \$BC\$ to \$F\$ on \$AD\$ and from point \$H\$ on \$BC\$ to \$E\$ on \$AD\$.	1 pont
Ábra készítése, adatok feltüntetése. A csontkakúp m cm magas. (A szimmetria miatt) $ED = 2,5$ cm. Az AED derékszögű háromszögből ($AD = 8,5$; $AE = m$): $m^2 = 8,5^2 - 2,5^2$, $m \approx 8,1$. Ennek 86%-a: $0,86m \approx 7,0$. Az APQ és az AED derékszögű háromszögek hasonlóak (mindkettő derékszögű és egyik hegyesszögük közös); a hasonlóságuk aránya (megfelelő oldalaik hosszának aránya) $0,86$. Ezért $PQ = 0,86 \cdot DE$, vagyis $PQ = 0,86 \cdot 2,5 = 2,15$. A síkmetszet sugara: $GQ = 3 + 2,15 = 5,15$. A tejföl térfogata: $V \approx \frac{7,0 \cdot \pi}{3} \cdot (5,15^2 + 3^2 + 5,15 \cdot 3)$. $V \approx 372,9$ (cm³). Tíz cm³-re kerekítve a tejföl térfogata 370 cm³.	1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont
Há ábra nélkül is jó a megoldása, akkor is jár a pont. Há a megadott átmérőkkel mint sugarakkal számol a vizsgázó, akkor ezt a pontot nem kaphatja meg.	1 pont
Összesen:	11 pont

14. a)		
A legalább 40 éveseknek a 18,75%-a adta az idézett választ.	1 pont	<i>Ha ez a gondolat a számolás során derül ki, akkor is jár ez a pont.</i>
80-nak a 18,75%-a: $80 \cdot 0,1875$.	1 pont	
Tehát 15, legalább 40 éves ember adta az „5-nél kevesebb” választ.	1 pont	
Összesen:	3 pont	
14. b)		
A 40 év alattiak közül $120 \cdot 0,35 = 42$,	1 pont	
a legalább 40 évesek közül $80 \cdot 0,375 = 30$,	1 pont	
azaz összesen 72 olyan ember van, aki évente 5–10 alkalommal jár színházba.	1 pont	
Ez a szám a megkérdozettek 36%-a.	1 pont	
Összesen:	4 pont	
14. c) első megoldás		
Az összes lehetséges kiválasztás: $\binom{200}{2}$ ($= 19\,900$).	1 pont	
Két 40 évnél fiatalabb van a kiválasztottak között: $\binom{120}{2}$ ($= 7140$) esetben.	1 pont	
Annak a valószínűsége, hogy a két kiválasztott 40 évnél fiatalabb: $\frac{\binom{120}{2}}{\binom{200}{2}} = \frac{7140}{19\,900} \approx 0,359$.	1 pont	
A komplementer esemény valószínűsége: $1 - \frac{\binom{120}{2}}{\binom{200}{2}} = \frac{12\,760}{19\,900}$.		1 pont
Tehát 0,641 annak a valószínűsége, hogy legfeljebb egy 40 évnél fiatalabb van a kiválasztottak között.	1 pont	<i>Ha nem három tizedes-jegyre vagy hibásan kerekíti, akkor ez a pont nem jár.</i>
Összesen:	5 pont	

17. c)		
Az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyek mindegyike szerepel a hatjegyű számban, közülük az egyik pontosan kétszer.	1 pont	<i>Ha ez a gondolat a megoldás során derül ki, akkor is jár ez a pont.</i>
Csak a 3-as számjegy lehet az, amelyik kétszer fordul elő,	1 pont	
mert a számjegyek összegének 3-mal oszthatónak kell lennie,	1 pont	
és $1+2+3+4+5 = 15$ (ami osztható 3-mal).	1 pont	
A két 3-as számjegy helyét $\binom{6}{2}$ -féleképpen választhatjuk meg.	1 pont	<i>A megfelelő 6-jegyű számok darabszáma az 1; 2; 3; 3; 4; 5 karakterek összes permutációinak száma, tehát $\frac{6!}{2!} = 360$.</i>
A megmaradó 4 helyre 4!-féleképpen helyezhető el a többi számjegy.	1 pont	
A megfelelő hatjegyű számokból összesen $\binom{6}{2} \cdot 4!$, azaz 360 darab van.	1 pont	
Összesen:	8 pont	

16. d)

Az ábra jelöléseit használjuk.



Az AKF derékszögű háromszögből:

$$\cos \alpha = \frac{17}{18},$$

$$\alpha \approx 19,2^\circ. \quad (2\alpha \approx 38,4^\circ)$$

$$T_{AKBA} \approx \frac{18^2 \cdot \sin 38,4^\circ}{2} \quad (\approx 100,6 \text{ km}^2).$$

$$T_{\text{körlekk}} \approx 18^2 \pi \cdot \frac{38,4^\circ}{360^\circ} \quad (\approx 108,6 \text{ km}^2).$$

$$T_{\text{körselet}} \approx 108,6 - 100,6 = 8 \text{ (km}^2\text{)}.$$

Az elpusztult rész területe körülbelül 8 km^2 .

Összesen: 6 pont

17. a)

Összesen: $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4$,

azaz 840 négyjegyű számot lehet készíteni.

Összesen: 3 pont

17. b)

Az első öt számjegy mindegyike lehet az 1, 2, 3, 4, 5 számok közül bármelyik, ez összesen $5^5 (= 3125)$ lehetőség.

Az utolsó két számjegy a 4-gyel való oszthatóság miatt csak a következő öt eset valamelyike lehet: 12, 24, 32, 44, 52.

$$\text{Összesen } 5^5 \cdot 5.$$

azaz 15 625 hétjegyű szám alkotható.

Összesen: 6 pont

14. c) második megoldás

Az összes lehetséges kiválasztás: $\binom{200}{2} (= 19\,900)$.

Ezek közül mindkét véletlenszerűen kiválasztott legalább 40 éves: $\binom{80}{2} (= 3160)$ esetben,

különböző korosztályú: $80 \cdot 120 (= 9600)$ esetben.

A kértezett esemény valószínűsége:

$$\frac{\binom{80}{2} + 80 \cdot 120}{\binom{200}{2}} = \frac{12\,760}{19\,900}.$$

Tehát 0,641 a valószínűsége annak, hogy legfeljebb egy 40 évnél fiatalabb van a kiválasztottak között.

Ha nem három tizedesjegyre vagy hibásan kerekíti, akkor ez a pont nem jár.

Összesen: 5 pont

15. a) első megoldás

(A két egyenes egyenletéből alkotott

egyenletrendszer megoldása adja a P koordinátáit.)

Az első egyenletből: $y = 2,5x + 7,25$.

Ezt behelyettesítve a második egyenletbe és rendezve: $x = -1,5$.

$$y = 3,5.$$

$$\text{Tehát } P(-1,5; 3,5).$$

Összesen: 4 pont

15. a) második megoldás

(A két egyenes egyenletéből alkotott

egyenletrendszer megoldása adja a P koordinátáit.)

$$10x - 4y = -29$$

$$10x + 25y = 72,5$$

$$29y = 101,5$$

$$y = 3,5$$

$$x = -1,5.$$

$$\text{Tehát } P(-1,5; 3,5).$$

Összesen: 4 pont

Megjegyzés: A két egyenes helyes ábrázolása 1-1 pont. A jól ábrázolt egyenesek metséspontja koordinátáinak $(-1,5; 3,5)$ helyes leolvása 1 pont, ezek ellenőrzése behelyettesítéssel 1 pont.

15. b) első megoldás			
Az egyenesek normálvektora $\mathbf{n}_e(5; -2)$ és		1 pont	
$\mathbf{n}_f(2; 5)$.		1 pont	
A normálvektorok skaláris szorzata: $\mathbf{n}_e \cdot \mathbf{n}_f = 5 \cdot 2 + (-2) \cdot 5 = 10 - 10 = 0$.		1 pont	<i>Ez a 2 pont akkor is jár, ha a vizsgázó arra hivatkozik, hogy a két normálvektor egymás 90°-os elforgatottja.</i>
Tehát a két egyenes merőleges.		1 pont	
Összesen:	4 pont		

15. b) második megoldás			
Az egyenesek meredeksége: $m_e = \frac{5}{2}$,		1 pont	
$m_f = -\frac{2}{5}$.		1 pont	
A meredekségek szorzata -1 ,		1 pont	
tehát a két egyenes merőleges.		1 pont	
Összesen:	4 pont		

15. c)			
Az e egyenes meredeksége 2,5, tehát az egyenes x tengellyel bezárt α szögére igaz, hogy $\operatorname{tg} \alpha = 2,5$.		3 pont	
Ebből $\alpha \approx 68,2^\circ$.		1 pont	
Összesen:	4 pont		

II. B

16. a)			
$M = -4,42 + \frac{2}{3} \lg(1,344 \cdot 10^4)$		1 pont	
$M \approx 5$		2 pont	<i>4,9 és 5 között bármely érték elfogadható.</i>
Összesen:	3 pont		

16. b)			
$9,3 = -4,42 + \frac{2}{3} \lg E$.		1 pont	
$\lg E = 20,58$.		1 pont	
Tehát a felszabadult energia körülbelül $E \approx 3,8 \cdot 10^{20}$ (J).		1 pont	
Összesen:	3 pont		

16. c)			
A chilei rengés erőssége 2-vel nagyobb volt, mint a kanadai: $-4,42 + \frac{2}{3} \cdot \lg E_C = -4,42 + \frac{2}{3} \cdot \lg E_K + 2$.		1 pont	
Rendezve: $\lg E_C - \lg E_K = 3$.		1 pont	
(A logaritmus azonosságát alkalmazva) $\lg \frac{E_C}{E_K} = 3$.		1 pont	
Ebből $\frac{E_C}{E_K} = 1000$.		1 pont	
1000-szer akkora volt a felszabadult energia.		1 pont	
Összesen:	5 pont		