

18. c)	
A gömböket jelölje a megadott fokszámok sorrendjében A, B, C, D, E, F és G . Az A gömb mindegyik másik gömbbel össze van kötve. Mivel G elsőfokú gömb, ezért csak A -val van össze-kötve. F is elsőfokú gömb, ezért F is csak A -val van össze-kötve. Ezek szerint B csak A -val, C -vel, D -vel és E -vel lehet összekötve, vagyis nem lehet ötödfokú.	1 pont 1 pont 1 pont 1 pont
Összesen:	4 pont

Megjegyzés: Ha a vizsgáló egy olyan 7 csúcú gráfot rajzol, amely tikrözi a feladat megértését, de szövegesen nem indokolja az ellenmondást, akkor 2 pontot kaphat.

18. d) első megoldás	
Mindegyik felhasznált pálcika két gömböt köt össze, így az egyes csúcsokból induló pálcikákat megszámlolva minden felhasznált pálcikát kétszer számolunk meg. Így az összes (jól) feljegyzett szám összege éppen kétszerese a pálcikák számának. A pálcikák száma tehát: $\frac{6 + 5 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1}{2} = 11$.	1 pont 1 pont 1 pont
Összesen:	3 pont

18. d) második megoldás	
A gömböket tekintjük egy gráf csúcsainak, a gömböket összekötő pálcikákat pedig a gráf éleinek. Ebben a gráfban a csúcsok fokszámának összege az élek számának kétszerese. A pálcikák száma tehát: $\frac{6 + 5 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1}{2} = 11$.	1 pont 1 pont 1 pont
Összesen:	3 pont

Megjegyzés: Ha a vizsgáló egy helyesen felrajzolt gráfból adja meg az élek (pálcikák) számát, akkor ez a 3 pont jár.

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. május 8.

MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

1. A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal** kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám** a mellette levő **téglalapba** kerül.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.
5. Az ábrán kívül ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti.

Tartalmi kérések:

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szereplőnél **kevésbé részletezett**.
4. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
5. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
6. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
7. Egy feladatra adott többféle helyes megoldási próbálkozás közül a **vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**.
8. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészeire előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. A **vizsgafeladat sor II. B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető**. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

18. b) első megoldás


	1 pont	Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt
(Mivel a kocka BA éle merőleges az $ADHE$ oldallapra, ezért) a HAB szög nagysága 90° .	1 pont	
A kocka élének hosszát a -val jelölve $AH = a \cdot \sqrt{2}$, így $\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{2}$,	1 pont	
amiből $(0^\circ < \alpha < 90^\circ)$ miatt) $\alpha \approx 54,74^\circ$.	1 pont	Bármilyen helyes kerekítés (pl. 55°) esetén jár ez a pont.
Összesen:	4 pont	

18. b) második megoldás


A kocka élének hosszát a -val jelölve $AH = a \cdot \sqrt{2}$, $BH = a \cdot \sqrt{3}$.	1 pont	
Az ABH háromszögben felírható koszinusztétel: $2a^2 = a^2 + 3a^2 - 2 \cdot a \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \alpha$, amiből $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$,	1 pont	
így $(0^\circ < \alpha < 90^\circ)$ miatt) $\alpha \approx 54,74^\circ$.	1 pont	Bármilyen helyes kerekítés (pl. 55°) esetén jár ez a pont.
Összesen:	4 pont	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó egy általa választott élhosszúságú kockából jól számolja ki a szöveget, akkor teljes pontszámot kaphat.

18. a)

A test alaplapja négyzet, melynek területe $T = 100 \text{ (cm}^2\text{)}$.	1 pont	
 A gúla m magassága egy olyan derékszögű háromszög egyik befogója, melynek átfogója 10 (cm), másik befogója (az alaplap átlójának fele): $\frac{10 \cdot \sqrt{2}}{2} (= \sqrt{50} \approx 7,07 \text{ cm})$.	1 pont*	Ez a 2 pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.
(Így a Pitagorasz-tétel értelmében:) $m^2 = 100 - 50 = 50$, amiből ($m > 0$ miatt) $m = \sqrt{50} (\approx 7,07 \text{ cm})$.	1 pont*	
A gúla térfogata $V = \frac{Tm}{3} = \frac{100 \cdot \sqrt{50}}{3} (\approx 236) \text{ cm}^3$.	1 pont	
Összesen:	6 pont	

A *-gal jelölt 3 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó:

 A gúla m magassága egy olyan derékszögű háromszög egyik befogója, melynek másik befogója 5 (cm), átfogója (egy 10 cm oldalú szabályos háromszög magassága): $\frac{10 \cdot \sqrt{3}}{2} (= \sqrt{75} \approx 8,66 \text{ cm})$.	1 pont	Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.
(Így a Pitagorasz-tétel értelmében:) $m^2 = 75 - 25 = 50$,	1 pont	


I.

1.			
$S_6 = -63$	2 pont		Ha a vizsgázó jól felírja a sorozat elemeit vagy a mértani sorozat összegképletébe jól helyettesíti be az adatokat, de rosszul számol, akkor 1 pontot kap.
Összesen:	2 pont		
2. első megoldás			
Az f egyenes egy normálvektora a $(2; -1)$ vektor, ez a vektor az e egyenesnek is egy normálvektora.	1 pont		Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.
$2x - y = 2 \cdot 3 + (-1) \cdot (-2)$	1 pont		Ez a pont jár az egyenes egyenletének bármely alakjába való jó behelyettesítés esetén.
Az e egyenes egyenlete: $2x - y = 8$.	1 pont		
Összesen:	3 pont		
2. második megoldás			
Az f egyenes meredeksége 2, így az e egyenes meredeksége is 2.	1 pont		Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.
$-2 = 2 \cdot 3 + b$ egyenletből $b = -8$.	1 pont		
Az e egyenes egyenlete: $y = 2x - 8$.	1 pont		
Összesen:	3 pont		
3.			
A minimum helye: -2 .	1 pont		
A minimum értéke: 4.	1 pont		
Összesen:	2 pont		
4.			
A) igaz	1 pont		
B) igaz	1 pont		
Összesen:	2 pont		
5.			
András fizetése az emelés után 156 800 Ft lett.	2 pont		
Összesen:	2 pont		

6.		2 pont	
$\alpha = 45^\circ$		2 pont	
	Összesen:		
7.			
A kör középpontja: $K(-2; 0)$,	2 pont		<i>Ha csak az egyik koordináta jó, akkor 1 pont jár.</i>
sugara $r = 3$.	1 pont		
	Összesen:	3 pont	
8.			
Károly testtömegindexe $\approx 25,42$ (kg/m ²).	3 pont		<i>Ha a vizsgáló a magasságot nem számolja át méterbe, akkor legfeljebb 2 pontot kaphat. Más helyes kerekítés (pl. 25) is elfogadható.</i>
	Összesen:	3 pont	
9.			
Két kockával 3-féleképpen lehet a dobott számok összege 4: (1; 3), (2; 2), (3; 1).	1 pont		
Két kockával összesen $6^2 = 36$ -félét dobhatunk.	1 pont		
Így a kérdéses valószínűség: $\frac{3}{36}$ ($\approx 0,083$).	1 pont		
	Összesen:	3 pont	
10.			
A logaritmus definíciója alapján: $x^2 = 16$,	1 pont		
a lehetséges x értékek: 4,	1 pont		
–4.	1 pont		
	Összesen:	3 pont	
<i>Megjegyzés: Ha a vizsgáló $2\log x = 4$-et, majd ebből $x = 4$-et kap, akkor 1 pontot kaphat.</i>			
11.			
A tört egyszerűsített alakja: $\frac{x-3}{x+3}$.	3 pont		<i>Ha a vizsgáló a számlálót, illetve a nevezőt jól alakítja szorzattá, akkor ezért 1-1 pontot kaphat.</i>
	Összesen:	3 pont	
12.			
A helyes válasz betűjele: A.	2 pont		
	Összesen:	2 pont	

17. a)			
András jegyeinek átlaga 3,8,		1 pont	
így jegyeinek szórása $\sqrt{\frac{(3-3,8)^2 + \dots + (5-3,8)^2}{5}} \approx$		1 pont	<i>Ez a 3 pont akkor is jár, ha a vizsgáló számológéppel jól számol.</i>
$\approx 0,75$.		1 pont	
	Összesen:	3 pont	
<i>Megjegyzés: Ha számológéppel ún. „korrigált szórást” számol ($\approx 0,84$), akkor 2 pontot kap.</i>			
17. b)			
András jegyeinek átlaga 3,8, Bea jegyeinek átlaga 4,6,		1 pont	
Mivel Cili jegyeinek szórása 0, ezért minden jegye azonos.		1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgáló gondolatmenete helyes volt.</i>
Így Cilinek minden jegye 4-es.		1 pont	
	Összesen:	3 pont	
17. c)			
Dávid jegyeinek összege 22,		1 pont	
jegyeit nagyság szerint sorba rendezve a középső 4-es.		1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgáló gondolatmenete helyes volt.</i>
A jegyek között 1-es, 2-es és 3-as nem szerepelhet. Négy darab 4-es nem lehet, mert akkor a jegyek összege nem lehet 22.		1 pont	<i>Ez a pont bármilyen helyes indoklás esetén jár.</i>
Dávid jegyei: 4; 4; 4; 5; 5.		1 pont	
Ezekkel a jegyekkel érettségi bizonyítványát $\binom{5}{2} =$		2 pont	<i>Ez a 3 pont jár, ha a vizsgáló felsorolja az összes lehetséges esetet.</i>
$= 10$ -féleképpen lehet kitölteni.		1 pont	
	Összesen:	7 pont	
17. d)			
Jeles osztályzatot az osztály $\frac{1}{6}$ része ért el, a hozzájuk tartozó köríkk középponti szöge 60° .		1 pont	
A közepes osztályzatot elérőkhöz tartozó középponti szög $360^\circ - (60^\circ + 45^\circ + 150^\circ) = 105^\circ$,		1 pont	
az ehhez tartozó diákok száma: $\frac{105^\circ}{360^\circ} \cdot 24$,		1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgáló megállapítja, hogy egy diakhoz 15°-os középponti szög tartozik.</i>
vagyis közepes osztályzatot 7 diák szerzett.		1 pont	
	Összesen:	4 pont	

II. B

16. a)				
	A halmaz	B halmaz	C halmaz	
52	eleme	nem eleme	eleme	
78	eleme	eleme	nem eleme	
124	nem eleme	nem eleme	eleme	
216	nem eleme	eleme	eleme	
Minden jól kitöltött sor				
				1-1 pont
				<i>Ha a vizsgázó a táblázat egy sorát hibásan töltötte ki, de az adott számot a feladat szövegének megfelelő tartományba írja, akkor ez a pont sem jár.</i>
Minden jó helyre írt szám:				1-1 pont
Összesen:				8 pont


16. b)	
A három halmaz közös részében azok a pozitív egész számok vannak, melyek 100-nál nem nagyobbak és 3-mal és 4-gyel is (tehát 12-vel) oszthatók.	1 pont
Ezek a számok: $A \cap B \cap C = \{2, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96\}$.	1 pont
Összesen 8 darab ilyen szám van.	1 pont
Összesen:	3 pont

16. c)	
Az A halmaz elemeinek a száma: $ A = 100$.	1 pont
Ezek közül hárommal osztható (vagyis B -nek is eleme) 33 darab.	1 pont
Négyvel osztható (vagyis C -nek is eleme) 25 darab.	1 pont
Tizenkettővel osztható (vagyis mindhárom halmaznak eleme) 8 darab.	1 pont
Így az A halmaz azon elemeinek a száma, melyek nem elemei sem B , sem C halmaznak: $100 - 33 - 25 + 8 = 50$.	1 pont
A kérdéses valószínűség: $P = \frac{50}{100} = 0,5$.	1 pont
Összesen:	6 pont

II. A

13. a)	
(A hatványozás azonosságainak felhasználásával) $5 \cdot 5^x + 5^2 \cdot 5^x = 30$.	1 pont
$30 \cdot 5^x = 30$	1 pont
$5^x = 1$	1 pont
(Az 5 alapú exponenciális függvény szigorú monotonitása miatt) $x = 0$.	1 pont
Ellenőrzés.	1 pont
Összesen:	5 pont

13. b)	
Az egyenlet bal oldalát közös nevezőre hozva: $\frac{3(x+2) - 2x}{x(x+2)} = 1$.	1 pont
Az egyenlet mindkét oldalát $x(x+2)$ -vel szorozva: $3(x+2) - 2x = x(x+2)$.	1 pont
A zárójelek felbontása és összevonás után: $x + 6 = x^2 + 2x$.	1 pont
Nullára rendezve: $x^2 + x - 6 = 0$.	1 pont
A másodfokú egyenlet gyökei: $x_1 = -3, x_2 = 2$.	2 pont
Ellenőrzés.	1 pont
Összesen:	7 pont

14. a) első megoldás	
	1 pont
Az ATC derékszögű háromszögben $m_a = 12 \cdot \sin 40^\circ \approx$ $\approx 7,7$ cm.	1 pont
Összesen:	2 pont

14. a) második megoldás	
Az ABC háromszög területe: $T = \frac{12 \cdot 14 \cdot \sin 40^\circ}{2}$.	1 pont
Ebből a BC oldalhoz tartozó m_a magasság: $m_a = \frac{12 \cdot 14 \cdot \sin 40^\circ}{14} \approx 7,7$ cm.	1 pont
Összesen:	2 pont

14. b)	
A háromszög kérdéses oldalára a koszinusztételt felírva:	1 pont
$AB^2 = 14^2 + 12^2 - 2 \cdot 14 \cdot 12 \cdot \cos 40^\circ$	1 pont
$AB \approx 9,1$ cm	1 pont
Összesen:	3 pont

14. c) első megoldás	
Az $AEDC$ négyszög trapéz, mert az ED szakasz az ABC háromszögben középvonal, így párhuzamos az AC oldallal.	1 pont
$ED = 6$ (cm)	1 pont
A trapéz magassága az ABC háromszög AC oldalhoz tartozó magasságának a fele.	1 pont
Az ABC háromszög területe: $T = \frac{12 \cdot 14 \cdot \sin 40^\circ}{2} (\approx 54 \text{ cm}^2)$.	1 pont
Ebből az AC oldalhoz tartozó m_b magasság: $m_b = \frac{T \cdot 2}{12} \approx 9$ (cm).	1 pont
Az $AEDC$ trapéz területe: $T = \frac{12+6}{2} \cdot m_b \approx 40,5 \text{ cm}^2$.	1 pont
Összesen:	7 pont

14. c) második megoldás	
Az $AEDC$ négyszög területét megkapjuk, ha az ABC háromszög területéből levonjuk a BDE háromszög területét.	1 pont
A BDE háromszög hasonló az ABC háromszöghöz.	1 pont

A hasonlóság aránya: $\frac{1}{2}$,	1 pont	Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgáló gondolatmenete helyes volt.
így a BDE háromszög területe negyede az ABC háromszög területének.	1 pont	
Mivel az ABC háromszög területe: $T \approx 54$ (cm ²),	1 pont	
ezért a BDE háromszög területe $\approx 13,5$ (cm ²),	1 pont	
így az $AEDC$ trapéz területe $\approx 40,5$ cm ² .	1 pont	
Összesen:	7 pont	

Megjegyzés: Ha a vizsgáló helyes keretítésekkel a kérdéses trapéz területére $40,4 \text{ cm}^2$ -t kap eredményül, akkor a megfelelő pontok járnak.

Ha a vizsgáló az egész feladat megoldása során több helyen nem kerekít vagy rosszul kerekít, akkor emiatt összesen 1 pontot veszítsen. Ha a vizsgáló választait az egész feladat megoldása során több helyen mértékegység nélkül adja meg, akkor emiatt összesen 1 pontot veszítsen.

15. a)	
A nyári olimpiák évszámai egy olyan számtani sorozatot alkotnak, melynek első tagja 1896, különbsége pedig 4.	1 pont
$a_{20} = 1896 + 19 \cdot 4 = 1972$, vagyis 1972-ben tartották a 20. nyári olimpiát.	1 pont
Összesen:	2 pont

15. b)	
$1896 + (n-1) \cdot 4 = 2008$	1 pont
$n = 29$. nyári olimpiát tartották 2008-ban.	1 pont
Összesen:	2 pont

15. c)	
(A megadott két adatot egy számtani sorozat első, illetve harmadik tagjának tekintve:) $75 + 2d = 192$, amiből $d = 58,5$.	1 pont
Így Eszter becslése a sorozat nyolcadik tagjára: $75 + 7d (= 484,5) \approx 485$ (millió dollár).	1 pont
(A megadott két adatot egy mértani sorozat első illetve harmadik tagjának tekintve:) $75q^2 = 192$, amiből ($q > 0$ miatt) $q = 1,6$.	1 pont
Így Marci becslése a sorozat nyolcadik tagjára: $75q^7 \approx 2013$ (millió dollár).	1 pont
$1383 - 485 = 898$ és $2013 - 1383 = 630$, vagyis Marci becslése tér el kisebb mértékben a tényleges adattól.	1 pont
Összesen:	8 pont