

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. május 6.

MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

1. A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal** kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám** a mellette levő **téglalapba** kerül.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.
5. Az ábrán kívül ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti.

Tartalmi kérések:

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
5. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
6. Egy feladatra adott többféle helyes megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**.
7. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrésze előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
8. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
9. **A vizsgafeladatsor II. B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető**. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

I.

1.		2 pont	<i>Ha tudja, hogy a 35-öt hét egyenlő részre kell osztani, akkor 1 pontot kap.</i>
15 fiú van az osztályban.			
	Összesen:	2 pont	

2.		2 pont	
$x = 1$			
	Összesen:	2 pont	<i>Ha tudja, hogy $\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$, akkor 1 pontot kap.</i>

3.		1 pont	
a) A (0; 4) pontban vagy (y =)4 -nél.			
b) $-2x + 4 = 6$		1 pont	<i>Ha a grafikonról olvassa le a vizsgázó, akkor is jár ez a 2 pont.</i>
$x = -1$		1 pont	
	Összesen:	3 pont	

4.		2 pont	<i>Nem bontható.</i>
A dolgozatot ($3^3 =$)27 tanuló írta meg.			
	Összesen:	2 pont	

5.		2 pont	<i>Nem bontható.</i>
A fókuszok összege: 14.			
	Összesen:	2 pont	

6.		1 pont	
$5 - x \geq 0$			
$(0 \leq) x \leq 5, (x \in \mathbf{Z})$		1 pont	
$A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$		1 pont	
	Összesen:	3 pont	


7.		1 pont	
A 270° a 360° -nak $\frac{3}{4}$ -e.			
A kör területe $3^2 \cdot \pi (\approx 28,27 \text{ cm}^2)$.		1 pont	<i>Ha a vizsgázó π értékét jól kerekítve használja, akkor ez a 2 pont jár.</i>
A körekk területe: $\frac{27}{4} \cdot \pi (\approx 21,2) \text{ cm}^2$.		1 pont	
	Összesen:	3 pont	

8.						2 pont	Az adatok más formában (tört, %) történő helyes megadása esetén is jár a 2 pont. 1 hibás érték esetén 1 pont, 1-nél több hiba esetén nem jár pont.
	Összesen: 2 pont						
9.						1 pont	
	A) igaz					1 pont	
	B) hamis					1 pont	
	C) igaz					1 pont	
	Összesen: 3 pont						
10.						1 pont	Ha csak a számolásból látszik ez a gondolat, akkor is jár az 1 pont.
	A gömb sugara a kocka testátlójának fele.					1 pont	Ha megfelelő közelítő értéket használ, jár az 1 pont.
	A kocka testátlójának hossza: $7 \cdot \sqrt{3} \approx 12,1$					1 pont	Ha nem jól kerekíti, ez a pont nem jár.
	A gömb sugara tehát $\frac{7 \cdot \sqrt{3}}{2} \approx 6,1$					1 pont	
	Összesen: 3 pont						
11.						2 pont	
	B)					2 pont	
	Összesen: 2 pont						
12.						1 pont	A feladat szövegének megfelelő jó ábráért 1 pont jár.
	(Az AC átló felezi a BCD szöveget.) Az ACD szög 60°-os, és ACD háromszög egyenlőszárú, vagyis a háromszög szabályos.					1 pont	
	A keresett átló hossza ezért 6 cm.					1 pont	
	Összesen: 3 pont						

18. c) első megoldás		
Két lehetőséget kell vizsgálni: 2 fiúnak és 1 lánynak vagy 1 fiúnak és 2 lánynak ad virágot.	1 pont	Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.
Az 5 fiú közül kettőt $\binom{5}{2} (= 10)$, a 2 lány közül egyet 2-féleképpen tud kiválasztani, vagyis az első esetben $10 \cdot 2 = 20$ különböző lehetősége van.	1 pont	
Az 5 fiú közül egyet 5, a 2 lány közül kettőt egyféleképpen tud kiválasztani, vagyis a második esetben 5 különböző lehetősége van.	1 pont	
(Az összes lehetőség ezek összege), vagyis $20 + 5 = 25$ -féleképpen választhat.	1 pont	
Összesen:	6 pont	
18. c) második megoldás		
A megfelelő kiválasztások számát megkapjuk, ha az összes lehetséges kiválasztások számából kivonjuk azokat, amelyek nem megfelelőek.	1 pont	Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.
A 7 barát közül 3-at $\binom{7}{3} (= 35)$ -féleképpen lehet kiválasztani,	1 pont	
ezek közül nem megfelelőek azok, amikor csak fiúkat választ ki.	2 pont	Ez a 2 pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki. Nem bontható.
A nem megfelelő kiválasztások száma $\binom{5}{3} (= 10)$.	1 pont	
A megfelelő kiválasztások száma így $35 - 10 = 25$.	1 pont	
Összesen:	6 pont	

Ha a vizsgázó a helyes eredményre a különböző kiválasztások rendszerezett felsorolásával jut el, akkor is jár a 6 pont. Ha az eseteket felsorolja, akkor minden hibás eset felírása, illetve minden helyes eset kihagyása esetén 1-1 pontot le kell vonni (összesen legfeljebb 6 pontot).

II. A

18. b) második megoldás	
Venn-diagram, mint az első megoldásnál.	2 pont
(A csak a fehér szint választók számát y -nal jelölve:)	
	2 pont
$3y + 14 = 32$	2 pont
$y = 6$	1 pont
6 diák jelölte meg csak a fehér szint.	1 pont
Összesen:	8 pont


18. b) harmadik megoldás	
A sárga szint választók halmazát S -sel, a fehérét választók halmazát F -fel és a bordót választók halmazát B -vel jelölve:	2 pont
$ S \cap F = 4$ és $ B \cap F = 3$, továbbá	
$ S \cap B = 0$ (és $ S \cap B \cap F = 0$).	
$ S = F = B = x$	2 pont
(A logikai szita formula alapján:)	
$32 = x + x + x - (4 + 3)$	2 pont
$x = 13$	1 pont
(A fehér szint összesen 13-an választották, ebből $13 - 7 = 6$ diák csak a fehér szint jelölte meg.	1 pont
Összesen:	8 pont

13. a)	
Értelmezési tartomány: $x > 0$.	1 pont
<i>Ha a vizsgázó nem vizsgálja az értelmezési tartományt, de a gyök helyességéről pl. behelyettesítéssel meggyőződik, akkor ezt a pontot is megkapja.</i>	
A logaritmus megfelelő azonosságának helyes alkalmazása.	1 pont
(A logaritmus függvény kölcsönösen egyértelmű.)	
$\frac{7x+18}{x} = 9$ (vagy $7x+18 = 9x$)	1 pont
$x = 9$	1 pont
Ellenőrzés behelyettesítéssel vagy az $x > 0$ feltétel felírása mellett az ekvivalens átalakításokra való hivatkozás.	1 pont
Összesen:	5 pont

13. b)	
$a = \cos x$ (ahol $-1 \leq a \leq 1$) helyettesítéssel: $2a^2 - 7a - 4 = 0$.	1 pont
Az egyenlet gyökei $a_1 = 4$,	1 pont
és $a_2 = -\frac{1}{2}$.	1 pont
Az $a = \cos x = 4$ nem ad megoldást, (mert $\cos x \leq 1$.)	1 pont
A $\cos x = -\frac{1}{2}$ egyenlet megoldásai $[0; 2\pi]$ -n:	1 pont*
$x_1 = \frac{2\pi}{3}$,	
$x_2 = \frac{4\pi}{3}$.	1 pont*
Ellenőrzés (például behelyettesítéssel).	1 pont
Összesen:	7 pont



*Az egyenlet gyökeinek helyes felírása, de a megadott alaphalmaz figyelmen kívül hagyása (például végtelen sok gyök vagy negatív gyök megadása) esetén a két, *-gal jelölt pontból csak 1 pont adható.*

14. a)		
Az adatok átlaga: $\frac{83 \cdot 2 + 76 \cdot 4 + 69 \cdot 2 + \dots + 58 \cdot 4 + 56 \cdot 4 + 55}{28} =$	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.</i>
$\frac{1816}{28} \approx 64,86.$	1 pont	
Mivel az adatok száma páros, ezért a medián a nagyság szerint sorba rendezett adatok közül a két középső számtani közepe:	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.</i>
$\frac{61 + 65}{2} = 63.$	1 pont	
A válasz: igen, az átlag és a medián legalább 1 ponttal eltér egymástól.	1 pont	
Összesen:	5 pont	

14. b)		
„Kiváló” minősítést érdemel 6 osztály, „Nagyon jó”-t 13, „Jó” minősítést kap 9 osztály.	2 pont	<i>Két jól számolt adat esetén 1 pont, ez alatt 0 pont jár.</i>
Az oszlopdiagram:	2 pont	<i>Minden elvileg helyes ábrázolás (pl.: a tengelyek felcserélése, összeérő oszlopok) is elfogadható. A 2 pont a függőleges tengely skálája (1), az egyes oszlopok megfelelő azonosíthatósága (2) és a megfelelő adatok ábrázolása (3) esetén jár. Ha ezek közül csak vala-melyik kettő megfelelő, akkor 1 pont, ez alatt 0 pont jár.</i>
		
Összesen:	4 pont	

14. c) első megoldás		
A kedvező esetek száma: $2 \cdot 4 (= 8).$	1 pont	
Az összes eset száma: $6 \cdot 5 (= 30).$	1 pont	
A kérdéses valószínűség: $P = \frac{8}{30} (= 0,2\bar{6}).$	1 pont	<i>A választ bármilyen helyes kerekítéssel vagy számalékos alakban is el kell fogadni.</i>
Összesen:	3 pont	

18. a)		
A 32 diák közül 7-en választottak két szint, így azok száma, akik csak egyet jelöltek: 25.	1 pont	
$P = \frac{\text{kedvező esetek száma}}{\text{összes eset száma}}$	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
A kérdéses valószínűség: $P = \frac{25}{32} (= 0,78125).$	1 pont	<i>Ez az 1 pont jár az eredmény helyesen kerekített vagy százalékos alakban történő megadása esetén is.</i>
Összesen:	3 pont	

18. b) első megoldás		
A feladatban szereplő halmazok metszetének elemszámát helyesen megjelenítő Venn-diagram:		
	2 pont	
(Az egyes színeket választók számát x-szel jelölve.)		
	2 pont	
$3x - 7 = 32$	2 pont	
$x = 13$	1 pont	
(A fehér szint összesen 13-an választották, ebből $13 - 7 = 6$ diák csak a fehér szint jelölte meg.)	1 pont	
Összesen:	8 pont	

17. a)		
A feladatban szereplő számok egy olyan számtani sorozat tagjai, amelynek első tagja 2, különbsége pedig 3.	1 pont	Ezek a pontok akkor is járnak, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.
A sorozat 25. tagja: $a_{25} = 2 + 24 \cdot 3 = 74$.	1 pont	
Összesen:	3 pont	
<i>Ha a sorozat tagjainak felsorolásával jut helyes eredményre, akkor is jár a 3 pont.</i>		
17. b)		
$S_n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} \cdot n$	1 pont	Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.
Megoldandó (a pozitív egész számok halmazán) a $8475 = \frac{2 \cdot 2 + (n-1) \cdot 3}{2} \cdot n$ egyenlet.	1 pont	
Rendezve a $3n^2 + n - 16950 = 0$ egyenlethez jutunk.	2 pont	
Emek gyökei $n_1 = 75$ és $n_2 = -75,3$.	1 pont	
A feladát (pozitív egész) megoldása: $n = 75$.	1 pont	
Összesen:	6 pont	
<i>Ha a sorozat tagjainak felsorolásával jut helyes eredményre, akkor is jár a 6 pont.</i>		

17. c)		
Az 5-tel osztható és 3-mal osztva 2 maradékot adó pozitív egész számok egy olyan számtani sorozatot alkotnak,	1 pont	Ezek a pontok akkor is járnak, ha ez a gondolat csak a megoldás
melynek különbsége 15.	1 pont	menéből derül ki.
A legkisebb ilyen háromjegyű szám a 110,	2 pont	Nem bontható.
a legnagyobb ilyen háromjegyű szám a 995.	2 pont	Nem bontható.
$995 = 110 + (n-1) \cdot 15$	1 pont	Ha n -re
$n = 60$, a sorozatnak 60 darab (háromjegyű, 5-tel osztható) tagja van.	1 pont	$a \frac{995 - 110}{15} = 59$ értéket fogadja el, akkor ez a 2 pont nem jár.
Összesen:	8 pont	

Ha a sorozat tagjainak felsorolásával jut helyes eredményre, akkor is jár a 8 pont.

14. c) második megoldás		
Annak valószínűsége, hogy legfelül 83 pontos dolgozat fekszik: $\frac{2}{6}$.	1 pont	
Annak valószínűsége, hogy alatta 76 pontos dolgozat fekszik: $\frac{4}{5}$.	1 pont	
A kérdéses valószínűség: $P = \left(\frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} \right) = \frac{8}{30} (= 0,2\bar{6})$.	1 pont	A válasz bármilyen helyes kerekítéssel vagy számalékos alakban is el kell fogadni.
Összesen:	3 pont	
15. a)		
A kérdéses távolság: $d_{AB} = \sqrt{(8-12)^2 + (9-1)^2} =$	1 pont	A képletért (behelyettesítés nélkül) Ha a pontos érték nem
$= \sqrt{80} (\approx 8,944)$ (egység).	1 pont	szerepel és rosszul kerekít a vizsgázó, akkor a második pont nem jár.
Összesen:	2 pont	
15. b)		
Az egyenes egy normálvektora az $\mathbf{n}_e(4;3)$ vektor.	1 pont	
Ezzel az egyenes egyenlete: $4x + 3y = 4 \cdot 4 + 3 \cdot 3,$ azaz $4x + 3y = 25$.	1 pont	
Összesen:	3 pont	
15. c)		
Az f egyenes egy irányvektora az $\overline{AB}(4;-8)$ vektor.	1 pont	
Ezzel az egyenes egyenlete: $-8x - 4y = (-8) \cdot 8 - 4 \cdot 9.$	1 pont	
Az f egyenes egyenlete: $2x + y = 25$.	1 pont	
(A metszéspont koordinátáit a következő egyenletrendszer megoldása adja:) $\begin{cases} 4x + 3y = 25 \\ 2x + y = 25 \end{cases}$	1 pont	Ha a vizsgázó a metszéspont koordinátáit a helyes grafikonról jól olvassa le, akkor 1 pontot kap. Ha mindkét egyenes egyenletébe történt behelyettesítéssel ezeket ellenőrizi is, akkor mind a 4 pont jár.
Az egyenletrendszer megoldása: $x = 25$ és $y = -25$.	2 pont	
A metszéspont: $M(25;-25)$.	1 pont	
Összesen:	7 pont	

II. B

16. a)		
A feladat megértését (a kúp magassága 6 méter) tükröző jó ábra.		1 pont
A henger térfogata: $V_h = 18^2 \cdot 4 \cdot \pi \approx 4071,5 \text{ (m}^3\text{)}.$		1 pont
A kúp térfogata: $V_k = \frac{1}{3} \cdot 18^2 \cdot 6 \cdot \pi \approx 2035,8 \text{ (m}^3\text{)}.$		1 pont
$\frac{V_h + V_k}{6} \left(= \frac{4071,5 + 2035,8}{6} \approx 1017,9 \right)$		1 pont*
Ebben a sátorban a maximális nézőszám 1017.		1 pont*
Összesen:	7 pont	
<i>A *-gal jelölt 2 pont jár, ha a vizsgázó a henger térfogatát 4072 m³-re, a kúp térfogatát 2036 m³-re kerekítve a maximális nézőszámot 1018-ban határozza meg.</i>		

16. b) első megoldás		
Az eladott gyerekjegyek számát jelölje x, ekkor a felnőttjegyek száma 1000 – x .	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
A gyerekjegy 800 · 0,75 = 600 Ft-ba kerül.	1 pont	
600x + 800 · (1000 – x) = 665 800	1 pont	
Az egyenlet megoldása: x = 671 .	1 pont	
671 gyerekjegyet és 329 felnőttjegyet adtak el.	1 pont	
Szöveg szerinti ellenőrzés.	1 pont	
Összesen:	6 pont	

16. b) második megoldás

Az eladott gyerekjegyek számát megkapjuk, ha az 1000 db felnőttjegyből származó lehetséges bevétel és a tényleges bevétel különbségét elosztjuk a gyerekjegyre adott kedvezménnyel.	2 pont	<i>Ez a 2 pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
A gyerekjegyre 800 · 0,25 = 200 Ft kedvezményt adnak.	1 pont	
$\frac{800\,000 - 665\,800}{200} = 671$	2 pont	
671 gyerekjegyet és 329 felnőttjegyet adtak el.	1 pont	
Összesen:	6 pont	

16. c)		
A legalsó szinten álló 4 artista 4!(= 24) féléleképpen állhat egymás mellett,	1 pont	
a rajtuk álló 3 artista 3!(= 6) ,	1 pont	
a felettük álló 2 artista 2-féléleképpen állhat.	1 pont	
Az összes lehetőség(et ezek szorzata adja): 4! · 3! · 2!(= 288) .	1 pont	
Összesen:	4 pont	