

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. október 13.

MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

**EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA**

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

1. Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal, olvashatóan** javítsa ki.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerüljön.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetése mellett kipipálással jelezze, hogy az adott gondolati egységet látta, és jónak minősítette.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy a **hiba jelzése** mellett az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy fölösleges.
5. A javítás során **alkalmazza az alábbi jelöléseket.**
 - helyes lépés: *kipipálás*
 - elvi hiba: *kétszeres aláhúzás*
 - számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: *egyszeres aláhúzás*
 - rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: *szaggatott vagy áthúzott kipipálás*
 - hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: *hiányel*
 - nem érthető rész: *kérdőjel* és/vagy *hullámvonal*
6. Az ábrán kívül **ceruzával** írt részeket ne értékelje.

Tartalmi kérések:

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók, hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel – mint kiinduló adattal – helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdésekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
5. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.

6. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem.
7. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
8. Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám **nem lehet negatív**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. Az **ábrák** bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása méréssel) nem elfogadható.
11. **Valószínűségek** megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a százalékban megadott helyes válasz is elfogadható.
12. Ha egy feladat szövege nem ír elő kerekítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadott eltérő, **ésszerű és helyes kerekítésekkel** kapott rész- és végeredmény is elfogadható.
13. **A vizsgafeladatsor II. B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető**. A vizsgázó az erre a célla szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.

Figyelem! Az útmutató elején olvasható **Fontos tudnivalók** című rész 2015 májusában lényegesen megváltozott. Kérjük, hogy a javítás megkezdése előtt figyelmesen tanulmányozza!

I.

1.		
$x_1 = -3$	1 pont	
$x_2 = 7$	1 pont	
Összesen:	2 pont	

2. első megoldás		
A 104° -os külső szög melletti belső szög 76° .	1 pont	
A C csúcsnál lévő belső szög nagysága $180^\circ - (76^\circ + 74^\circ) = 30^\circ$,	1 pont	
az ehhez tartozó külső szög 150° .	1 pont	
Összesen:	3 pont	

2. második megoldás		
A 104° -os külső szög melletti belső szög 76° .	1 pont	
A C csúcsnál lévő külső szög nagysága a másik két csúcsnál lévő belső szög összegével egyenlő,	1 pont	
vagyis 150° .	1 pont	
Összesen:	3 pont	

2. harmadik megoldás		
A 74° -os belső szög melletti külső szög 106° .	1 pont	
A háromszög külső szögeinek összege 360° ,	1 pont	
ezért a C csúcsnál lévő külső szög nagysága $(360^\circ - 104^\circ - 106^\circ) = 150^\circ$.	1 pont	
Összesen:	3 pont	

3.		
[0; 2]	2 pont	Más helyes jelölés is elfogadható.
Összesen:	2 pont	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó válasza nyílt vagy félgy nyílt intervallum, de az intervallum határait jól adja meg, akkor 1 pontot kapjon.

4.		
h	2 pont	Nem bontható.
Összesen:	2 pont	

5.

$A = \{1; 2; 4; 7; 14; 28\}$	1 pont	
$B = \{1; 7; 49\}$		
$A \cap B = \{1; 7\}$	1 pont	
$B \setminus A = \{49\}$	1 pont	
Összesen:	3 pont	

6.

10	2 pont	
Összesen:	2 pont	

Megjegyzés: A kételemű részhalmazok helyes felsorolása 1 pontot ér.

7.

A) igaz	2 pont	2 jó válasz esetén 1 pont, 1 jó válasz esetén 0 pont jár.
C) igaz		
Összesen:	2 pont	

8.

$x_1 = 4$	1 pont	
$x_2 = -8$	1 pont	
Összesen:	2 pont	

9.

Terjedelem: 6	1 pont	
Átlag: 3	1 pont	
Szórás: 2	2 pont	
Összesen:	4 pont	

Megjegyzés: A szórás képletébe való jó behelyettesítésért vagy a szórásnégyzet meghatározásáért 1 pont jár.

10.

Az összes eset száma 25.	1 pont	
Ezek között 12 darab néggyel osztható van (kedvező esetek száma).	1 pont	
Így a kérdéses valószínűség $\frac{12}{25} = 0,48$.	1 pont	
Összesen:	3 pont	

11. első megoldás		
A bruttó ár a nettó ár 1,27-szorosa.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
A termék nettó ára $\frac{6350}{1,27} = 5000$ (Ft),	1 pont	
így az áfa $(6350 - 5000) = 1350$ Ft.	1 pont	
Összesen:	3 pont	

11. második megoldás		
Az áfa $\frac{6350}{127} \cdot 27 =$	2 pont	
$= 1350$ Ft.	1 pont	
Összesen:	3 pont	

12.		
Flóra mostanáig 2 mérkőzését játszotta le.	2 pont	
Összesen:	2 pont	

II. A**13. a) első megoldás**

$18 - 32 = -14$	1 pont	$32 + 2d = 18$
-----------------	--------	----------------

Így a differencia -7 .	1 pont	
--------------------------	--------	--

$a = 25$	1 pont	
----------	--------	--

Összesen:	3 pont	
------------------	---------------	--

13. a) második megoldás

$a = \frac{18+32}{2} =$	1 pont	
-------------------------	--------	--

$= 25$	1 pont	
--------	--------	--

A differencia -7 .	1 pont	
----------------------	--------	--

Összesen:	3 pont	
------------------	---------------	--

13. b)

A hányadost q -val jelölve $q^2 = \frac{18}{32}$.	1 pont	$b^2 = 32 \cdot 18 = 576$
--	--------	---------------------------

Ebből $q_1 = \frac{3}{4}$,	1 pont	
-----------------------------	--------	--

és $b_1 = 24$,	1 pont	
-----------------	--------	--

vagy $q_2 = -\frac{3}{4}$,	1 pont	
-----------------------------	--------	--

és $b_2 = -24$.	1 pont	
------------------	--------	--

Összesen:	5 pont	
------------------	---------------	--

13. c)

A három szám mediánja c ,	1 pont	<i>Ez a 2 pont akkor is jár, ha ezek a gondolatok csak a megoldásból derülnek ki.</i>
-----------------------------	--------	---

átlagá $\frac{32+c+18}{3}$.	1 pont	
------------------------------	--------	--

Ezek alapján $\frac{32+c+18}{3} = c - 2$,	1 pont	
--	--------	--

azaz $50 + c = 3c - 6$,	1 pont	
--------------------------	--------	--

amiből $c = 28$ (ami valóban a három szám mediánja).	1 pont	
--	--------	--

Összesen:	5 pont	
------------------	---------------	--

14. a)

Péter 30 mérkőzésből 25-öt megnyert.	1 pont	
--------------------------------------	--------	--

Így a vívással szerzett pontjainak száma:	1 pont	
---	--------	--

$250 + 4 \cdot 7 =$	1 pont	
---------------------	--------	--

$= 278$.	1 pont	
-----------	--------	--

Összesen:	3 pont	
------------------	---------------	--

14. b)

$250 - 215 = 35$	1 pont	
Bencének ($35 : 7 =$) 5 győzelem hiányzik a 21-hez,	1 pont	
így összesen 16 győzelmet ért el.	1 pont	
Összesen:	3 pont	

14. c)

C	1 pont	
C	1 pont	
Összesen:	2 pont	

14. d)

Az A típusú akadályok lehetséges sorrendjeinek a száma $5!$, ugyanez a B típusúaknál $4!$, a C típusúaknál $3!$.	2 pont	
A 12 akadály lehetséges sorrendjeinek a száma ezek szorzata,	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
azaz $17\ 280$.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

15. a)


Az A csúcsnál lévő szöget α -val jelölve: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{8}{6}$.	1 pont	
Ebből $\alpha \approx 53,13^\circ$.	1 pont	
(A B csúcsnál lévő β szög az α -t 90° -ra egészíti ki, így) $\beta \approx 36,87^\circ$.	1 pont	
Összesen:	3 pont	

15. b)

A DF befogó hosszát (cm-ben) jelölje x , ekkor $DE = x - 7$, $EF = x + 2$.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
A Pitagorasz-tétel szerint $x^2 + (x - 7)^2 = (x + 2)^2$.	1 pont	
A zárójeleket felbontva: $x^2 + x^2 - 14x + 49 = x^2 + 4x + 4$.	1 pont	
Rendezve: $x^2 - 18x + 45 = 0$.	1 pont	
Az egyenlet egyik gyöke $x = 3$,	1 pont	
de ez a feladatnak nem megoldása, mert ekkor a másik befogó hosszára negatív érték adódik.	1 pont	
Az egyenlet másik gyöke $x = 15$,	1 pont	
így a háromszög oldalainak hossza: $DE = 8$ cm, $DF = 15$ cm, $EF = 17$ cm.	1 pont	
Összesen:	8 pont	

II. B**16. a)**

Ábra az $\vec{AB} + \vec{AC}$ vektor feltüntetésével.



1 pont

Az $\vec{AB} + \vec{AC}$ és az \vec{AB} vektorok egy olyan egyenlő szárú háromszög két oldalát határozzák meg, amelynek egyik szöge 60° -os, így a háromszög szabályos.

1 pont

Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.


Az összegvektor hossza ezért 5 egység.

1 pont

Összesen: **3 pont**

16. b) első megoldás

Ábra az $\vec{AB} - \vec{AC}$ vektor feltüntetésével.



1 pont

A különbségvektor hossza egy 5 egység oldalú szabályos háromszög magasságának kétszerese,

1 pont

Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.

azaz $2 \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx$

1 pont


$\approx 8,66$ egység.

1 pont

Összesen: **4 pont**

16. b) második megoldás

Ábra az $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ vektor feltüntetésével.



1 pont

A koszinusz-tétel alkalmazásával:

1 pont

Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.

$$|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}| = \sqrt{5^2 + 5^2 - 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot \cos 120^\circ} \approx$$

1 pont

$$\approx 8,66 \text{ egység.}$$

1 pont

Összesen: 4 pont

16. c)

(A rombusz átlói felezve metszik egymást a K pontban, így a K pont a TR átló felezőpontja.)

Az $R(x_R; y_R)$ koordinátáira:

1 pont

$$\frac{7+x_R}{2} = 4, \text{ illetve } \frac{1+y_R}{2} = -3.$$

Ebből $x_R = 1$ és $y_R = -7$, azaz $R(1; -7)$.

1 pont

$$\overrightarrow{KT}(3; 4).$$

1 pont*

Ezt 90° -kal elforgatva kapjuk a $(-4; 3)$ vektort.

2 pont*

Ennek kétszerese a $\overrightarrow{KP} (-8; 6)$ vektor,

1 pont*

melynek ellentettje a $\overrightarrow{KS} (8; -6)$ vektor.

1 pont*

A K pont koordinátáihoz adva ezeknek a vektoroknak a megfelelő koordinátáit, kapjuk a hiányzó csúcsok koordinátáit.

1 pont*

Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.

Ebből $P(-4; 3)$

1 pont

és $S(12; -9)$.


1 pont

Összesen: 10 pont

*A *-gal jelölt 6 pontot az alábbi gondolatmenetért is megkaphatja a vizsgázó:*

A rombusz rövidebb átlójának a fele $d_{KT} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ egység hosszú.	1 pont	
A K középpontú 10 egység sugarú k kör egyenlete: $(x - 4)^2 + (y + 3)^2 = 100$.	1 pont	
A rombusz PS átlójának e egyenese illeszkedik a K pontra, továbbá egy normálvektora a $\vec{KT}(3; 4)$ vektor.	1 pont	
Így e egyenlete: $3x + 4y = 0$.	1 pont	
A k kör és az e egyenes egyenletéből álló egyenletrendszer megoldásai: $x_1 = -4$ és $y_1 = 3$, vagy $x_2 = 12$ és $y_2 = -9$.	1 pont	

Megjegyzés: Ha a vizsgázó a keresett pontok koordinátait (további indoklás nélkül) ábráról leolvasva helyesen adja meg, akkor ezért legfeljebb 4 pontot kapjon.



17. a) első megoldás

$t(0) = 3600$	1 pont	
$t(2) \approx 2626$	1 pont	
$\frac{2626}{3600} \approx 0,73$	1 pont	
A tigrisek száma kb. 27%-kal csökken.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

17. a) második megoldás

A tigrisek száma minden évben az előző évinek 0,854-szeresére változik.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
$0,854^2 \approx$	1 pont	
$\approx 0,73$	1 pont	
A tigrisek száma kb. 27%-kal csökken.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

17. b)


Megoldandó a $3600 \cdot 0,854^x = 900$ egyenlet, (ahol x a 2014 óta eltelt évek számát jelöli.)	1 pont	
$0,854^x = 0,25$	1 pont	
$x = \frac{\lg 0,25}{\lg 0,854} \approx$	1 pont	$x = \log_{0,854} 0,25$
$\approx 8,78$	1 pont	
(9 év múlva, azaz) 2023-ban várható, hogy a tigrisek száma 900 alá csökken.	1 pont	
Összesen:	5 pont	

Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó egyenlet helyett egyenlőtlenséggel dolgozik, akkor a megfelelő pontok járnak.

2. Ha a vizsgázó a tigrisek számát – jó kerekítéssel – évről évre felírja, és így helyes választ ad, akkor maximális pontszámot kap.

17. c)

(I) és (II) miatt a kisebb kifutóba három vagy négy tigris kerülhet.	1 pont	
Ha három tigris kerül a kisebb kifutóba, akkor (III) és (IV) miatt ez csak két nőstény és egy hím lehet.	1 pont	
A két nőstényt és egy hímet $\binom{5}{2} \cdot 4 (= 40)$ -féleképpen lehet kiválasztani (és egy ilyen kiválasztás egyértelműen meghatározza, hogy a nagyobb kifutóba a másik hat tigris kerül).	2 pont	
Ha négy tigris kerül a kisebb kifutóba, akkor (III) és (IV) miatt (figyelembe véve a másik kifutót is) ez csak két nőstény és két hím lehet.	1 pont	
A két nőstényt és a két hímet $\binom{5}{2} \cdot \binom{4}{2} (= 60)$ -féleképpen lehet kiválasztani (és egy ilyen kiválasztás egyértelműen meghatározza, hogy a nagyobb kifutóba a másik öt tigris kerül).	2 pont	
Így összesen $40 + 60 = 100$ -félé eset lehetséges.	1 pont	
Összesen:	8 pont	

18. a)		
Az a oldalhosszúságú szabályos hatszög területét kiszámíthatjuk hat darab a oldalhosszúságú szabályos háromszög területének összegeként.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
A csonkagúla fedőlapjának területe: $t_1 = 6 \cdot \frac{7^2 \cdot \sin 60^\circ}{2} \approx$ $\approx 127,3 \text{ (cm}^2\text{)}.$	1 pont	
A csonkagúla egy oldallapjának magasságát m -mel jelölve:	1 pont	
	1 pont	
A Pitagorasz-tétel alapján $3^2 + m^2 = 8^2$.	1 pont	
$m \approx 7,42 \text{ (cm)}$	1 pont	
Egy oldallap területe $t_2 = \frac{7+13}{2} \cdot 7,42 = 74,2 \text{ (cm}^2\text{)}.$	1 pont	
A teljes felület $F = t_1 + 6 \cdot t_2 = 572,5 \text{ (cm}^2\text{)}.$	1 pont	
$0,93 \text{ m}^2 = 9300 \text{ cm}^2$	1 pont	
$9300 : 572,5 \approx 16,24$	1 pont	
1 kg alapanyagból 16 darab doboz készíthető.	1 pont	
Összesen: 11 pont		

18. b)		
Ha legalább 8 virághagyma kihajt, akkor 10, 9 vagy 8 hajt ki.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
Annak valószínűsége, hogy mind a 10 kihajt: $0,91^{10} (\approx 0,3894).$	1 pont	
Annak valószínűsége, hogy 9 kihajt, de 1 nem: $\binom{10}{9} \cdot 0,91^9 \cdot 0,09 (\approx 0,3851).$	1 pont	
Annak valószínűsége, hogy 8 kihajt, de 2 nem: $\binom{10}{8} \cdot 0,91^8 \cdot 0,09^2 (\approx 0,1714).$	1 pont	
A kérdéses valószínűség ezek összege,	1 pont	
azaz kb. 0,946.	1 pont	<i>Ez a pont nem jár, ha a vizsgázó nem kerekít, vagy rosszul kerekít.</i>
Összesen: 6 pont		

Megjegyzés: Ha a vizsgázó a feladat megoldása során az egyes valószínűségek három tizedesjegyre kerekített értékével jól számol, akkor 0,945 is elfogadható.