

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 7.

MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

- 1. Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal, olvashatóan** javítsa ki.
- 2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerüljön.
- 3. **Kifogástalan megoldás** esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetése mellett kipipálással jelezze, hogy az adott gondolati egységet látta, és jónak minősítette.
- 4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy a **hiba jelzése** mellett az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy fölösleges.
- 5. A javítás során **alkalmazza az alábbi jelöléseket**.
 - helyes lépés: *kipipálás*
 - elvi hiba: *kétszeres aláhúzás*
 - számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: *egyszeres aláhúzás*
 - rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: *szaggatott* vagy *áthúzott kipipálás*
 - hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: *hiányjel*
 - nem érthető rész: *kérdőjel* és/vagy *hullámvonal*
- 6. Az ábrán kívül **ceruzával** írt részeket ne értékelje.

Tartalmi kérések:

- 1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadjuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenerértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
- 2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók, ha csak az útmutató másképp nem rendelkezik**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
- 3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
- 4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel – mint kiinduló adattal – helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdésekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
- 5. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.

18. c) első megoldás	
Öt fő $5! = 120$ -féle sorrendben érkezhethet meg (összes eset száma).	1 pont
Ha legfeljebb egy lánynak kell fiúra vámia, akkor a két fiú vagy az első két érkező, vagy az első és a harmadik, vagy a második és a harmadik érkező lehet.	2 pont
A fiúk minden ilyen esetben 2-féle sorrendben érkezhetnek, a lányok érkezési sorrendje pedig $3! = 6$ -féle lehet.	1 pont
Összesen $(3 \cdot 2 \cdot 6 =) 36$ kedvező eset van.	1 pont
A kérdéses valószínűség $\frac{36}{120} = 0,3$.	1 pont
Összesen:	6 pont

18. c) második megoldás	
Ha csak a nemeket különböztetjük meg egymástól,	1 pont
akkor a két fiú és a három lány összesen $\binom{5}{2} = 10$ -féle sorrendben érkezhethet meg.	2 pont
Ezek közül a feladatban szereplő feltétel szempontjából három érkezési sorrend kedvező: FFLLL, FLFLL, LFFLL.	2 pont
A kérdéses valószínűség $\frac{3}{10} = 0,3$.	1 pont
Összesen:	6 pont


18. d)	
A felső görbe két félkörívének (sugara 12 cm, így) hossza összesen: $2 \cdot (0,5 \cdot 2 \cdot 12 \cdot \pi) = 24\pi$.	1 pont
Ha az alsó görbénél az egyik félkör sugara r , akkor a másik félkör sugara $24 - r$.	1 pont
Az alsó görbe két félkörívének hossza összesen: $r\pi + (24 - r)\pi = 24\pi$, így Dezsőnek igaza van.	1 pont
Összesen:	5 pont

Megjegyzés: Ha a vizsgázó az alapján válaszol, hogy az alsó görbe félkörjeinek sugarára egy-egy konkrét értéket helyettesít be, akkor legfeljebb 3 pontot kapjon.

A szirmok körüli tartomány ekkor csak sárga lehet, a külső tartomány pedig kék vagy zöld. Ez szintén 2 lehetőség.	1 pont 1 pont
Mivel a középső tartomány színe nemcsak sárga, hanem kék vagy zöld is lehet (3 lehetőség), így a lehetséges színezések száma $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$.	1 pont 1 pont
Összesen:	6 pont

Megjegyzés: Ha a vizsgázó szisztematikusan felsorolja az összes lehetséges színezést, és ez alapján helyesen válaszol, akkor teljes pontszámot kapjon.

17. c)		
Annak a valószínűsége, hogy Anna mind az öt nap szénsavmentes vizet kap: $0,8^5 \approx 0,328$.	1 pont	
Annak a valószínűsége, hogy valaki szénsavmentes vizet kér, de szénsavasat kap, 0,2.	1 pont	Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a meg- oldásból derül ki.
Annak a valószínűsége, hogy Anna pontosan négy napon kap szénsavmentes vizet: $\binom{5}{1} \cdot 0,8^4 \cdot 0,2 \approx 0,410$.	2 pont	
A kérdéses valószínűség kb. $(0,328 + 0,410 \Rightarrow) 0,738$.	1 pont	
Összesen:	5 pont	

18. b)		
Megfelelő gráf felrajzolása.		Egy vagy két hiba esetén 1 pont, több hiba esetén 0 pont jár.
Összesen:	2 pont	

18. b)		
A januárban eladott teljes árú jegyek számát jelölje x , ekkor a feladat szövege alapján: $4 \cdot x \cdot 250 + x \cdot 400 + 0,125 \cdot x \cdot 500 = 912\,600$.	2 pont	
Ebből $x = 624$ (teljes árú jegyet adtak el).	1 pont	
Összesen $2496 + 624 + 78 = 3198$ jegyet adtak el.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

6. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem.

7. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrésze előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.

8. Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám **nem lehet negatív**.

9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használt fel.

10. A gondolatmenet kifejtése során **a zsebszámológép használata – további matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el**: összeadás,

kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, $n!$, $\left(\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix}\right)$ kiszámítása, a függvénytáblázatban fellelhető táblázatok helyettesítése ($\sin$, $\cos$, $\lg$, $\log$ és ezek inverzeit), a π és az e szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek bizonyos statisztikai mutatók kiszámítására (átlag, szórás) abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. **Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, azokért nem jár pont.**

11. Az **ábrák** bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása mérésel) nem elfogadható.

12. **Valószínűségek** megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a százalékban megadott helyes válasz is elfogadható.

13. Ha egy feladat szövege nem ír elő kerekítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadottól eltérő, **észszerű és helyes kerekítésekkel** kapott rész- és végeredmény is elfogadható.

14. **A vizsgafeladatsor II. B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető**. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozathól sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.

I.

1.	$x_1 = -2; x_2 = 4$	2 pont	2 pont
Összesen:		2 pont	
2.	30°	2 pont	
Összesen:		2 pont	
3.	40 g	2 pont	
Összesen:		2 pont	
4.	$C \setminus A = \{1; 8\}$ $(A \cup B) \cap C = \{1; 2; 3; 5; 13\}$	1 pont 2 pont	
Összesen:		3 pont	
5.	14	2 pont	
Összesen:		2 pont	
6.	$(3 \cdot 3 \cdot 2 =) 18$	2 pont	
Összesen:		2 pont	
7.	$\overline{AD} = 2b + 2f$	2 pont	
Összesen:		2 pont	
8.	1458, 1848	2 pont	Egy jó, vagy két jó és egy rossz válasz esetén 1 pont jár, minden más esetben 0 pont jár.
Összesen:		2 pont	
9.	$\sin \alpha = \frac{0,6}{3}$ $\alpha \approx 11,5^\circ$	2 pont 1 pont	
Összesen:		3 pont	

16. d) első megoldás

1 típust 5-féleképpen, 4 típust szintén 5-féleképpen választhat ki a grafikus.	
2 típust $\left(\binom{5}{2} = 10\right)$ -féleképpen, 3 típust szintén 10-féleképpen választhat ki.	3 pont
5 típust 1-féleképpen választhat ki.	
Összesen $(5 + 5 + 10 + 10 + 1 =) 31$ -féleképpen alakulhat a reklámfüzet fedőlapja a megjelenített típusok szempontjából.	1 pont
Összesen: 4 pont	

16. d) második megoldás

Mind az öt típus esetén két választási lehetőség van (szerepel vagy nem szerepel a fedőlapon). Ez összesen $2^5 (= 32)$ lehetőséget jelent.	2 pont
Nem megfelelő az a kiválasztás, melyben egy típus sines kiválasztva, tehát $32 - 1 = 31$ -féleképpen alakulhat a reklámfüzet fedőlapja a megjelenített típusok szempontjából.	1 pont
Összesen: 4 pont	

17. a)

A Föld folyékony állapotú édesvízkészlete a teljes vízkészlet $(0,03 \cdot 0,2 =) 0,006$ -szerese, azaz $1\,400\,000\,000 \cdot 0,006 = 8\,400\,000 \text{ (km}^3\text{)}$.	2 pont
A kérdéses gömb térfogatára $\frac{4}{3}r^3\pi = 8\,400\,000$,	1 pont
azaz (a kért kerekítéssel) $r = \sqrt[3]{\frac{6\,300\,000}{\pi}} \approx 126 \text{ (km)}$ lenne ennek a gömbnek a sugara.	2 pont*
Ha a vizsgázó nem kerekít, vagy rosszul kerekít, akkor legfeljebb 1 pont jár.	
Összesen: 6 pont	


Megjegyzés: Ha (arra hivatkozva, hogy a 126 km sugarú gömbbe még nem fér bele a Föld folyékony édesvízkészlete) a vizsgázó válasza $r = 127 \text{ km}$, akkor a *-gal jelölt 2 pont jár.

17. b)

Ha a középső, kör alakú tartomány pl. sárga színű, akkor a hat szíromforma egyike sem lehet sárga.	1 pont
Ekkor a szírmok váltakozva lehetnek kék, illetve zöld színűek, ami 2-féleképpen valósulhat meg.	1 pont
Ha az egyik szírom kék (illetve zöld), akkor ez meghatározza a többi szírom színét.	

II. B

16. a)	1 pont
4 év = 48 hónap	
(Az egyes hónapokban félretett összegek egy számtani sorozat egymást követő tagjai, az első tag 50 000, a differencia 1000, így) 48 hónap alatt $S_{48} = \frac{50\,000 + 50\,000 + 47 \cdot 1000}{2} \cdot 48 =$	
= 3 528 000 Ft-ot gyűjt összesen.	1 pont
Tehát 4 év elegendő 3,5 millió Ft összeggyűjtésére.	1 pont
Összesen:	5 pont

16. b)	
	3 pont
Összesen:	3 pont

16. c)	
A modell alapján: $0,122 \cdot 2^{0,822x} = 25$.	1 pont
$2^{0,822x} = \frac{25}{0,122} (\approx 204,9)$	1 pont
$0,822x \cdot \lg 2 = \lg 204,9$	1 pont
$x \approx 9,34$	1 pont
A modell szerint az elektromos autók száma $(2012 + 10 =)$ 2022-ben éri el a 25 milliót.	1 pont
Összesen:	5 pont

Megjegyzések:

1. Ha a vizsgáló a modell alapján az egyes években gyártott autók számát helyes keretítésekkel kiszámítja, és ez alapján helyesen választ, akkor teljes pontszámot kapjon.

2. Ha a vizsgáló hivatkozik f szigorú monoton növekedésére, valamint helyesen kiszámolja $f(9)$ és $f(10)$ értékét, és ez alapján helyesen választ, akkor teljes pontszámot kapjon.

10.	
a) például $(2; -1)$	1 pont
b) $2x - y = 3$	2 pont
Összesen:	3 pont

11.	
A sorozat hányadosa $q = -2$.	1 pont
A sorozat első tagja $a_1 = -3$.	1 pont
Az első tíz tag összege $S_{10} = -3 \cdot \frac{(-2)^{10} - 1}{(-2) - 1} =$ $= 1023$.	1 pont
Összesen:	4 pont

12.	
Módusz: 5 (jeles)	1 pont
Medián: 4 (jó)	2 pont
Összesen:	3 pont

II. A


13. a)	
$4x + \frac{2x}{12} \geq \frac{3x}{12} + 230$	1 pont
$3x \geq 230$	1 pont
$x \geq 920$	1 pont
80 ilyen háromjegyű szám van.	1 pont
Összesen:	4 pont


13. b)	
$3 \cdot 4^x + 4 \cdot 4^x = 896$	1 pont
$7 \cdot 4^x = 896$	1 pont
$4^x = 128$	1 pont
$2^{2x} = 2^7$	1 pont
$x = \log_4 128$	
(Mivel a 2-es alapú exponenciális függvény kölcsönösen egyértelmű, ezért) $x = 3,5$.	1 pont
Ellenőrzés behelyettesítéssel vagy ekvivalens átalakításokra való hivatkozással.	1 pont
Összesen:	6 pont

14. a)		
$(x+1)(x+3)$	2 pont	
Összesen:	2 pont	


14. b)		
$y = (-6,5)^2 + 4 \cdot (-6,5) + 3 =$	1 pont	$y = (-6,5 + 1)(-6,5 + 3) =$
$= 19,25$	1 pont	
Összesen:	2 pont	


14. c)		
D	1 pont	
Az értékkészlet: $[-1; \infty[$.	2 pont	<i>Más helyes jelölés is elfogadható.</i>
Összesen:	3 pont	

14. d)		
A g értéke 0-ban 5, így az y tengelyt az A(0; 5) pontban metszi a g grafikonja.	2 pont	<i>Ezek a pontok akkor is járnak, ha a vizsgáló egy helyesen felrajzolt grafikonról olvassa le a megfelelő értékeket.</i>
Az $x^2 - 6x + 5 = 0$ egyenlet megoldásai $x_1 = 1$ és $x_2 = 5$,	2 pont	
így az x tengelyt a B(1; 0) és a C(5; 0) pontokban metszi a g grafikonja.	1 pont	
Az ABC háromszög (BC oldala 4 egység, a hozzá tartozó magasság 5 egység hosszú, így) területe $\frac{4 \cdot 5}{2} = 10$ (területegység).	2 pont	
Összesen:	7 pont	

15. a) első megoldás		
A BCE háromszög szabályos, ezért $\angle CBE = 60^\circ$.	1 pont	
Az ABE (egyenlő szárú) háromszögben tehát $\angle ABE = (90^\circ - 60^\circ =) 30^\circ$.	1 pont	

(Az AE szakasz hosszát koszinusztétellel számolva:) $AE^2 = 12^2 + 12^2 - 2 \cdot 12 \cdot 12 \cdot \cos 30^\circ \approx 38,58$.	2 pont	$\frac{AE}{\sin 15^\circ} = \frac{2}{12}$
$AE \approx 6,21$	1 pont	
Összesen:	5 pont	

15. a) második megoldás		
(BCE egyenlő oldalú háromszögben az ET magasság hossza Pitagorasz-tétellel:) $ET = \sqrt{12^2 - 6^2} = \sqrt{108}$.	2 pont	
(ET egyenese az AD oldalt az F felezőpontban metszi.) $EF = 12 - \sqrt{108} \approx 1,61$	1 pont	
(Az AEF derékszögű háromszögben felírva a Pitagorasz-tételt: $AE = \sqrt{6^2 + 1,61^2} \approx 6,21$.)	2 pont	
Összesen:	5 pont	

15. b)		
A feladat megértését tükröző ábra.	1 pont	
A gúla oldallapjának magassága Pitagorasz-tétellel: $m = \sqrt{10^2 - 5^2} = \sqrt{75} (\approx 8,66)$ (cm).	1 pont	<i>Az alaplappal átlója $10\sqrt{2}$ (cm), ennek fele $5\sqrt{2}$ (cm).</i>
A gúla magassága Pitagorasz-tétellel: $m' = \sqrt{(\sqrt{75})^2 - 5^2} = \sqrt{50} (\approx 7,07)$ (cm).	1 pont	$m' = \sqrt{10^2 - (5\sqrt{2})^2} = \sqrt{50}$
A gúla térfogata: $V = \frac{10^2 \cdot \sqrt{50}}{3} \approx 235,7$ cm ³ .	1 pont	
Mivel 1 dm ³ = 1000 cm ³ ,	1 pont	
így a gúla tömege $8 \cdot 0,2357 \approx 1,89$ kg.	1 pont	$8 \text{ kg/dm}^3 = 8 \text{ g/cm}^3$, <i>így a gúla tömege</i> $8 \cdot 235,7 \approx 1886 \text{ g}$.
Összesen:	7 pont	