

18. c) első megoldás		
Ha négy színnel színezzünk, akkor $4! = 24$ lehetőségünk van.	1 pont	
Ha három színnel színezzünk, akkor 4-féleképpen választhatjuk ki a színeket. (Legyen például a kiválasztott három szín a piros, a sárga és a kék.)	1 pont	
Az A jelű tartományt 3-féle színnel színezhettük, a B színezésére két szín közül választhatunk. (Legyen például az A piros és a B sárga.)	1 pont	<i>A három szín közül valamilyet kétszer használjuk, ez 3 lehetőség. Ez a két egyszínű mező csak szemközti lehet, ez 2-féle lehetőség.</i>
Ekkor a C és a D tartományt 2-féleképpen színezhettük ki (ha a C piros, akkor a D kék; ha a C kék, akkor a D csak sárga lehet).	1 pont	<i>A maradék két mező színezése a másik két színnel 2-féleképpen történhet.</i>
Három színnel tehát $4 \cdot 3 \cdot 2 = 48$ -féleképpen színezhettünk.	1 pont	
A lehetséges színezések száma $(24 + 48 =) 72$.	1 pont	
Összesen:	6 pont	

18. c) második megoldás		
Az A tartományt 4-féle, a B tartományt 3-féle színnel színezhettük,	1 pont	
e két tartomány lehetséges színezéseinek száma tehát $4 \cdot 3 = 12$.	1 pont	
(Legyen például A piros és B sárga.) Két lehetőséget vizsgálunk. Ha a D tartomány színe megegyezik a B színével, akkor a C színe 2-féle lehet. (A példában C kék vagy zöld lehet.)	1 pont	
Ha B és D különböző színű, akkor a C és D tartományokat 4-féleképpen színezhettük. (Ha a példában D kék, akkor C színe piros vagy zöld, ha D zöld, akkor C piros vagy kék lehet.)	1 pont	
Az A és B tartományok egy adott színezéséhez tehát a C és D tartományoknak $(2 + 4 =) 6$ -féle színezése tartozik.	1 pont	
A lehetséges színezések száma $12 \cdot 6 = 72$.	1 pont	
Összesen:	6 pont	

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. május 4.

MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

- Kérjük, hogy a dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal, olvashatóan** javítsa ki.
- A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerüljön.
- Kifogástalan megoldás** esetén kérjük, hogy a maximális pontszám feltüntetése mellett kipipálással jelezze, hogy az adott gondolati egységet látta, és jónak minősítette.
- Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy **a hiba jelzése** mellett az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra. Ha a dolgozat javítását jobban követhetővé teszi, akkor a vizsgázó által elvesztett részpontszámok jelzése is elfogadható. Ne maradjon olyan részlet a megoldásban, amelyről a javítás után nem nyilvánvaló, hogy helyes, hibás vagy fölösleges.
- A javítás során **alkalmazza az alábbi jelöléseket**.
 - helyes lépés: *kipipálás*
 - elvi hiba: *kétszeres aláhúzás*
 - számolási hiba vagy más, nem elvi hiba: *egyszeres aláhúzás*
 - rossz kiinduló adattal végzett helyes lépés: *szaggatott vagy áthúzott kipipálás*
 - hiányos indoklás, hiányos felsorolás vagy más hiány: *hiányjel*
 - nem érthető rész: *kérdőjel és/vagy hullámvonal*
- Az ábrán kívül **ceruzával** írt részeket ne értékelje.

Tartalmi kérések:

- Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadjuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
- A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók, ha csak az útmutató másképp nem rendelkezik**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
- Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
- Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel – mint kiinduló adattal – helyesen számol tovább a következő gondolati egységekben vagy részkérdésekben, akkor ezekre a részekre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
- Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység**, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.

17. c)		
A nagyított kép rövidebb oldala ekkor 210 mm lesz,	1 pont	<i>A nagyítás aránya</i> $210 = 2,1 \cdot 100$
így a nagyobb oldal hossza $\frac{3}{2} \cdot 210 = 315$ mm lenne.	1 pont	<i>A nagyobb oldal hossza</i> $2,1 \cdot 150 = 315$ mm lenne.
Így összesen egy $210 \times (315 - 297) = 210 \times 18$ mm méretű rész lemarad a nagyításról.	1 pont	
Ez a teljes nagyított kép területének $\frac{18}{315} \cdot 100 \approx$	1 pont	$\frac{210 \cdot 18}{210 \cdot 315} \cdot 100$
$\approx 5,7\%$ -a (és ez a területarány az eredeti képen is ugyanennyi).	1 pont	
Összesen:	5 pont	

17. d)		
Balázs az 51 képtől $51 \cdot 49 = 2499$ Ft-ot fizetett.	1 pont	
Hajni kevesebb képet rendelt, tehát egy képtől 59 Ft-ot fizet. Így az általa rendelt képek száma legalább $\frac{2499}{59} \approx 42,4$.	1 pont	
Hajni legalább 43, legfeljebb 50 képet rendelhetett.	2 pont	
Összesen:	4 pont	

18. a)		
A kör egyenletét átalakítva: $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 20$,	2 pont	
tehát a kör középpontjának koordinátái valóban $(1; 2)$.	1 pont	
A kör sugara $r = \sqrt{20} (\approx 4,47)$.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

18. b)		
A k kör egyenletébe $x = 3$ -at helyettesítve $y^2 - 4y - 12 = 0$.	1 pont	$(y - 2)^2 = 16$
Ennek pozitív megoldása $y = 6$ (a negatív pedig -2).	2 pont	
(Mivel az A pont illeszkedik a k körre, és az érintő merőleges az érintési pontba húzott sugárra, ezért) a kör középpontját K -val jelölve az érintőegyenes egyik normálvektora: $\overrightarrow{KA} (2; 4)$.	2 pont	
Az érintőegyenes egyenlete $2x + 4y = 30$.	2 pont	$x + 2y = 15$
Összesen:	7 pont	

17. a) első megoldás	
Jelölje h a papír vastagságát (cm-ben mérve), ekkor egy lap térfogata (cm ³ -ben mérve) $V = 21 \cdot 29,7 \cdot h$.	1 pont
A sűrűség a tömeg és a térfogat hányadosa: $0,8 = \frac{5}{V} = \frac{5}{21 \cdot 29,7 \cdot h}$,	1 pont
ahonnan $h = \frac{5}{21 \cdot 29,7 \cdot 0,8} \approx 0,010$ cm,	1 pont
azaz kb. 0,1 milliméter.	1 pont
Összesen:	4 pont


17. a) második megoldás	
Egy lap térfogata a tömeg és a sűrűség hányadosa: $V = \frac{5}{0,8} = 6,25$ (cm ³).	1 pont
Jelölje h a papír vastagságát (cm-ben mérve), ekkor egy lap térfogatára $6,25 = 21 \cdot 29,7 \cdot h$.	1 pont
ahonnan $h = \frac{6,25}{21 \cdot 29,7} \approx 0,010$ cm,	1 pont
azaz kb. 0,1 milliméter.	1 pont
Összesen:	4 pont

17. b)	
A nagyított kép hosszabb oldala ekkor 297 mm lesz,	1 pont
$A \text{ nagyítás aránya}$ $\frac{297}{150} = 1,98$.	
így a rövidebb oldal hossza $\frac{2}{3} \cdot 297 = 198$ mm.	1 pont
Azaz a (hosszabbik oldallal párhuzamosan) keletkező csíkok szélessége: $\frac{210 - 198}{2} = 6$ mm.	2 pont
Összesen:	4 pont

6. Egy feladatra adott többféle megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**. A javítás során egyértelműen jelezze, hogy melyik változatot értékelte, és melyiket nem.
7. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrésze előírt maximális pontszámot meghaladó pont) **nem adható**.
8. Egy feladatra vagy részfeladatra adott összpontszám **nem lehet negatív**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó teljesen nem használ fel.
10. A gondolatmenet kifejtése során **a zsebszámológép használata – további matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el**: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, $n!$, $\binom{n}{k}$ kiszámítása, a függvénytáblázatban fellelhető táblázatok helyettesítése ($\sin$, $\cos$, $\lg$, $\log$ és ezek inverzei), a π és az e szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek bizonyos statisztikai mutatók kiszámítására (átlag, szórás) abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. **Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, azokért nem jár pont**.
11. Az **ábrák** bizonyító erejű felhasználása (például adatok leolvasása méréssel) nem elfogadható.
12. **Valószínűségek** megadásánál (ha a feladat szövege másképp nem rendelkezik) a százalékban megadott helyes válasz is elfogadható.
13. Ha egy feladat szövege nem ír elő keretítési kötelezettséget, akkor az útmutatóban megadottól eltérő, **észszerű és helyes kerekítésekkel** kapott rész- és végeredmény is elfogadható.
14. **A vizsgafeladatsor II. B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető**. A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha a vizsgázó nem jelölte meg, hogy melyik feladat értékelését nem kéri, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat lesz.

I.

1.		
$y = 79$	2 pont	
Összesen:	2 pont	
2.		
A lapok száma 6,	1 pont	
az élek száma 12,	1 pont	
a csúcsok száma 8.	1 pont	
Összesen:	3 pont	
3.		
$(9 \cdot 5 =) 45$	2 pont	
Összesen:	2 pont	
4.		
$\left(\frac{6}{4} \cdot 7 =\right) 10,5$ (dl)	2 pont	
Összesen:	2 pont	
5.		
x ($= 0 + 1 + 2 + \dots + 8$) $= 36$	2 pont	
Összesen:	2 pont	
6.		
$(\sqrt{25^2 - 24^2} =) 7$ (méter)	2 pont	
Összesen:	2 pont	
7.		
A sorozat differenciája $(3,5 - 2 =) 1,5$.	1 pont	
Megoldandó $2 + (n - 1) \cdot 1,5 = 80$ egyenlet.	1 pont	
Ebből $n - 1 = 52$,	1 pont	
azaz a 80 a sorozat 53. tagja.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

16. b)		
	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgáló ábra nélkül helyesen dolgozik.</i>
$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{40}{110} \approx 0,3636$	1 pont	
Ebből $\frac{\alpha}{2} \approx 20^\circ$,	1 pont	
azaz a kúp nyílásszöge kb. 40° .	1 pont	
Összesen:	4 pont	
16. c)		
Annak a valószínűsége, hogy egy tartály hibátlan: 0,92.	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
Annak valószínűsége, hogy mind a 10 tartály hibátlan: $0,92^{10} \approx 0,434$.	1 pont	
Annak a valószínűsége, hogy a 10 tartály közül pontosan 1 hibás: $\binom{10}{1} \cdot 0,92^9 \cdot 0,08^1 \approx 0,378$.	2 pont	
A kérdéses valószínűség ezek összege, azaz kb. 0,812.	1 pont	
Összesen:	5 pont	
16. d) első megoldás		
Az M. Kft.-nél minden dolgozó esetében rendre nagyobb a fizetés és az átlagos fizetés (abszolút) eltérése, mint az A. Bt. dolgozóinál,	2 pont	
így az M. Kft.-nél nagyobb a havi fizetések szórása.	1 pont	
Összesen:	3 pont	
16. d) második megoldás		
Az M. Kft.-nél a fizetések szórása $\sqrt{\frac{120^2 + 3 \cdot 40^2}{4}}$, azaz kb. 69,28 (ezer Ft),	1 pont	
az A. Bt.-nél a fizetések szórása $\sqrt{\frac{60^2 + 3 \cdot 20^2}{4}}$, azaz kb. 34,64 (ezer Ft).	1 pont	
így az M. Kft.-nél nagyobb a havi fizetések szórása.	1 pont	
Összesen:	3 pont	

15. c)		
Anna Bence Cili Dénes Erdő Feri	2 pont	
Összesen $\binom{6}{2} = 15$ „pár” lehet ismerős, amiből eddig 6 valósult meg,	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha a vizsgáló a rajzolt gráfot teljes gráffá egészíti ki, és ez alapján helyesen válaszol.</i>
azaz még $(15 - 6 = 9)$ olyan pár van, amelynek tagjai nem ismerősei egymásnak.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

II. B

16. a)		
A kúp és a henger alapkörének sugara 40 cm (4 dm).	1 pont	<i>Ez a pont akkor is jár, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.</i>
A tartály térfogata (kúp és henger együtt) $V = \frac{40^2 \cdot \pi \cdot 110}{3} + 40^2 \cdot \pi \cdot 120 \approx$ $\approx 787\,493\text{ cm}^3 (\approx 787\text{ dm}^3)$, azaz a tartályba legfeljebb 787 liter folyadék fér.	2 pont	$V_{\text{henger}} \approx 603\,186\text{ cm}^3$ $V_{\text{kúp}} \approx 184\,307\text{ cm}^3$
	1 pont	
	1 pont	
Összesen:	5 pont	

8.		
A vásárlók száma hónapról hónapra egy olyan mértani sorozatot alkot, melynek első tagja 3400, hányadosa pedig 1,07.	1 pont	<i>Ezek a pontok akkor is járnak, ha ezek a gondolatok csak a megoldásból derülnek ki.</i>
A sorozat 13. tagját kell kiszámítani.	1 pont	
2020 januárjában $3400 \cdot 1,07^{12} \approx$	1 pont	
≈ 7700 vásárlója volt az oldalnak a kért kerekítéssel.	1 pont	<i>Ez a pont nem jár, ha a vizsgáló nem kerekít, vagy rosszul kerekít.</i>
Összesen:	4 pont	
9.		
A: hamis B: igaz C: hamis	2 pont	<i>2 jó válasz esetén 1 pont, 1 jó válasz esetén 0 pont jár.</i>
Összesen:	2 pont	
10.		
$\frac{6}{25} = 0,24$	2 pont	
Összesen:	2 pont	
11.		
Például 360° .	2 pont	
Összesen:	2 pont	
12.		
A hat mérkőzésen összesen $6 \cdot 75$ pontot kell szerezniük.	1 pont	$\frac{77 + 60 + 83 + 73 + 90 + x}{6} = 75$
Ennek eléréséhez a hatodik mérkőzésen $6 \cdot 75 - (77 + 60 + 83 + 73 + 90) =$	1 pont	
$= 67$ pontot kell szerezniük.	1 pont	
Összesen:	3 pont	

II. A

13. a)		
A zérushelyek: $x = -1$ és $x = 3$.	2 pont	
A maximum helye $x = 1$,	1 pont	
a maximum értéke $f(1) = 2$.	1 pont	
Az f értékkészlete: $[-3; 2]$.	2 pont	
Összesen:	6 pont	

13. b)		
$m = -1$	2 pont	
$b = 3$	1 pont	
Összesen:	3 pont	


13. c)		
Az egyenlőtlenség megoldása: $-2 \leq x < 0$,	2 pont	
valamint $2 < x \leq 6$.	2 pont	
Összesen:	4 pont	

14. a)		
Az egyenlet mindkét oldalát a törtek közös nevezőjével szorozva: $6(x - 2) + 6(x - 3) = 5(x - 3)(x - 2)$.	1 pont	
A zárójeleket felbontva és az egyenletet rendezve: $5x^2 - 37x + 60 = 0$.	2 pont	
A másodfokú egyenlet gyökei: $x_1 = 5$ és $x_2 = 2,4$.	2 pont	
Ellenőrzés behelyettesítéssel vagy ekvivalens átalakításokra való hivatkozással.	1 pont	
Összesen:	6 pont	

14. b)		
(A hatványozás azonosságainak felhasználásával: $7^2 \cdot 7^x - 7 \cdot 7^x = 2058$.	1 pont	
$42 \cdot 7^x = 2058$	1 pont	
$7^x = 49$ ($= 7^2$)	1 pont	
(Az exponenciális függvény kölcsönös egyértelműsége miatt: $x = 2$.	1 pont	
Ellenőrzés behelyettesítéssel vagy ekvivalens átalakításokra való hivatkozással.	1 pont	
Összesen:	5 pont	

15. a) első megoldás		
(Ha a sortrendet nem vesszük figyelembe, akkor) a 13 lányból 2-t $\binom{13}{2}$ -féleképpen tudunk kiválasztani (kedvező esetek száma).	1 pont	A sorrend figyelembevételével a kedvező esetek száma $13 \cdot 12$,
A 32 diákból 2-t $\binom{32}{2}$ -féleképpen tudunk kiválasztani (összes eset száma).	1 pont	az összes eset száma pedig $32 \cdot 31$.
A kérdéses valószínűség: $\frac{\binom{13}{2}}{\binom{32}{2}} =$	1 pont	$\frac{13 \cdot 12}{32 \cdot 31} =$
$= \frac{78}{496} \approx 0,157$.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

15. a) második megoldás		
Annak valószínűsége, hogy elsőre lányt választunk: $\frac{13}{32}$.	1 pont	
Annak valószínűsége, hogy másodikra lányt választunk (feltéve, hogy elsőre lányt választottunk): $\frac{12}{31}$.	1 pont	
A kérdéses valószínűség: $\frac{13}{32} \cdot \frac{12}{31} =$	1 pont	
$= \frac{156}{992} \approx 0,157$.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

15. b)		
Az első filmet látta, a másodikat nem: $11 - 3 = 8$ fő.	1 pont*	
A második filmet látta, az elsőét nem: $14 - 3 = 11$ fő.	1 pont*	
Az első és a második közül legalább az egyiket látta: $8 + 11 + 3 = 22$ fő.	1 pont*	
Csak a harmadik filmet látta: $32 - 22 = 10$ fő.	1 pont	
Összesen:	4 pont	

Megjegyzés: A *-gal jelölt 3 pont a logikai szita alkalmazása esetén is jár: $11 + 14 - 3 = 22$ fő látta az első és a második film közül legalább az egyiket.